

7

# TRACTATUS

DE

# TUMORIBUS

# HUMORALIBUS

IN UNIVERSITATE MEDICINÆ  
MONSPELIENSIS EXPLICANDUS

*AB AUCTORE*

FRANCISCO IMBERT,

Regis Consiliario ac Medico, in  
almâ Monspeliensium Medicorum  
Academiâ Professore Regio, è  
Societate Regiâ Scientiarum Mon-  
peliensi.



MONSPELII,

Apud JOANNEM MARTEL, Regis, Occitanix Comitiorum,  
& Universitatis Typographum.

---

M. DCC. LIII.

TRACTATUS

DE

TUMORIBUS

HUMORALIBUS


UNIVERSITATE MEDICINAE

MONTPELLIENSIS ET ALIANDUS

Digitized by the Internet Archive  
in 2020 with funding from  
Wellcome Library

MONTPELLIENSIS  
JOHANNES MARTEL, REGIS GALLICAE  
ACADEMIAE PROFESSOR, REGIS  
SOCIETATIS REGII SCIENTIARUM MONTPELLIENSIS

M. DC. CIII.




# INDEX.

PROEMIUM.	pag. I.
De Tumore humorali in genere.	4.
SECTIO PRIMA. De Tumoribus sanguineis inflammatoriis.	II.
CAPUT PRIMUM. De Obstructione sanguineâ.	<i>ibid.</i>
CAPUT SECUNDUM. De Phlegmone.	16.
CAPUT TERTIUM. De Erysipelate.	44.
SECTIO SECUNDA. De Tumoribus lymphaticis.	61.
CAPUT PRIMUM. De Obstructione lymphaticâ.	<i>ibid.</i>
CAPUT SECUNDUM. De Oedemate.	70.
CAPUT TERTIUM. De Schirro.	87.
De Obstructione glandulosâ.	<i>ibid.</i>
SECTIO TERTIA. De pluribus Tumoribus vulgò cognitis sub nomine parvulorum Tumorum humoralium.	128.
De Furunculo.	129.
De Varis.	135.
De Termintho.	136.
De Epinyctidibus.	137.
De Phygethlo.	138.
De Phymate.	140.
De Carbunculo aut Anthrace.	141.
De Paronychiâ	153.
De Pernionibus.	169.
De Parotidibus.	174.
De Bubonibus.	185.

De Buboni-formibus Tumoribus.	196
De Scrophulis.	197
De Cancris in genere.	214
De Cancro Mammarum.	225
De Emphysemate.	240
De Bronchocele.	247
De Ecchymosi.	251
Theoria quorundam exanthematum aut efflorescentiarum.	252
De Herpete.	254
De Scabie.	256
De Impetigine.	259
De Pustulis	263
De Papulis.	268
De Phlyctænis , Bullis & Ampullis.	270
SECTIO QUARTA. De Tumoribus Cysticis	272
CAPUT PRIMUM. De Obstructione Cysticâ.	<i>ibid.</i>
CAPUT SECUNDUM. De Spinâ Bifidâ.	274
CAPUT TERTIUM. De Meliceride, Atheromate & Steatomate.	293.
CAPUT ULTIMUM Hydatidem , Aneurisma , Varicem , Hydrocelen , Hydromphalum & Hydarthrum definiens.	309.





# PROEMIUM.

DE

## TUMORIBUS.

**A**UCTA moles partis solidæ cujuscumque præcriptos à naturâ limites transgredientis Tumorē ponit in humano corpore.

Nulla est humanæ machinæ portio sensibilis, quæ, datâ causâ, augeri mole & ultrâ naturales limites progredi non possit; ergò & tumere. Tumbunt igi-

tur non solùm partes molles, sed & ossa (a) ipsamet.

Pars quæ tumet violentiam patitur à causâ tumefaciente, quæcumque demùm fit illa causa. Violentia hæc faciliùs vincit partes laxitate, flexibilitate, parvâque cohæsione debiles: difficiliùs organa rigiditate, robore, firmiorique nexu valdè renitentia. (b) Hinc sæpiùs illæ, rariùs istæ partes Tumoribus afficiuntur.

Causa tumefaciens numquam agit efficaciter absque partis tumentis distractione aliquali. Quæ distractio semper est superior renitentia tumefactarum partium.

Renitentia partium corporis est proportionata numero & robori fibrarum varias partes constituentium, ac proin-

(a) Vide apud eos qui de morbis ossium scripsere, tot exempla exostoseon.

(b) Attentè evolvantur aphor. Boerh. de morbis fibræ simplicis, vasorum minimorum & majorum, atque de morbis viscerum.

Aphorif. à sect. 21. ad 55.

DE TUMORIBUS. 3

dè major aut minor prout affecta pars pluribus aut paucioribus, robustioribus vel debilioribus fibris contexitur. Et quidem, eodem dato vis distendentis momento, faciliùs intumescit vas lymphaticum vase sanguineo; faciliùs membrana simplex quàm membrana composita, pars musculosa parte osseâ, vas minimum vase majori.

Vires distendentes in Tumorum efformatione viribus renitentibus directò sunt oppositæ. Partibus nostri corporis indita ea lex est ut renitantur & reluctantur propriæ elongationi. Hinc ad Tumorem quemlibet in humano corpore efformandum supponenda est lucta inter vires distendentes & partem renitentem sed debiliùs & consequenter in Tumorem elevatam.

Tument minutissimæ corporis partes, similes dictæ; undè Tumores præ exiguitate sensibus abditi: tument partes mole majores, hinc Tumores signis propriis distincti & observabiles. Tumor sensibilis ex millenis aliis invisibilibus conflatur.

4 DE TUMORIBUS.

Jam verò quotiès solida è sede naturali dimota in alias solidas partes ità agunt, ut easdem in Tumorem attollant, ponitur Tumor *non humoralis* nuncupatus: ad hoc genus pertinent Tumores à luxatis membris, Tumor inguinum & crurum in veris herniis inguinali & crurali, &c.

Tumores *humorales*, de quibus tantummodò hìc agitur, ortum ducunt à fluidis nunc in alieno, nunc in proprio loco contentis, ibique vasorum aut receptaculorum continentium molem præternaturaliter augmentibus.

*De Tumore humorali in genere.*

In omni Tumore humorali duo sedulò consideranda sunt: solidum continens, & fluidum contentum.

Solidi continentis victa necessariò supponenda est renitentia, ad hoc ut fiat Tumor. Illa renitentia vincitur, quotiès actio fluidi contenti tollit plùs vel minùs naturalem cohæsiõnem par-



tium integrantium quibus constant vasa, ductus, aut receptacula contentia.

In Tumore humorali quocumque obstruentis fluidi moles major est capacitate vasis obstructi: alioquin transmitteretur fluidum.

Quò majus est volumen fluidi obstruentis, eò major fit fibrarum obstructi vasis distractio, expansio membranarum, parietum ab axi propria recessus, vasis tumefactio. Quæ eveniunt in minimis & innumerabilibus vasculis partis tumentis.

Vires prædicta vasa distendentes semper agunt pressione laterali quæ crescit in ratione compositâ flexibilitatis parietum vasculosorum, actionis fluidi contenti, & virium vitalium.

Modus quo vasa minima distenduntur & ampliantur idem est ac ille quo distenduntur vasa majora: omnium enim corporis humani vasorum sectiones sunt eædem, nempe circulares.

Nunc autem sedulò notandum est

cujuslibet Tumoris humoralis conditionem proximiorum esse vel in solidis, vel in fluidis, vel in utrisque simul vitiatas: eâ tamen lege quod datæ partis solida sana esse nequeant; malè affectis liquidis; & vice versâ. Ideò sive solida, sive fluida primariò peccaverint, utrorumque dabitur læsio in parte tumente.

Cùm externorum corporum injuriis aut necessariò aut fortuito casu sit exposita humana machina, indè fit quod Tumores excitandis occasio semper præsens sit; hanc suppeditabunt aër, alimenta, exercitia, quies, motus, vigiliæ, ictus, casus, morsus, pressio, contusio, ligatura, &c.

Nativa cujuslibet hominis constitutio peculiaris accersere videtur Tumorum genera. Apud melancholicos quorum solida rigida nimis, humores tenaces, malèque permixti; frequenter observantur obstructions abdominales, Tumores glandulosi, schirri pertinaces: laxa serosaque corpora œdematibus

sunt obnoxia : sanguis acer , falsus , biliosus herpeticos & erysipelatosos Tumores facit : phlegmonas sæpè experitur corpus plethoricum & sanguineum : cachochimia est veluti fons uber crebrorum multipliciumque Tumorum humoralium.

Signa dantur caractéristica omni Tumori humorali externo communia. 1°. Augetur moles partis cujuslibet tumen-  
tis ; illud evincit oculus. 2°. Mutatur illius partis textura ; demonstrat digitus explorans. 3°. Exercitium functionis partis tumen-  
tis læditur sæpè sensibiler , quandòque modo insensibili , nunc cum mitibus , nunc cum gravibus symptomatis. 4°. Ut plurimum mutatur color naturalis in parte tumefactâ.

Signa peculiaris cujuscumque tumoris tradentur alibi. Caveant sedulo Medico-Chirurgi ab erroribus in Diagnostici (c). Tumorum.

---

(c) Chirurgus imperitus judicavit in tumore capi-

In genere distinguuntur magni Tumores humorales à parvis, utrique à mediocribus; calidi à frigidis; duri à mollibus; dolorifici ab insensibilibus rursus dolorifici inter se, critici à symptomatiscis; diversicolores: & sic de aliorum essentialibus, tum accidentalibus Tumorum notis distinctivis.

Quadruplici modo diverso terminantur tumores humorales; *Resolutione, suppuratione, induratione, & mortificatione.* Quid in his boni aut mali alibi declarabitur.

Ut præfagiantur futuri tumorum humorum eventus; uno eodemque tempore menti repræsententur, 1°. Causa

tis contineri materiem purulentam, & tumoris apertionem instituit: quâ factâ prodiit, non pus, sed propria cerebri substantia. *Bonet. sepulchret. tom. pag. 256.*

Nostri in regionibus Tumor hernialis iudicatus abscessus à chirurgo foraneo qui profundâ incisionem Tumorem aperuit. Obstupescit operatoris sub oculis exiit intestinum resectum; & æger mortuus est.

tumoris

DE TUMORIBUS.

9

Tumoris. 2°. Signa. 3°. Extensio & profunditas 4°. Morbi tempus. 5°. Natura & functio partis affectæ. 6°. Vires, ætas, sexus, temperamentum ægri. 7°. Terminatio ad quam vergit Tumor.

Indicationes curatoria generales Tumorum humoralium sunt primò impedire quòminus Tumoris sævitia mortem totius corporis aut summam ejus abefactionem accersat: secundò partem Tumore affectam sanam efficere; quod obtinetur vel fluidum obstruens resolvendo, dissipando; vel in pus commutando, & foràs extrahendo; vasis obstructis integris tonum naturalem restituendo, ruptorum portiunculas cum pure eliminando; solida omninò demortua incidendo, urendo, extirpando, auferendo, &c....

Quibus peragendis inserviunt diæta, pharmacia, chirurgia. Curationis exacta enarratio ad Tumores in particulari attinet.

Clarioris doctrinæ gratiâ Tumores humorales in quatuor sectiones ordinantur.

B

IO DE TUMORIBUS.

*PRIMA SECTIO* Tumores includit sanguineos inflammatorios, Phlegmonen, & Erysipelas.

*SECUNDA*, Tumores lymphaticos Œdema, & Schirrum.

*TERTIA* indicat quosdam Tumores prædictis minores qui vel aliquam cum quatuor primariis Tumoribus habent affinitatem, vel sui generis omninè sunt. Annotetur autem in isto tractatu non minutiùs describendos esse hosce Tumores quorum exacta narratio in immensum cresceret.

*QUARTA SECTIO* habet Tumores cysticos, folliculosos, seù tunicatos inter quos atheromata, melicerides & steatomata principatum tenere quisque norit.



## SECTIO PRIMA.

*De Tumoribus sanguineis  
inflammatoriis.*

**T**UMORES sanguinei inflammatorii sedem habent præcipuè in illâ vasorum humanorum specie quæ systema arteriosum sanguineum nuncupatur. Nullus ponitur sanguineus Tumor qui præcedentem non habuerit obstructionem sanguineam, Sit igitur,

---

## CAPUT PRIMUM.

*De obstructione sanguineâ.*

**M**AGNA sunt circulanti sanguini, etiam in statu sano, opposita obstacula. Sanguis arteriosus antece-

dens subsequenti resistit minùs in majoribus, magis in minoribus vasis: unde, optimo jure, morbi ex defectu circulationis tribuuntur vitiis vasorum minimorum. Et certè multò minorem esse velocitatem sanguinis in ultimis arteriolis quàm in earum trunco, experimentis (a) comprobatur; & assentitur ratio, cùm constet plurimùm multiplicari superficies à columnis sanguineis confricatas in vasis minimis. Hinc per vasa minima circulantis sanguinis propensio ad remoram & consequenter ad obstructions: etenim qui facili negotio per truncum ramosque effluxit sanguis, ad minimos ramusculos perventus difficillimè transmittitur, minimâ datâ causâ ulteriùs lentescit, mox ad apices ramusculorum provolutum germen futuræ obstructionis ponit.

Mirror *Pitcarium* paucissimis verbis eruditè demonstrantem quòd obstruc-

---

(a) Vid. act. Academ. parisin. ann. 1705.



tionum sanguinearum causæ ut plurimum evanescerent, si motus sanguinis circulatorius talis esset ut à vertice versùs basim, ab strictiori in amplio-rem alveum sanguis arteriosus deveheretur: etenim moleculæ quæ angustius subierunt orificium, certè ampliora vasa pervadent.

Obices intrà vasa arteriosa rarò etiam occurrerent, si ea essent cylindrica, seu, quod idem est, eandem ubique haberent diametrum: quid enim obstaret hanc sanguinis molem quæ principium vasis cylindrici subiit totum hoc eadem facilitate percurrere.

Verùm, inquit *Pitcarnius*, cùm sanguis à corde emissus à basi arteriosâ ad verticem procedat; nihil mirum, si toties diametro vasorum majores sanguinis massulæ vasa minima arteriosa obstruant.

Itaque pro ratò habendum obstru-  
ctiones sanguineas non in systemate ve-  
noso fieri, neque in tubulis cylindri-  
cis inter finem arteriæ & principium

venæ positis, sed in minimis arteri-  
lis sanguiferis in apicem desinentibus,  
& in lymphaticis vicinis.

Ex dictis etiam patet eò faciliùs  
obstruendam esse arteriolam sangui-  
neam quò minor est ejusdem capacitas,  
& quò acutior apex illius.

Massulæ sanguineæ in arteriolâ mi-  
nimâ hærentes vim sustinent à corde  
communicatam columnis sanguineis è  
cordis thalamo usque ad hærentes  
massulas protractis.

Si renitentia parietum obstructæ il-  
lius arteriolæ major sit vi distendente  
massularum sanguinearum, nullus sub-  
sequetur Tumor: si minor sit prædicta  
renitentia, contrarium eveniet.

Eximix observationes Vieussenia-  
næ (a) probant obstructiones sangui-  
neas sibi comites adjungere lymphati-  
corum vasorum obstructiones: undè  
major difficultas in referendis obstruc-  
tionibus.

---

(a) Vieussenii systema vasorum. pag. 109.

Ad obstructions sanguineas in humano corpore producendas infinita ferme concurrunt.

1°. Compressio arteriolarum à causâ quâcumque internâ, externâ: elongatio vasorum violenter distractorum quam semper subsequuntur imminutio cavitatis & debilitas in parietibus: constrictio vasorum à nimis elasticâ vel convulsivâ fibrarum cava cingentium contractione: angustatio arteriolarum à crassioribus factis membranis: innata vel adventitia debilitas vasorum fluidis propellendis imparium: ruptio vasorum cui succedit eorundem retractio.

2°. Multiplex in qualitatibus sanguinis vitium, ut ejus tenacitas, visciditas, oleositas, ficcitas, heterogeneitas, prava mixtura: sanguinis adaucta quantitas & volumen majus factum: impetuosus nimis nimumve retardatus ejusdem motus circulatorius.

Ex iis cæterisque solidorum fluidorumque vitiis separatim vel conjunctim positis, millenæ resultant variarum obs-

structionum sanguinearum combinationes.

Nullam autem umquàm futuram esse obstructionem sanguineam pro certo habeas nisi materiei in arteriolâ sanguineâ contentæ moles major sit capacitæ vasis continentis : in hoc enim consistit obstructionum natura & essentia.

Viribus vitalibus directè opponi obstructiones sanguineas evidentissimè patet, id est, luctam dari inter datas obstructiones & cor contractum.

## CAPUT SECUNDUM.

### *De Phlegmone.*

**S**IGNA Phlegmones sunt tumor, rubor, calor, tensio, dolor, pulsatio & circumscriptio. Horum omnium signorum concursus constanter reperitur in Phlegmone externâ, seu quæ sensibus externis patet & de quâ solâ hîc agitur.

*Partes*

*Partes diversæ quas occupare potest  
externa Phlegmone.*

Quibus in diversis partibus sedem habeat Phlegmone exterior, nosse convenit, unoque intuitu advertere. Itaque constat tales Phlegmonas advenire in vasculosâ cutis texturâ, in membranâ adiposâ; in glandulis quarum aucta moles ad exteriora corporis prominet; in musculis & tendinibus qui tegumentis communibus subjacent; in parietibus membranosis ductuum secretoriorum & excretorum dictarum partium; in earum textu cellulari; in capsulis & ligamentis articulationum; in periosteo ossium non profundè sitorum; in involucris nervorum non longè à cute repentium; in peculiaribus organis uti in globo oculari membranisque hunc constituentibus cooperientibus; in genitalibus & ano extimo; in ductu auditorio externo; in labiis, gingivis, ore, palato, imis

faucibus, linguâ; in membranâ pituitariâ nasi externas cavitates obvestiente; in adipe ad exteriora sive non profundè sitâ: ubicùmque demùm arteriæ sanguinæ lymphaticæque reperiuntur quarum distensiones extrâ prominent, cum signis Phlegmone propriis.

*Quid eveniat in parte Phlegmone affectâ, seu Phlegmones mechanismus?*

Compressæ, distentæ, intortæ, crispatae, contusæ, angustatæ quomodo cùmque partium superiùs enumeratarum arteriolæ sanguinæ, remoran sanguinis producunt. Parem stagnationem facit sanguis spissus, viscosus, oleosus, ficcus, coagulatus, malè permixtus, abundans, rarefactus, partim aut integrè obstruens cavitates arteriolarum.

Hærens sanguis in arteriolarum sanguinearum finibus, renitentes habet a latera parietes vasorum, ad anterior strictum iter, ad posteriora pressione

ictusque repetitos sanguinis subsequen-  
tis à corde pulsi. Vires vitales pellunt  
obicem in obstructo vase positum ; obex  
resistit, nec vincitur ; lucta datur obi-  
cem inter & cor , utriusque nixus &  
renixus ferunt vasis obstructi latera  
quæ tandem victa ultrà terminos na-  
turales feruntur & tumorem creant.  
Ea est incipientis Phlegmones obser-  
vanda mechanica.

Crescit Tumor actione constanti vi-  
rium pellentium , obstructentium , dis-  
tendentium. In strictioribus arteriola-  
rum obstructarum apicibus sanguis adi-  
gitur , ibi magis ac magis cumulat ,  
per venas congeneres redeundi prorsus  
impar. Et tunc notabilius prominet  
Phlegmone adultior.

Interim à tergo indefinenter premit  
cor : major fit sanguinis aggestio in va-  
sis obstructis , major & illorum dilata-  
tio : augentur , ab adveniente copio-  
siori velociusque moto sanguine , dia-  
stoles & systoles vasorum non obstruc-  
torum : summus fit particularum san-

guinis coerciti attritus: calor adaugetur in parte. Phlegmone est in augmento.

Tanta autem fieri non potest distractio in parietibus arteriolarum sanguinearum obstructarum, quin dilatentur & amplientur oscula arteriarum lymphaticarum in cavis sanguineis hiantia. Quibus patentioribus osculis rubræ sanguinis moleculæ lymphaticæ invadunt, ibi impactæ hærent. Undè nova Phlegmones incrementa.

Status ille novus advenit vel pluribus vel paucioribus arteriis sanguineis & lymphaticis, imò & vasis secretoriis portionem sanguinis lymphaticam fibrosam, globulosam purpuream, si vigeat causa morbifica, admittentibus. Hæc diversa vasa dilatatione propriâ sese mutuò comprimendo infarctum atque inflammationem adaugent. Phlegmone tunc temporis ad statum pervenit.

Ergò in parte Phlegmone affectâ nullus est ordo nequè in actione soli.



dorum, nequè in fluidorum circuitu.

Verùm quò se recipit ea pars sanguinis quæ abundanter à corde tot repetitis vicibus contracto pellitur in obstructas & impervias Phlegmones arterias? Aliquâ sui parte vasis obstructis datâ, reliquum collaterales arterias sanguineas non obstructas invadit, quæ magis solito distensæ, solito magis agunt in sanguinem: undè per vasa libera hæc transfluxus uberior.

Ex dictis patet quænam in Phlegmone obstruantur vasa, & quomodò? quid ad hoc opus conferant vires cordis pellentes, arteriolarum minutissimi apices, materia obstruens? Nùm sit necessum recurrere ad sanguinis incendia, effervescentias, putrefactiones, extravasationes?

*Explicatio brevis Phænomenum  
Phlegmone essentialium.*

1°. Pressione laterali, quæ in obstructis arteriolis magna est & pertinax tum ratione adauctæ molis san-

guineæ, tùm ratione virium cordi  
constanter prementium, elongantur  
circulares fibræ vasorum obstructorum  
extròpelluntur eorum latera, majus  
occupant spatium dilatata illa vasa  
Fit Tumor.

2°. Infarctus vasorum ad limbum  
Phlegmones positorum eminentiam  
constituit quæ circumscriptio dicitur

3°. Fibræ humanæ exsiccatae, ab  
omni fluido orbatae, ad merum soli-  
dum redactæ, constanter subalbida  
remanent. Ergò non à solidorum tex-  
tu pendet præcisè rubor Phlegmones  
sed à sanguine transparente qui abun-  
dans & æstuans hæret non in sangui-  
neis tantùm, sed in pellucidis lymphati-  
cis arteriis.

4°. Phlegmones renixus est illius  
resistentia notabilis propriæ inflexioni  
Ideò renititur Phlegmone quia fibræ  
vasorum obstructorum plurimùm dis-  
tractæ in quolibet sui puncto duriores  
evadunt, ut potè minùs flexibiles  
major subsequitur inflexibilitas mem-

branarum ab illis fibris compositarum, major demùm renixus in quolibet vase inflammato Eò magis renititur Phlegmone, quò abundantiore, viscosiore, tenaciùs impacto, potentiùsque latera vasorum premente sanguine obstruuntur arteriolæ.

5°. Calor hominis viventis pendet à præsentia sanguinis: id probant milena observata & experimenta. Præternaturaliter calet Phlegmone à præternaturaliter adaucto nisu sanguinis in vasa, vasorum in sanguinem, molecularum sanguinearum inter se. Diversos caloris adaucti gradus in Phlegmone deducas à diversis causis Phlegmonas producentibus; ab inæquali textu & densitate partium Phlegmone affectarum; à varia sanguinis indole, abundantia, crasi, alteratione; à distantia cordis respectivè ad inflammata organa; à natura illorum organorum; à tractatione Tumoris.

6°. Nervi sunt instrumenta doloris. Vim distrahentem patiuntur fibræ ner-

veæ in Phlegmone, undè dolor. Gradus doloris gradui nervorum distractionis respondet ad punctum ruptionis usquè, quod supremus est doloris terminus: nullum enim ampliùs datur commercium fibram inter ruptam & cerebrum.

7°. Sensibiliter pulsatur Phlegmone, quia singulis cordis contractionibus maximus fit impetus & nisus sanguinis in parietes arteriarum partis phlegmonodeæ. Sed pulsatur dolorificè, propterea quod eadem lateralis pressio arteriosa quæ fibras circulares vasorum elongat, simul distrahit nerveas propages aliis fibris intertextas. Nequè alia est ratio cur Phlegmones pulsationes dolorificæ contractionibus cordis sint contemporaneæ.

*An sint alia Phlegmones symptomata?*

Priùs explicata symptomata sola sunt quæ Phlegmonem essentialiter designant. Hanc, per accidens tantummodo

ad, comitatur aut sequitur febris.

Conceptu difficillimum est quorsum ea sanguinis quantitas, quæ per liberas arterias Phlegmones effluit, ( quisquis sit ille effluxus ) motus cordis adeò frequentes, sivè febrem excitet. Quod prædicat vulgatissima theoria. ( a )

Verosimiliùs irritatio fibrarum nervosarum in Phlegmone febrem ipsi adungit. Attende ad convulsiones totius corporis quæ subsequuntur vel minimum quarumdam partium nervosarum vulnusculum. Attende ad febres acutissimas quæ comitantur paronychiam, æterasque inflammationes membranarum, aponevroseón, tendinum. Horum symptomatum gravitas debetur

---

( a ) Illa theoria adeò improbabilis est, tot objectionibus impugnatur adeòque repugnat scientiæ mechanicæ corpori humano exactiùs applicatæ, ut videntur viros in medicinâ celebres confidenter tantam quidpiam veri & veluti demonstrati prædictam theoriam scriptis mandasse. Vide in contrarium theoriam pulsûs & circulationis cap. de morbosâ vasorum minimorum dilatatione.

*Thes. propugnat. Monspeliî ann. 1752.*

**D**

majori nervorum irritationi.

Febri phlegmonodeæ aut excitanda aut fovendæ non parùm quoquè conducunt dispositiones febriles præexisteres in corpore cui proindè Phlegmon supervenit : tales sunt saburra in primis viis, sanguis excandescens, similesque causæ proëgumenæ.

Notandum sedulò quòd si Phlegmone quandòque causa fit febris, aliò quandò suâ vice febris producit Phlegmonem. In primo casu Phlegmone essentialis febrem excitat sympaticam ; in secundo casu febris essentialis & per se existens Phlegmonem sympaticam procreat.

*Quædam differentie in Phlegmonibus  
annotandæ.*

Licèt unus idemque sit concursus symptomatum essentialium in omni Phlegmone externâ, sunt tamen differentie annotandæ, quarum conceptus, Medicum dirigit & in event

prævidendo & in applicando remedio.

Annotetur igitur Phlegmone idiopathica quæ per semetipsam existit; sympathica quæ à morbo priori ortum lucit; deuteropatica quæ succedit cuidam morbo qui evanuit: Phlegmone critica quæ accidit cum bonis ægri ebus; symptomatice quæ vel non sublevatur æger, vel in pejus ruit: Phlegmone simplex quæ in suâ unitate existit; complicata quæ alios morbos adjunctos habet: Phlegmone spuria quæ latè extensa limites non habet quibus circumscribatur & Tumor phlegmonodes dicitur; legitima quæ cum aliis signis essentialibus circumscriptioem habet & Phlegmones nomen simpliciter retinet.

Nequè minori sollicitudine menti præfens sit idea Phlegmonum mitis, traxis, benignæ, malignæ, contagiosæ, inflammatoriæ, suppurantis, gangrænodæ, sphacelatæ, in induratum obducentis, citiùs ociùs sua tempora percurrentis, superficialiæ, paulò profun-

dioris, advenientis corpori juvenili, adulto, senili, fœminino, masculino, robustiori, debili, cachochimico; demùm Phlegmonum obsidentium partes diversas cutaneas, adiposas, glandulosas; musculares, membranaceas, tendineas; tali aut tali muneri inservientes.

*Quid de Phlegmone sit præfagiendum?*

Phlegmone adveniens partibus tendineis, membranosis, ligamentosis, aponevroticis, accersit dolores summos, vigilias, spasmos, deliria, febres acutissimas. Ab inflammata adipe timebatur abundanter & pravam suppurationem, imò & gangrænam. In inflammationis articulationum capsulis cavendum à pure in cavo articuli depluente, ibique cuncta erodente; undè totius membri ruina & febris lenta lethalis si sanguini remixta fuerit purulenta materies. Inflammationem periosteï suppuratione aut mortificatione terminari pessimum est; exindè enim



os de nudatur, vasorum sanguinem & lympham nutritiam ossi suppeditantium destruitur textura, omnia in ossis intimo pereunt defectu succi vitalis & motûs circulatorii. In genere quò magis vitæ est utilis functio partis Phlegmone laborantis, eò pejor prognosis, & vice versâ.

Dolor acutissimus in Phlegmone præfagit omnia accidentia quæ à validè commoto genere nervoso fluunt. Calor ingens ingentem in parte phlegmonodeâ motum significat; undè vel suppurationes vel mortificatio, juxtâ circumstantias. A summo gradu tensionis, rubedinis, elationis, multùm pertimescendæ ruptiones vasorum & quæ ex his fiunt.

Febris bona censenda est si per incitatos motus cordis humor noxius, pestilens, malignus, è corpore expellatur ope Phlegmones: mala verò febris quæ tædiosam, abundantioremq; suppurationem fovet usquè ad corporis consumptionem; vel quæ uno im-

petu textum partis phlegmonodeæ destruit & mortificationem creat. Excessu validissimarum virium vitalium gangræna sæpè Phlegmone supervenit in juvenili & robusto corpore: defectu earumdem virium mortificatur Phlegmone apud senes: nocet extremum utrumque.

Benè sperate de Phlegmonibus criticis suppuratis levamen ægro conciliantibus: cuncta timete à symptomaticis; aut à criticis, tractantium imperitiâ aut culpâ naturæ resolutis.

Numquàm benè ominandum de Phlegmone superveniente corpori scorbutico; observatur enim tales Phlegmonas in prava ulcera & in gangrænam sæpè abire. Lenti sunt Phlegmones gradus apud serosos & leucophlegmaticos: celeres è contrà in temperamentis sanguineis. Pravæ sunt Phlegmones advenientes corpori cacochimico; pessimæ quæ pendent à viru quodam pestilenti aut venefico, nisi eâ viâ tota expellatur venefica fomes.

Malè præfagiatur de Phlegmonibus subsequētibꝫ suppressam evacuatiōnem consuetam quæ per adhibita remedia non redintegratur : quod imprimis notetur in corporibus mulieribus.

Indoles sanguinis benè aut malè constituti, bonam quoquè aut malam facit Phlegmones prognosim. Meliùs est Phlegmonem oriri à causâ externâ quàm ab internâ, ab adventitiâ quàm ab innatâ aut hæreditaria, &c...

Quatuor nunc supersunt advertendæ Phlegmonum terminationes.

1°. Resolutio expectanda in Phlegmone cujus vasa integra sunt, materiesque non irresolubilis. Futura prævideatur hæc terminatio à mitibus symptomatis, ab absentia signorum alias terminationes redolentium : præsens noscitur per pruritus quemdam in parte, madorem exteriora perfundentem, gradariam detumescētiā. Optima resolutio sanitatem parti affert. Et ideo semper optanda terminatio hæc, nisi

32 DE TUMORIBUS.  
criticus sit Tumor aut pestilens.

2°. Ut plurimum suppuratione terminatur Phlegmone. Suppuratio præsupponit vitam amissam in quibusdam vasis, nempe in disruptis; vitamque vegetiorem in sanguiferis arteriosis quæ remanserunt integra. Prævidetur futura in Phlegmonibus suppuratio ex intensitate inflammationis, horroribus irregularibus, ineptitudine materiei ad resolutionem. Factam suppurationem in Phlegmone nosse licebit ex remissione symptomatum, Tumoris fluctuatione ejusque acuminato apice. Quæ signa tamen non semper adsunt, eoque difficiliora sunt cognitu, quò profundius sita est Phlegmone.

Sæpè adest periculum in ipsomet Phlegmones suppurantis opere: si enim adeò intendantur vires vasorum integrorum ut sequatur ruptio, pars morti traditur: si summus dolor suppurationem comitetur, timendum nè symptomata generi nervoso noxia subsequantur, præsertim spasmi & syncopes.

Facta

Facta purulenta materies , si diutiùs clausa remoretur ; pondere aggravabit partes vicinas , acrimoniâque irritabit ; undè serpens ad vicina loca inflammatio , aut per bibula oscula asporum suctus materiei purulentæ sanguini remixtæ , summo corporis damno. Hinc prævidetur nùm impetranda sint auxilia chirurgica , ferrum aut corrosivum ad puris effluxum : nùm simplex curandum sit ulcus , nùm verò formatis sinibus & fistulis succurrendum sit.

Magnæ suppurationes diutiùs protractæ corpus exhauriunt è sanguinis balsamicâ substantiâ , atrophiamque mortiferam non rarò portentunt.

Vitia massæ generalis fluidorum viciam prognosim faciunt , tùm quoad consummet suppurationis opus , tùm quoad ea quæ factam suppurationem subsequuntur. Puris è Phlegmone suppurante effluentis color & consistentia prognosim etiam dirigunt. Optima sup-

puratio Tumorum criticorum. Phlegmones exterioris suppuratione multò minùs periculosa est suppuratione Phlegmones internæ.

3°. In schirrum non rarò abire Phlegmonen demonstrat observatio. Talimodo terminandum esse illum Tumorem suspicandi locus est si inflammatio glandulas teneat : si materies naturæ tartareæ sit : si in eâdem materiè puris efformationi adsit ineptitudo : si nimio motu dissipetur serum in parte inflammata fæcesque remaneant : si resolutione factâ in sanguiferis, obstinatè infarcta remaneant lymphatica ob parietum debilitatem : si ab ægrotantis temperamento multùm fibrosæ & lymphaticæ substantiæ suppeditetur vasis obstructis : si excretioni humorum lymphatici in parte inflammata non detur locus : si frigore, medicaminibusque inspissetur lymphâ partis inflammatae.

Phlegmonen mutandam esse in schirrum pro certo habeas, dùm, evanes

entibus symptomatis inflammatoriis, tumor mole minor fit, magis renuens, hebetiori sensu præditus, colore naturali aut albicantem accedente. Periculi plena est mutatio Phlegmones in schirrum, si, quod sæpè evenit, in cancrum schirrus abeat. Phlegmone in schirrum mutata eò peioris est ominis quò magis ille obstat functionibus vitæ necessariis. In genere quidpiam commodi potiùsquàm periculi est in schirro exteriùs locato qui à phlegmone sobolescit.

4°. Aliquandò gangrænâ aut sphaculo terminatur Phlegmone. Utraque terminatio pessima est. Supponit immixtionem aut abolitionem virium vitæ in parte inflammata: tonum perditum in vasis si integra sint, et eorum dilacerationem. Noscitur phlegmone mortificata, ex absentia humorum vitam partis denotantium.

Ingens obstructio, validissima inflammationis agentia, humorum depravata, cacochimica, calidiùs cœlum,

aliaque plura mortificationi Phlegmones famulantur ; undè malè ex his ominandum.

Pessima quidem prognosis dùm mortificatur Phlegmone absque causâ evidenti , dùm mortificatio serpit à parte in partem , dùm advenit corpori caochimico.

*De analogiâ quæ observatur inter Phlegmonas externam & internam.*

Externa Phlegmone ab internâ differt sede non naturâ : quæ enim partibus externis inflammatis adveniunt eadem fiunt in inflammationibus partium internarum.

In utroque Phlegmonum genere idem est primarium movens, nempe cor; eadem materia, scilicet sanguis vasa eadem affecta, arteriæ sanguineæ & lymphaticæ.

Tàm ad interiorem quàm ad exteriorem Phlegmonem procreandam præcedit obstructio sanguinea : hæc eodem



modo nascitur, crescit & viget, sive interiùs, sive exteriùs sedeat. Id tamen observetur discriminis, quod progressus celeriores sint internè quàm externè.

Idem est naturæ mechanismus in inflammationibus phlegmonodeis quibuscumque, quarum objectum præcipuum est infarctus arteriolarum quæ tùm interiùs, tùm exteriùs in apices desinunt remoræ sanguinis faventes.

Vires vitales magis intenduntur in conficiendis internis quàm externis Phlegmonibus; quia scilicèt organa interna directiùs adversantur vitali principio; eâdem ratione febris ut plurimùm comitatur inflammationes internas.

Similitudo in texturâ partium internarum & externarum affectarum Phlegmone inter effectus sive signa utriusque inflammationis analogiam instituit: sic, externa aponevrosi inflammata acutissimam febrem summosque dolores creat, non secùs ac inflammatio pleuvræ, &c....

Si quandòque sanguis inflammato;

rius ab intempestivè resolutâ Phlegmone externâ, in interiora organa irruat; aliquando materies inflammatoria ab interioribus ad exteriora dejicitur. Quæ mutationes à loco in locum dicuntur metastases.

Sicut externa Phlegmone glandulas axillares, inguinales aliasque externè locatas non rarò indurat; ità in inflammationibus internis schirrosæ fiunt glandulæ mezentericæ, pancreaticæ, pulmonales, &c...

Phlegmone externa in corpore cacochimico pessima habet signa difficiliùsque discutitur: rariùs etiàm ab inflammationibus internis evadunt temperamenta in quibus adest humorum generalis depravatio præexistens.

Eædem sunt in genere indicationes curatoriaæ pro internâ & pro externâ Phlegmone.

Breviùs dicam, Phlegmone externa & Phlegmone interna, sunt unus & idem morbus diversis tantùm partibus infidens.

*Curatio exterioris Phlegmones.*

Status partis Phlegmone externâ laborantis, ut potè inflammatorius, auxilia non pauca expetit in generali Phlegmonum tractatione adhibita. Auxilia hæc reducuntur, 1°. Ad ea quibus imminuitur massa sanguinis. 2°. Ad ea quibus castigantur pravæ humorum qualitates. 3°. Ad ea quæ pravos primarum viarum succos eliminant. 4°. Ad ea quæ parti applicantur sub topicorum nomine.

*Primò.* Diæta, à morbi initio præscripta, parcam suppeditans sanguinichili copiam, minùs solito sanguinis deperditiones reparat, & eo defectu, illius massam imminuit. Eò tenuior præscribi debet diæta, quò gravior judicatur Phlegmone.

Præstantissimum inflammationis auxilium, venæ sectio, citò sublevat vasa ab abundantiori sanguine. Numerus venæ sectionum ad Phlegmonem insti-

tuendarum, quantitas sanguinis educendi quâlibet vice, electio venæ secandæ nùm in pede, nùm in brachio, cuncta hæc rectè statuuntur attendendo ad vires, temperamentum & ætatem ægri; ad indolem & symptomata Phlegmones; ad partem & locum cui infidet Tumor; ad ejus extensionem, ad propensionem phlegmones versùs unam ex quatuor terminationibus; ad febrem. Sine morâ primisque morbis diebus institui debent venæ sectiones; in morbi decursu minùs sunt proficuae; sæpè nocent sub finem.

*Secundò.* Remediis alterantibus appropriatis varia castigatur prava humorum diathesis, phlegmonodeam inflammationem producens aut fovens. Sanguinis æstui & siccitati diluentia & refrigerantia conveniunt: hujus acrimoniæ lenientia, edulcorantia, oleosa dulcia: spissitudini incidentia: sanguinis rarefcentiæ valida refrigerantia & acida.

Si acutus dolor persentiatur, utendum

dum narcoticis, præsertim laudano, vel  
 solis vel maritatis cum alio remedio-  
 rum genere, uti cum edulcorantibus,  
 refrigerantibus, &c....

*Tertiò.* Certissimum est Phlegmonas  
 sæpiùs produci aut fovèri à pravis suc-  
 cis ab stomacho aut intestinis ad san-  
 guinem transmigrantibus. Exindè indi-  
 cationes curatoriaè per potiones cathar-  
 ticas, emeticas, cathartico-emeticas,  
 variandas pro circumstantiis à Medico  
 observandis.

Nequè sanè hïc parvi facienda sunt  
 nemata emollientia, humectantia, re-  
 frigerantia, demulcentia, purgantia,  
 quorum usus mira præstant ad juvan-  
 dos præsertim aliorum remediorum ef-  
 fectus.

*Quartò.* Indicanda nunc sunt topi-  
 ca in tractatione Phlegmonum exter-  
 narum adeò proficua.

1°. Si tentetur resolutio Phlegmo-  
 nes, adhibenda sunt repercussiva, re-  
 solventia, discutientia, leviter adstren-  
 gentia. Rigidiore fibræ Phlegmones

expetunt relaxantia, emollientia, oleosa: æstus & ardor in humoribus Phlegmones aquosa, lenientia, anodina nimia fibrarum laxitas, actiuosa topica, & leviter stimulantia.

Caveas nè cujuslibet Phlegmones indiscriminatim tentetur resolutio, qua verbi gratiâ præcisè vitanda in casu Phlegmones criticæ.

2°. Si, aut irritis remediis resolventibus ad suppuratum tendat Phlegmone, aut antè illorum usum suppuratione benè indicetur; tunc in usum vocanda sunt topica maturantia, suppurantia quorum forma & materia pro circumstantiis multum variant. Sic, in suppurandâ Phlegmone dolor & æstus vigentes impugnantur anodinis & emollientibus: crassa & iners materies actiuosis & attenuantibus: laxitas & summa solidorum segnities spirituosis & stimulantibus.

3°. Gangrænæ imminenti aut præsententi in Phlegmone succurrendum topicis diversæ virtutis & quorum ener-

gia destruit causam mortificationis. Hanc ergò causam apprimè noscere multùm interest. Si peccet laxitate, ætuofois; si rigiditate, emollientibus; si inspiffatione, resolventibus; si dolore & æstu, emollientibus anodinis utendum est: & sic de cæteris.

4°. Deniquè Phlegmonibus indurationem minitantibus conveniunt topica resolventia, aliis maritata topicis quorum vis respondet statui Tumoris: sed hoc dilucidius in capite de chirro.

In genere, remedia interna superiùs indicata præscribuntur sub formâ pti-narum, jusculorum, cremorum, decoctionum diversarum, emulsionum, pozematum, juleporum, potionum, &c..... topica verò, sub titulo fomentorum, cataplasmatum, unguentorum, &c.....



---

## CAPUT TERTIUM.

### *De Erysipelate.*

**N**ULLUS inter Tumores qui tot nomenclaturis fuerit insignitus, quot Erysipelas. A Latinis antiquioribus modò ignis sacer, modò ignis proserpens, modò rosa, dictum fuit: spinæ nomen apud Avicennam obtinuit: Inter Barbaros Valescus apostema cholericum nuncupavit: alii dixerunt inflationem à sanguine tenuissimo latam & rubeam sparsam in membri superficie. Quarum denominationum scientia prorsùs utilis est ad intelligenda Antiquorum scripta de Erysipelate.

Porro Erysipelatis signa characteristicam sunt parva Tumoris elevatio & aliquis diffusio, nullus fermè renixus, calor deurens, dolor acer, color rutilans, amissio coloris rubri à premente



digito, reditus ejusdem coloris amoto digito premente.

*Quænam sit materies Erysipelatis?*

Magna est in Medicinâ veteri obscuritas ad assignandam genuinam materiem Erysipelatis: hanc, bilem esse putabant. A flavâ bile sincerâ & tenui Erysipelas exquisitum; ulceratum ab amarâ bile crassiori & acriori; phlegmonosum Erysipelas à copiosâ bile pauco permixtâ sanguini; pituitæ permixtâ œdematosum; permixtâ humori atrabilario schirrosum Erysipelas creuebant. Sic, ope bilis multifariæ phœnomena cujuscumque Erysipelatis facilè sed obscuriùs explicabat fermè tota antiquitas.

Certior nova theoria sanguinem acrem, æstuantem, & leviter inspissatum admittit pro materiâ Erysipelatis. Quod circâ naturam hujusce sanguinis observavi, paucis referam.

OBSERVATIO PRIMA. Miles tempe-

ramenti sanguinei triginta circiter annos natus incidit in Erysipelas totam faciem occupans & atrocioribus stipatum doloribus, cum febre acutissimâ. Missi in patellam sanguinis paucillum apici meæ linguæ apposui, & in degustando notabilem acrimoniâ, quæ vergebat ad deurentem amaritiem, persentivi. Ægrotans mihi retulit se ab ætate tenerâ Erysipelatibus fuisse obnoxium: sextâ morbi die obiit correptus phrenitide.

OBSERVATIO SECUNDA. Sanguinem degustavi juvenis cui post frigus passum Erysipelas in medietate faciei, colli, & pectoris advenerat. Sanguis ille organo gustûs maximè ingratham falsedinem referebat.

Quæ observationes me impulerunt ut in diversis temporibus degustarem sanguinem plurium Erysipelatibus deventorum. Nunquàm sapor talis sanguinis, sapor sanguinis sanorum similis à me fuit compertus, sed semper acer plùs vel minùs, & cum diver-

sa acrimoniæ indole.

OBSERVATIO TERTIA. Quibusdam ab hinc annis in Nosocomio Monspe-  
tensi attentè examinabam ex unâ parte  
sanguinem eductum è corporibus sim-  
plici Erysipelate detentis, ex alterâ  
parte cruorem peripneumonicorum  
pleuriticorumque. Factâ comparatio-  
ne, constanter expertus sum sæpè om-  
ninò dissolutum, numquàm verò con-  
cretum esse sanguinem erysipelatosum;  
concretionem semper apparente in san-  
guine aliarum inflammationum. Ve-  
rùm si alio morbo uti feбри putridæ,  
aut malignæ complicaretur Erysipelas,  
prædicta dissolutio exactè non obser-  
vabatur.

OBSERVATIO QUARTA. Per duos  
menses integros asservavi in patellâ san-  
guinem erysipelatosum qui eductus fue-  
rat homini laboranti Erysipelate fermè  
totam medietatem corporis occupante.  
Exsiccatas reliquias hujusce sanguinis,  
tedegi in pulverem quem injeci ad  
ignem: cum crepitibus exhalavit pulvis

ille , ingratum utique odorem spargens.

Prædictæ observationes collatæ cum symptomatis Erysipelatis, probant jure meritò admitti in materiâ Erysipelatosâ. 1°. Partes maximè mobiles & æstuantés , non compactas uti in Phlegmone. 2°. Acrimoniam nunc salsam, nunc amaram, forsàn & millenis modis variatam pro diversitate causarum Erysipelas producentium.

Materies Erysipelatis præparatur in corpore ab humorum indole spontè acri , aut ad acrimoniam vergente ; cujus acrimoniæ causæ antecedentes sunt ut plurimum bilis abundans chilo permixta , vel acrior : comestio assidua & vorax alimentorum ad acrimoniam dispositorum : reliquæ chimi in stomacho malè digerente acres factæ aut rancidæ , & tales ad sanguinem delatæ : febris acutissima , aut vehemens quælibet sanguinis agitatio , ejusdem quies absoluta vel motus imminutus : vasorum humanorum in sanguinem fortior actio.

actio quâ exaltantur sales illius & olea acria : calidior æstiva tempestas : (a) excernenda è fœminino corpore , si retineantur : humores cujuscumque cacochimiæ acris.

In peculiaribus corporis locis citò etiàm producitur materies Erysipelatis, si ibi præpediatur perspiratio ; si intempestivè applicentur repercussiva , pingua , oleosa , emplastica.

Nequè omittenda Erysipelatum productio ab ichore , sanie , pure , in textu partium ulceri vicinarum imbibitis : ab acri lymphâ hydropicorum ad crurum tibiæque superficiem transmissâ : à materiâ cariei serpente ad vicinas partes molles : ab hærentiâ humorum propter fracturam aut luxuratiōnem.

---

(a) Attendant Medici parisienses qui Monspelii Medicinam fecêre nùm Erysipelata rariora non sînt sub humido cœlo parisiensi quàm in calido & sicco climate monspeliaco .

Ergò , materia Eryſipelatis nunc per inquinatam generalem humorum maſſam ad ſuperficiem corporis deſertur : nunc breviori viâ per accidens externum intròpellitur. Prima cauſa gravior alterâ.

### *De ſede Eryſipelatum.*

Sedem habent Eryſipelata , 1°. & frequentiùs in cute cujus filamenta fibroſa rete ſuſtinent innumerabilium vaſculorum partim ſanguineorum , majori numero lymphaticorum. 2°. In tuniçâ adipoſâ cujus cellulæ milleniſ coronantur vaſculis minutiffimis. 3°. In texturâ vaſculoſâ membranarum muſculorumque ſubcutaneorum. 4°. In vaſis perreptantibus textum cellularem dictarum partium.

Non ſanguinea tantùm , ſed ut plurimùm lymphatica vaſa arterioſa afficiuntur in Eryſipelate ; errore loci , in lymphaticorum cavis hoſpitante materie eryſipelatoſâ.

*Mechanismus Erysipelatis.*

Futuri Erysipelatis conditio antecedens & necessaria est obstructio sanguinea. Hæc non adeò tenax est obstructione phlegmonodeâ. Utraque fit à causis inflammatoriis, sed gradu diversis.

Spontè ab ipsomet sanguinis circulo versùs superficiem corporis determinandas esse partes acres & mobiles sanguinis erysipelatosi, indicare videtur ipsamet sana natura quæ falsuginosum & acre liquidum perspirabile ad colatorium cutaneum tam copiosè dimittit.

Itaque ad sedes proprias delatus sanguis erysipelatosus difficilè fluit per vasa minima arteriosa, ut potè spiciusculus: tardè moto eo sanguine molestantur aliquantisper arteriolarum latera: crescit paululùm vasorum pressio lateralis: intumescit pars, sed adhucdùm insensibiliter.

Acribus sanguinis erysipelatosi parti-

culis irritantur latera vasorum, quæ hîc & illic, consequenter ad stimulum superadditum, crispantur & semetipsa obstruunt.

Maximè divisi globuli rubri sanguinis erysipelatosi & in motum æstuosum concitati non difficilè subeunt ostiola lymphaticorum ductuum in cavo sanguineorum hiantia: inibi sistunt copiosissimi: mutatur omninò ordo circulantis sanguinis & lymphæ in Erysipelate.

Porro, major semper facta hærentis materiei erysipelatosæ acrimonia majorem in parte æstum motumque intestinum concitat.

Exindè patet 1°. Minùs spissitudine quàm acrimoniâ peccare sanguinem Erysipelas producentem. 2°. Minùs distendi vasa erysipelatosæ quam phlegmonosæ, sed magis irritari. 3°. Verosimiliùs numerosiora lymphatica obstrui in Erysipelate quàm sanguinea.



*Signa Erysipelatis, & quid ex his  
præfagiendum.*

1°. Positis, in Erysipelate, leviori infarctu, non magnâ copiâ sanguinis obstruentis, nullâ illius viscositate, summâ aptitudine ad sese diffundendum; parùm tumere debet Erysipelas, extendi ad latera nullâ datâ circumscriptione sensim & sine sensu evanesens.

2°. Cùm minima fiat lateralis pressio in vasis erysipelatosi; minimus & quoquè futurus est illius Tumoris renixus.

3°. In statu sano albicabat cutis innumeris irrorata lymphaticis limpidum humorem vehentibus: rubet nunc in Erysipelate ob intròmissos globulos rubros in cava eorundem lymphaticorum. Insuper sanguis erysipelatosus magno agitatur intestino motu tum in sanguineis tum in lymphaticis; undè fluxilitas, globulorum rubrorum major

divisio, reflexio coloris rutilantis. Istud inest singulare colori Erysipelatis, quod scilicet ad appressum digiti facile subterfugiat rubedo albedini locum cedens, statim verò redeuns sublato digito premente. Cujus phœnomeni explicatio eruenda est à mobilitate materie erysipelatosæ quæ per vim prementem expulsa è vasis digito suppositis aliena vasa petit quorum vi contractivâ repellitur in priorem locum, ubi, amoto digito minor est resistentia.

4°. Sanguinis erysipelatosi acuminatæ & acres particulæ in poris & in interstitiis fibrarum sese insinuant & figunt. Undè fibrarum divulsiones, acris doloris generatrices. Quod doloris genus meræ pressioni laterali adauctæ tribuere foret absurdum.

5°. Validissima agitatio intestina, molecularum sanguinis erysipelatosi similis & ejus mobilium particularum acrium ad latera vasorum impetus & aspera collisio, explicando calori deurenti & mordaci Erysipelatis sufficiunt.

Frequentes fiunt erysipelatosæ metastases, remixtâ materiâ erysipelatosâ cum sanguine & ad alias partes amandatâ.

Ex summâ etiâ mobilitate ejusdem materiei, sequitur Erysipelas locum sæpè mutare, serpere, extendi, evanescere, & brevi apparere.

Jàm verò simplex Erysipelas, parùm extensum, levibus stipatum symptomatis, à causâ externâ productum, felicem admittit prognosim: & è contrâ, si gravis sit inflammatio erysipelatosâ, à causâ universali, in corpore cacochemico, serpens obstinatè & in dies magis diffusa.

Summus æstus dolorque acerrimus in Erysipelate, cùm denotent acrem sanguinis stagnantis indolem, præsigniunt 1°. In parte affectâ dilacerationes vasculorum textûs cellularis tenerimi, extravasationem feri acris epidermidem in vesiculas sublevantis; sanguineorum etiam ruptiones, undè sanguis acer effusus; malignæ, ichorosæ

suppurationes, gangrenæ plenæ periculi. 2°. In toto corpore febres maximè acutas, vigilias, similiaque ab acutè stimulado genere nerveo pendentia.

Mali est ominis, post intròpulsam materiem Erysipelatis, abdomen intumescere & dolere; respirationem fieri difficilem; phrenitidem advenire. In genere, maximè sunt periculosæ, quæ fiunt ab exterioribus ad interiora Erysipelatum metastases.

A retentis menstruis productum Erysipelas, iis fluentibus ut plurimum curatur. Apud hydropicos, Erysipelata feri acrimoniam prædominantem innuunt.

Varia deniquè instituenda est prognosis Erysipelatis, proût ad unam ex quatuor generalibus inflammationis terminationibus vergit ille Tumor.

### *Generalis Curatio Erysipelatis.*

Indicationes generales in curando  
Erysipelate

Erysipelate in eo consistunt, quod compescatur motus sanguinis, ejus imminuatur quantitas, mitigetur humorum acrimonia, evacuentur primæ viæ, urgentioribus succuratur symptomatis.

*Primò.* Venæ sectiones juxtà optimas artis regulas institutæ, non solùm quantitatem sanguinis ad partem inflamatam advenientis imminuunt; sed & velociorem illius motum & æstum refrænant. Imperandæ sunt morbi initio.

*Secundò.* Ardor & acrimonia humorum, in morbo erysipelatoso haud dubiè prædominantes, expetunt diætam refrigerantem & edulcorantem. Hæc versatur circà potum abundantem & lenem, cremores hordeaceos, avenaceos, juscula & aquam pulli, ptisanas demulcentes, emulsiones, &c....

*Tertiò.* Cùm pravi succi primarum viarum Erysipelata ut plurimum producant & foveant, purgantibus pluriès repetitis utendum, sed lenibus, nè æstus adaugeatur. Vomitorium exhibe-

tur antè purgantia , si pravis succis turgat ventriculus. Clisterum usus non omittendus.

*Quartò.* In doloribus Erysipelatis acerrimis propinanda sunt narcotica quæ quidè summi sunt usûs in hocce morbo: in metastasibus sanguinis erysipelatosi ad pulmones, intestina, cerebrum, cor, (a) promptius & vicibus repetitis celebrandæ venæ sectiones aut è brachio, aut è pede: in vigiliis obstinatis laudanum solidum, liquidum: in summo totius corporis æstu refrigerantia, acida, &c....

*Quintò.* Prædicta medicamenta interiorius assumpta sæpè sufficiunt ad sananda Erysipelata: attamen topica non rarò adhibentur iis curandis Tumoribus. Dùm igitur locus est topicis, cautè & prudenter perpendantur indicationes, nihil enim pejus intempestivè ap-

---

(a) Vide apud Fabric. laudanum. Erysipelas cum horroribus & oppressione cordis.

plicatis topicis suprâ partem erysipelatosam.

Simplici Erysipelati mitibus stipato symptomatis conveniunt topica leniter resolventia: Erysipelati phlegmones naturam redolenti resolventia mixta cum anodinis. Erysipelati prono ad mortificationem fortiora resolventia imò & scarificationes in parte: (a) summoperè dolenti & æstuanti Erysipelati anodina demulcentia. Et sic de variis Erysipelatum casibus diversa topica auxiliaque exoptulantibus. Topica quæque contraindicantur poros obstruentia, perspirationem supprimentia, repercussiva, narcotica. Nulla etiam applicanda Erysipelatibus faciei topica.

---

(a) Vidimus Erysipelata quæ omninò mortificata judicabantur, & tamen curata radicitùs per incisiones factas in parte. Scarificationum ope sanguis acer partes acerrimè irritans & ipsarum textum destruens evacuabatur: undè sublata imminentis mortificationis causa.

De utilitate scarificationum in casibus propositis. Vide Ledran observat. chirurgic. passim.

*Sextò.* Casus sunt peculiare quibus peculiaris competit tractatio. Et quidè, non difficilè concipitur sordescuti erysipelatosæ superstratas esse auferendas ; curandam esse luxationem aut fracturam undè factum Erysipelas aperiendas esse vesiculas erysipelatosas ichorem continentes necessariò extrahendum. Uno verbo causa continens externa Erysipelatis, quæcumque sit tollenda protinùs, ut deinceps perficiatur curatio.

Cæterùm, suppurantis, gangrænosis sphacelati Erysipelatis generalis curatio depromenda ex dictis dùm de phlegmone in suppuratum & in mortificationem abeunte.







## SECTIO SECUNDA.

*De Tumoribus  
lymphaticis.*

**D**UO sunt præcipui Tumores lymphatici Œdema & Schirrus.

Utrumque præcedit obstructio peculiaris, nempe lymphatica.

---

## CAPUT PRIMUM.

*De obstructione lymphaticâ.*

**P**ELLUCIDA hæc humorum nostrorum portio, quæ lymphæ dicitur, per canales proprios jugi fluere & liberè circulatur in statu sano; sed in quibusdam affectibus morbosis difficilè. Lymphæ stagnatio in prædictis canali-

bus obstructionem ponit lymphaticam.

Hæc fit vel in lymphaticis arteriosis, vel in degeneratione illorum in venosa lymphatica, vel in tractu venoso lymphatico; vel in areolis lymphaticorum quorundam, brevissimis emissis ramusculis, inter se aut cum venis sanguineis communicantium; vel in determinatis receptaculis lymphaticis.

Quæ ut clariùs illucescant, sciendum est 1°. Ab extremis arteriis sanguineis oriri ductus lymphaticos arteriosos quorum divisiones innumeræ suppeditant neuro-lymphatica ( *a* ) vasa omnium lymphaticorum minutissima, ramusculos emittentia ad partem quamcumque corporis, fermè insensibilia dùm in partibus nutriendis terminantur, retroflexa continuitate canalibus in minimas venulas ( *b* ) neuro-lymphati-

( *a* ) Vieussen. system. vasor. pag. 95 & 102.

( *b* ) Vieussenius syst. vasor pag. 103. asserit se humorem lymphaticum exsudantem vidisse è vasis quibus nutriuntur membranæ, seù è neuro-lymphaticis.

cas quæ in majores coëunt & in venis sanguineis desinunt. 2°. Ab ipsismet arteriolarum sanguinearum apicibus oriri alia arteriosa lymphatica quæ paulò post suam originem commutantur in lymphatica venosa, (a) valvulosa, seù bartholiniana. Hi venosi ductus à glandulâ lymphaticâ in glandulam transmigrantes, tandèm evanescent implantati vel in vasis lacteis, vel in cisternâ lumbari, vel in ductu thoracico, vel in canali rorifero bilisii, tandem & aliquandò in ipsismet venis sanguiferis.

Ubicùmque corporis reperiuntur, non-solùm neuro-lymphatica arteriosa sed & venosa quæ arteriosis multò magis sunt sensibilia: & è contrà pluribus in partibus deficiunt lymphatica

---

Non crediderim experimentum Vieussenianum factum fuisse in neuro-lymphaticis arteriosis quorum prodigiosa est tenuitas, sed in neuro-lymphaticis venosis quæ nos admittimus.

(a) Ruisch. de valvulis lymphaticor. Malpighi de structur. glandul. conglob.

valvulosa. (a) Ergò nulla est pars corporis ubi non sedeat obstructio neurolymphaticorum: quod nequaquam dici potest de valvulosis lymphaticis.

Quadruplicem agnosco obstructio-  
num lymphaticarum speciem.

*Prima*, vocatur *obstructio lymphatica valvulosa*. Fit in vasis bartholinianis minùs fluxilem lymphæ portionem vehentibus: frequentius attingit loca glandulosa quorum textus favet stagnationi lymphæ.

*Secunda*, dicitur *obstructio lymphatica arteriosa simplex*. Sedem habet in arteriis lymphaticis in venas lymphaticas valvulares, brevi post ortum, abeuntibus. Multò infrequentius primâ specie istam secundam evenire suspicandi-  
ansam præbent major dictorum lymphaticorum arteriosorum cordi proximitas, brevissimum spatium quod habent percurrendum, patula via in am-

---

(a) Ruyfch. de valvulis lymphaticor.

plas venas lymphaticas valvulares.

*Tertia*, nomen habet *obstructionis arteriosæ neuro-lymphaticæ*. Occupat minutissimos ductus arteriosos neuro-lymphaticos; succum cristallinum Vieussenio (*a*) cognitum ab arterioso sanguine secernentes & transmittentes. Obstructio hæc corpori maximè est insensata cùm nutritionis opus directè laesat & destruat: nullum est punctum corporis in quo non enascatur, cùm ubicumque implantentur vasa hæc neuro-lymphatica nutritia.

*Quarta*, cognoscetur titulo *obstructionis neuro-lymphaticæ venosæ*. Non aded frequenter evenit in interioribus quàm ad exteriora corporis, ubi copiosius disperguntur illæ venæ. (*b*) Obstructio

(*a*) Vieussen. system. vasorum. pag. 103.

(*b*) Numerosiora lymphatica cutis, cum sanguinibus communicare quamplurimum, demonstrant injectiones. Quorsum verò sanguini ibi tam abundanter infunderetur lymphæ valvulosa, quæ ex naturæ institutione, per glandulas conglobatas trajecta ad vias chyliferas defertur. Nova ratio suspicandi lymphaticas cutis esse venas neuro-lymphaticas.

hæc fons est œdematum, cutem, membranam adiposam, interstitiaque musculorum subcutaneorum, toties infestantium.

Nulla umquam futura est obstructio lymphatica, quamdiù vigentibus ut in statu sano cordis viribus, debitèque apertis tubulis lymphaticis descriptis facilis est secretio & progressus lymphæ copiâ & consistentiâ naturali donatæ in toto suo circuitu.

Verùm si vis trusiva cordis debilis sit aut imminuatur, sanguis in apicibus arteriosis lentè & difficulter progredietur, partes serosæ spontè recedent à sanguine rubro & copiosissimæ diffuentes ad latera in oscula secretoria recipientur. Hinc frequentia obstructio lymphaticarum in debilibus & infantilibus corporibus; atquè apud convalescentes, & viribus exhaustos.

Et cùm minima sit potentia renitens in parietibus lymphaticorum, facilis erit horum distentio & ampliatio ab humoribus congestis.

Liquidum vasa lymphatica distendens hæc efficit inertiora & debiliora: mox per repetitos sanguinis circuitus undèquaque affluens serum affatim tendit ubi minor ( a ) resistentia, nempe ad vasa obstructa.

Itaque fiunt obstructiones lymphaticæ cum debilitatis viribus vitalibus: & ratione contrariâ intenduntur illæ vires in obstructionibus sanguineis. Globuli rubri violenter in vasa collateralia adiguuntur ad sanguineam: ferè solo fluiditatis motu & quasi spontè in lymphaticam sese insinuat copiosius serum ad lymphaticam obstructionem. Hinc non ineptè judicarunt antiqui Tumores sanguineos à *fluxione*, lymphaticos à *congestione* oriri.

Eadem semper non est indoles materiei obstructiones lymphaticas producentis aut foventis. Modò copiosissimo

---

( a ) Per minorem resistentiam vasorum lymphaticorum obstructorum intelligo majorem facilitatem quam habet serum ad hæc vasa multum dilatata subeunda.

fero permixta omnia emollit, in œdematosis: modò ficcatur & concrefcit, in fchirrosis: nunc viscosa & falluginosa carnes putrefacit, in fcorbuticis: nunc in particulas summè tenues & duras conformatur, in fiphiliticis: aliquandò summâ & peculiari viscofitate difficillimè emendandâ peccat, ut in fcrophulosis, &c.

Crebriùs autèm obftructio lymphatica fimplex, de quâ hîc, nascitur à temperie cachecticâ; à reliquiis morbi prægressi; à pravo victu; ab impressionibus aëris humidioris; ab externis comprimentibus; ab acriori frigore; ab iis quæ corporis vires exhauriunt, & ab aliis millenis caufis.

In obftructionibus lymphaticis obfervandum fedulò nùm cum viru quopiam complicentur, an fimplices fint? nùm essentialiter exiftant per fe illi Tumores, an ab alio morbo promanent? nùm ad exteriora tantùm & in extremitates corporis diffundantur obftructiones lymphaticæ, an viscera & quo-



què contaminentur? nùm oriantur à causâ particulari, an verò à depravatione generalis humorum massæ?

Obstructio lymphatica valvulosa & venosa neuro-lymphatica longè latèque extenduntur in partibus molli-  
bus. Gravia sunt harum symptomata, dùm obstruuntur viscera, ut in œdema-  
te pulmonum: mitiora ab obstruc-  
tione externarum partium.

Obstructio neuro-lymphatica arte-  
riosa labe clandestinâ destruit usquè ad  
ossis intimius.

Obstructiones lymphaticæ, in gene-  
re, functiones debilitant; corpori iner-  
tiam conciliant; plurium secretionum  
munus pervertunt.

Ad ponendam obstructionem lym-  
phaticam; quæcumque sit, requiritur  
vel ut imminuatur vasorum receptacu-  
lorumque lymphaticorum cavitas; vel  
ut adaugeatur lymphæ moles; vel  
uno eodemque tempore utrumque  
fiat.

---

## CAPUT SECUNDUM.

### *De Oedemate.*

**A** Materiâ frigidâ & nominatim pituitosâ ortum ducere Tumores œdematosos existimabant Antiqui, apud quos, in duas differentias statim scindebantur illi Tumores; scilicet in veros seu legitimos quos à pituitâ naturali, in falsos aut illegitimos quos à pituitâ non naturali eruebant. Dein ex diversis pituitæ qualitatibus varia explicabantur Œdematum phænomena. Jamdudùm corrui hæc vetus theoria.

Hypocrates alique plures, omnes omninò Tumores generico œdematis vocabulo designabant; undè certè in distinctione Tumorum enata confusio.

Nunc verò à Tumoribus inflammatoriis non solùm segregatur Œdema, sed & exactissimè à cæteris Tumoribus

frigidis aliisque quibuscumque distinguitur.

Hujus notæ sunt sequentes, partis elevatio, color subalbidus aut cuti concolor, indolentia, frigiditas, circumscriptio, mollities quæ prementi digito facilè cedit, foveâ excavatur foveæque vestigium diù retinet.

*Quanam sit sedes Oedematum?*

Ubicùmque reperiuntur vasa lymphatica majora, (a) ibi sedem suam ponit Œdema aut Tumor œdematosus. Ergò toti fermè corpori infidet.

Ast Œdemate exteriori, quod describimus afficiendæ partes sunt, 1°. Tegumentum commune cutaneum, filamentis sericea (b) fila non malè referentibus compositum, elegantissimis retibus sanguineo & lymphatico orna-

---

(a) Nempè venosa neuro-lymphatica, & lymphatica bartholiniana.

(b) Ruyseh. cathalog. rariorum tom. I. pag. 138.

tum ; intrâ fibrosa interstitia admittens à superiori parte mucosas expansiones minutissimas corporis reticularis Malpighiani , ab inferiori demissas laminulas textûs cellularis , atquè vascula lymphatica exilissima. 2°. Communis tunica adiposa efformata cellulis adiposis variæ formæ & capacitatis , maximè dilatâbilibus , insignitis aggerie vasorum sanguineorum , lymphaticorum , adiposorum ( *a* ). 3°. Cellulosa interstitia fibrarum fasciculorumque musculorum sub tegumentis positorum. 4°. Textus cellularis repens intrâ omnes illas partes.

### *Causa Oedematis.*

Causæ occasionales Oedematis sunt,

---

( *a* ) Admiserat in opere de omento , vasa adiposa Malpighius : in operibus posthumis confitetur ingenuè se illorum vasorum existentiam non adhuc integrè asserere audere.

Eadem vasa adiposa clarè demonstravit Vieussenius system. vas. pag. 99. & reipsâ existunt.

*Primò*

*Primò.* Eæ quæ nimiam feri & lymphæ copiam dimittunt ad cutem, tunicam adiposam, textum cellularem aut ad vicinas partes. *Secundò.* Eæ quæ ibidem oscula secretoria lymphatica nimis dilatant, aut fines venosorum lymphaticorum obturant. *Tertio.* Eæ quæ texturam lymphaticorum aqueis partibus imbibunt, laxiorem reddunt, nimisque dilatabilem. *Quartò.* Eæ quæ subtilissimum serum è vasis textûs cellularis secretum in cellulis ejusdem textûs diutius remorantur. *Quintò.* Eæ quæ tractûs lymphatici tam arteriosi quàm venosi capacitatem imminuunt. *Sextò.* Eæ quæ impediunt quòminus materies lymphatica benè elaboretur in sanguine. *Septimò.* Eæ quæ lympham secretam crassi præternaturali contaminant.

Quibus diversis efformandi Œdematis modificationibus ansam præbent constitutio serosa, cachectica; debilia organa vitalia senum, puerorum, convalescentium aliorumque; cibi visceri, crassi, glutinosi; vita sedentaria &

quæcumque iners corpus efficiunt; ingurgitatio liquorum sanguinem nimis dissolventium aut morbosam molecularum inæqualitatem producentium; retenta menstrua aut illorum fluxus immodicus; quædam serosæ excretiones imminutæ; tristes & diù detinentes animi affectus.

Ergò organa digestiva, chilificantia, sanguificantia, circulatoria, secretoria, excretoria, animalia, suo quæque modo ad *Œdemata* producenda concurrunt magis aut minùs remotè.

Nunc verò inter accidentia externa è quibus *Œdema* promanat annumerentur compressiones, ligaturæ, contusiones, ictus, casus, immersio in frigidam, acere frigus diù passum, aër humidior.

Si propter unam aut plures ex conditionibus enarratis eveniat lympham copiosius hæere in emollitis & relaxatis vasis receptaculisque lymphaticis membranæ adiposæ, cutis, textûs cellularis, muscutorumque subtegumento-

forum: illicò Œdema producitur.

*Mechanismus & Symptomata  
Œdematis.*

Ab inflammatorio opere prorsùs differt efformatio Œdematis: vigent enim vires cordis & arteriarum in mechanismo inflammationis; languent è contrà in Œdematis mechanicâ: subitò hæret sanguis in vasis inflammatis; tardigradè obstruuntur & dilatantur ductus lymphatici œdematosi.

Quæ ut faciliùs percipiantur, attendendum ad sequentia. 1°. Eò majorem futurum esse refluxum lymphæ in latera vasorum, quò major est ejusdem contentæ quantitas. 2°. Crescere pressionem hanc lateralem ab spissiori factâ lymphâ obstruente. 3°. Flexilia esse admodùm & dilatatu facillima vasa lymphatica ob nativam tenuitatem. 4°. Partium integrantium & fibrarum vasa lymphatica componentium cohæsionem esse minimam ratione texturæ illorum vasorum.

Iis itaque positis, si à causâ quâcumque ad vasa cutis, membranæ adiposæ, aut muscutorum subcutaneorum naturali major determinetur lymphæ copia; aut si ille liquor spissior sit; pedetentim fiet obstructio lymphatica: columnæ lymphaticæ antecedentes subsequenter obfistent: novi succi lymphatici fiet aggestio, repletio lymphaticorum, major dilatatio flexibilium parietum: ponetur *Œdema incipiens*.

Interim serum redundans & stagnans ab spiciusculis lymphæ moleculis segregatum fluitabit ad latera lymphaticorum; sese insinuabit intrâ poros, fibras, membranulas; debilis ex suâ naturâ debilior evadet cohæsió solidorum in lymphaticis; numerosiora procreabuntur in ipsorum textu interstitiola; serositas imbibet, relaxabit, emolliet non solum vasculosam texturam lymphaticorum, sed & etiam omnes partes circumpositas; hinc *mollities* Tumoris: & à flaccidis fibris nerveis *indolentia*.

Progrediente malo abundantius se-



rum replebit cellulas tunicæ adiposæ ; id penetrabit intimius texturam vasorum sanguineorum lentum & serosiorum sanguinem ipsamet vehementium : vasa hæc reddentur inertia ; languida in iis peragetur circulatio sanguinis , languidiores lymphæ motus concomitans : hinc defectus agentium quibus debetur calor in nostro corpore & consequenter Œdemati adveniens *frigiditas*.

Porro redundans in œdemate lymphæ subalbida , colorem sibi proprium trans epidermidem reflectit ; ita ut magis *albicet* ille Tumor , cum magis turgescencia vasa lymphatica majorem superficiem exhibeant ; minus albicet , ratione contrariâ.

Nequè difficile concipitur à tantâ feri copiâ adeò debere infringi partium solidarum in Œdemate elaterium , ut comprimente digito in foveam excavetur ille Tumor *diutissimèque servet foveæ vestigium* , tum propter fibrarum ineptitudinem ad sese restituendum , tum propter lentorem stagnantis lym-

phæ tardissimè hùc redeuntis undè expulsa fuerat. Quo maximè essentiali (a) symptomate Œdema distinguitur à Tumore seroso qui compressus illicò restituitur.

Ergò novus omninò status partis quæ œdematosa facta est. Hæc dicitur laborare Oedemate propriè dicto, dùm liquor obstruens ità distendit vasa à centro Tumoris remotiora ut per *circumscriptionem* distinguantur à vicinis sanis circumambientibus. Diffusus Tumor ille, absque ullo posito termino, Tumor œdematosus nuncupatur. Iste frequentius advenit altero.

Ex quâ brevi & simplici Oedematis mechanicâ collatâ cum causis jàm suprà relatis, explicatur cur corpori cachectico, senili, infantili, debilitato, exhausto, à morbis resurgenti, adeò frequentes Tumores œdematosi? Cur

---

(a) Non adest illud symptoma in œdemate hysterico Sydenhamii quod pendere dicunt à simplici congestione lymphæ in cellulis adiposis absque solidorum imbibitione.

illi apud gravidas? Cur iis Tumoribus extrema corporis præsertim inferiora afficiantur? Cur difficiliùs discutiantur Tumores œdematosi ab internâ causâ producti quàm ab accidenti externo? Cur rarò in moderatè exercitatis corporibus adveniant illi Tumores.

### *Terminationes & Prognosis Oedematis.*

Plerumque *resolutione* terminatur simplex Oedema: vasa enim laxa & meabilia partis œdematosæ lympham aut medicaminibus aut solius naturæ nisu attenuatam faciliè resorbent, aliorsùm abducunt nempè in communem humorem circulum; vel hæc extrà corpus avolat per transpirationem. Caveas nè exsiccantibus nimis fortioribusque solventibus topicis tractatum Oedema in induratum abeat.

Rarò per *suppurationem* solvitur Oedema, quippè inflammationi, quæ necessariò suppurationem antecedit, repugnant & causa frigida continens

Oedematis, & plurimùm laxa inertiaque vasa, & sanguis ferofus œdematosus. Si tamen causâ quâpiam adaugente motum vitalem aliquando inflammetur Oedema, nuncupabitur *Oedema phlegmonodes* vel *erysipelatodes*. Quod quidem utrumque semper habet signa peculiariora quæ Tumorem œdematosum redolent, & quibus ab aliâ quâcumque inflammatione distinguitur Oedema inflammatorium. Languens est, serosa, tædiosa multùm suppurationis illius Tumoris. Pertimescendæ clandestinæ tales suppurationes œdematosæ, quæ aliquandò absquè ullo incendio vicinas partes corrumpunt fistulasque creant aut noxios abscessus.

Si fluidiore lymphæ parte dissipatâ, materies concreta remaneat, Tumor indurescit, fit *Oedema schirrodes*.

Ponitur & etiâ *Oedema gangranodes* dùm per abundantiam vel per acrimoniam stagnantis feri, aut per aliam causam quamcumque suffocatur superstes in parte motus vitalis; sive integra

tegra remaneant vasa, quod perrarum; sive disrumpantur cum effusione liquidi & ulteriori corruptelâ: periculosissima hæc terminatio ob curationis difficultatem (a).

Oedema quod per se existit plerumque vacat periculo; grave autem censendum, si à morbo antecedente gravi oriatur; eoque tunc magis periculi secum importat, quò major est morbi primarii sævities: sic Tumores œdematosi qui phthisim pulmonarem, corporis consumptionem, hydropem concomitantur magis certè sunt periculosi quàm iidem Tumores quos chlorosis procreat. Tanquàm symptoma spectatum Oedema non curatur nisi exhausto fonte è quo scaturivit nempè morbo primario curato.

Oedematosi Tumores gravidis familiares spontè recedunt faustum post

---

(a) Cavè à gangrænâ quæ frequenter supervenit Oedemati penis seu bullæ cristallinæ, nisi promptum feratur auxilium.

partum : in corpore senili rarò curantur  
 deficiente sibimet naturâ : in ætate flo-  
 ridâ aut feliciter tolluntur, aut diu  
 subsistunt servato reliqui corporis statu  
 sano : in convalescentibus spontè ut plu-  
 rimùm discutiuntur dummodò benè se  
 habeat generalis humorum massa. Me-  
 liùs est ab accidenti externo fieri Oede-  
 ma quàm à causâ internâ. Tumores œ-  
 dematosi in ultimâ phthiseos periodo  
 certa & constantia sunt proximæ mor-  
 tis indicia. Fallimur aliquandò in di-  
 judicandis Oedematibus (a).

### *Curatio Oedematis.*

In Oedematis curatione attenden-  
 dum an Tumor ille sit alterius morbi  
 symptoma, an existat primariò & per

---

(a) In sepulchret. anatom. Boneti legitur observa-  
 tio Oedematis quo studiosus Patavinus laboraverat in  
 volâ per menses aliquot. Simplex Oedema apparebat :  
 mox verò factò ulcere in volâ, institutâ fuit manûs  
 amputatio, & per dissectionem ossa metacarpii cariola  
 reperta sunt. Tom. 3. pag. 28,.

se. In primo casu peculiaris non requiritur medela quæ frustra tentaretur, morbi fomite in affectibus primariis existente: in secundo casu sequens curandi methodus locum obtinet.

1°. Si, reliquis benè se habentibus in corpore, pars œdematosa tantummodò laboret, solis topicis utendum resolventibus, exsiccantibus, corroborantibus, discutientibus, quorum ope lymphæ spissior dividitur, serum copiosius dissipatur, laxa Oedematis vasa corroborantur, exsiccatur pars & fit resolutio.

2°. Si ortum ducat Oedema & foveatur à pravâ fluidorum diathesi, tunc, non solùm topicis sublevandum Oedema, sed & etiam remediis internis generalis fluidorum massa castiganda est. In hunc finem bonus fit sex rerum non naturalium usus, ab humidiori aëre recedat æger, caveat à balneis, moderato gaudeat exercitio vitæque sedentariæ non indulgeat.

Intereà exhibeatur catharticum è

classi hydragogorum depromptum, quod valeat non solum pravos succos è primis viis eliminare, sed ad colatorium intestinale affluens copiosius serum exprimere, expurgare; atque etiam operantium medicamentosarum quæ sanguini admiscentur, lympham spissiorum dividere & attenuare.

Expurgatis primis viis, morbus in sua origine est debellandus. Ideò præscribuntur aperientia, diuretica calida, hydragoga, stomachica calida, sub diversis formulis & ad varios virtutis gradus. Iis enim auxiliis vitia lymphæ & partis serosæ sanguinis castigantur; dividuntur spissiores moleculæ lymphaticæ; aqua superflua ad diversa colatoria determinata evacuatur, omnibus humoribus conciliatur consistentia naturalis & æquabilitas.

Fracturæ & luxationes quæ Oedematum aliquandò causæ existunt, postulant ossium reductionem ad situm naturalem & applicationem topicorum quæ in illis casibus fiunt ex miscelâ



adstringentium & resolventium.

Aliæ indicationes curatoriaè facile eruuntur ex diversis causis & symptomatibus Oedematis.

Jàm verò ex suprà dictis, patet 1°. Duplicem in tractatione Oedematis vitandum esse errorem; nè scilicèt humorum resolutionem tentando, ulteriùs relaxentur solida, ut cùm imprudenter topica ex plantis resolventibus & emollientibus Oedemati simplici applicantur: & è contrà dùm fortioribus adstringentibus fluidior pars lymphæ exprimitur sicciore parte superstite.

2°. Quò potentiùs attenuanda est lymp̃ha & quò majori copiâ evacuandum est serum, eò fortiora seligenda esse remedia tùm interna tùm externa: mitiora verò ob minorem quantitatem & spissitudinem lymphæ, atque ob Tumoris summam propensionem ad resolutionis exitum.

3°. Irritis remediis externis quibuscumque applicatis Oedemati à vitio locali; si tunc temporis quidpiam fu-

nesti timeatur ab aggerie feri acrioris facti ; protinùs recurrendum ad ferrum ignitum ( *a* ) parti applicatum cujus efficaciam dissipatur serum coarcevatum, fibræ molliores exsiccantur, abbreviantur & retrahuntur, undè hujusce Oedematis medela.

4°. Deniquè patet non solùm inutilem esse venæ sectionem in tractando Oedemate, sed & noxiam. Verùm si inflammatio aut aliud symptoma sanguinem mitti expostulent, cautè & prudenter tunc se gerere debet Medicus.

---

( *a* ) Ferrum ignitum cum successu adhiberi in quâdam specie Tumoris œdematosi carpo & metacarpo advenientis testantur Guido de Cauliaco, cap. 4. tract. 2.

Et Marc. Aurel. Severin. de la. Medecine efficace, tom. 1. pag. 616.



---

## CAPUT TERTIUM.

### *De Schirro.*

**Q**UOD lapideum apostema apud Arabes, nos cum Græcis & Latinis Schirrum vocamus. Schirrus autem est Tumor renitens, durus, indolens, albus, aut cuti concolor, nunc magis, nunc minùs prominens.

Glandulosas potissimùm corporis partes aggreditur Schirrus. Sit itaque.

### *De obstructione glandulosâ.*

Nihil obscurius genuinâ structurâ glandularum: undè summâ difficultas in exponendis ipsarum obstructionibus.

Triplex statuenda est obstructionis glandulosæ species. Prima, nuncupabitur *obstructio glandulosa simplex*: Secunda,

*obstructio glandulosa conglobata*: Tertia, *obstructio glandulosa conglomerata*. In iis autem includuntur obstructiones quæcumque humanis glandulis advenientes.

1°. *Obstructio glandulosa simplex* est obturatio excretoriorum ductuum glandularum simplicium, aut aliud quodlibet impedimentum ratione cujus excernenda quædam liquida, in dictis glandulis præternaturaliter retinentur.

Imminet hæc obstructio si ab extremitatibus arteriolarum sanguinearum circa folliculum glandulæ simplicis (*a*) ramificatarum nimia quantitas liquidi secernatur: si nimis patula sint secretoriorum glandulosorum oscula & in folliculum admittantur moleculæ majoresquàm par est: si in cavo folliculi inspissetur secreta materies quæ vas excretorium tranare non poterit: si glutinosior contenta materies folliculi

---

(*a*) Malpighii opera posth. epist. ad Soc. Reg. angl. pag. 1.

parietibus adhæreat tenaciter : si à compressione imminuatur folliculi cavitas : si ab stimulo quopiam irritata membrana folliculi vi contractivâ sibi propriâ cavum & etiâ minus efficiat : si obturetur vas excretorium glandulæ : si laxi nimis glandulæ parietes facilius cedant appellentibus liquidis.

Facta obstructio glandulosa simplex producit nimiam pressionem lateralem in parietes folliculi , distensionem illius, compressionem vasculorum fibrillarumque nervearum circa folliculum diramatarum ( *a* ) : inspissationem , exsiccationem , acrimoniam stagnantis humoris : læsam secretionem & excretionem liquidi glandulæ obstructæ proprii ; & quæ ex his fluunt.

Multiplici ex respectu eruuntur differentiæ obstructionum glandulosarum simplicium. 1°. Ratione molis glandulæ.

---

(*a*) Malpighii opera post. epist. ad Soc. Reg. anglie. pag. 1.

Aliæ enim glandulæ simplices minimæ sunt, ut miliares; aliæ majores, ut sebaceæ; aliæ mediocres, ut solitariae intestinales. Datis iisdem causis obstruentibus, facilius obstruitur glandula simplex minor, majori. 2°. Ratione figuræ glandulæ, quæ varia observatur, ovalis, rotunda, oblonga, lenticularis, superius excavata. Undè intimius perscrutatur mechanica obstructionis in glandulis simplicibus cognitis diversimodè configuratis. 3°. Ratione ductûs excretorii qui strictissimus in certis glandulis simplicibus, ut in sudorificis (a); amplior in aliis, ut in ple-

---

(a) Observatio facta à Ruyschio probat, mirum in modum ampliari posse canales excretorios nostri corporis etiam minutissimos. Celeberrimus ille Anatomicus vidit puellam quæ certis temporibus patiebatur sudoris sanguinei excretionem. Illud autem inerat maxime advertendum in prædictâ excretionem quod scilicet sanguis saliendo excernebatur sanguinis arteriosi more. Undè meritò concluderetur ab arteriis sanguineis cutis cruorem subire dilatatos ductus excretorios perspiratorios.

Legatur hæc observatio apud Ruysch. tom. 2. ad ver. anatomic. dec. 3. pag. 13.

risque sebaceis. 4°. Ratione sitûs folliculorum glanduloforum, quorum aliqui sub planis muscularibus locantur forsàn & à fibris carneis circumambiuntur (a) undè compressio folliculi & facilior excretio; dùm alii è contrà nullas habent fibras carneas vicinas, quibus contractis emulgeantur. 5°. Ratione vicinix respectivæ glandularum. Quædam solitariè disponuntur, neque vicinas habent glandulas quas comprimant, aut à quibus comprimantur, tales sunt intestinales solitariae; ratione contrariâ in glandulis plexiformibus, coacervatis, ampliari non potest unus folliculus quin vicinorum compressorum cavitates imminuantur majorque fiat in parte obstructio. 6°. Demùm ratione materie in diversis glandulis simplicibus secretæ, quæ oleosa in sebaceis, subsalsa in miliaribus, fluxilior in intestinalibus solitariis, spissior

---

(a) Malpigh. epistol. ad Societ. Reg. anglie pag. 1.

in racemosis & plexiformibus.

Causa continens obstructionis glandulosæ illud est, quod secretæ in glandulis simplicibus materiei excretionem præpedit. Causæ occasionales sunt eæ quæ tum in interioribus progenitæ tum ab exterioribus advenientes, causæ proximæ & continenti producendæ magis aut minùs remotè concurrunt.

Ab obstructis glandulis simplicibus fiunt in cute tubercula, papulæ aliique parvuli Tumores qui ut plurimum nihil habent infausti, & quorum plura artis auxilium non demerentur. In visceribus pejora sunt prædictarum obstructionum morbosa phœnomena.

Obstructionis glandulosæ simplicis sedes externæ sunt palpebrarum facies interior & limbus, ductus auditorius externus, aliæ partes exterioris auris, nasi externam cavitatem obvestiens membrana, oris cavum cutisque universa.

2°. Toties ponitur *obstructio glandulosa conglobata*, quoties humor lymphaticus ad corpora quædam, glandulæ



conglobatæ , dicta , delatus , non eâdem proportione ex iis egreditur quâ ingressus fuerat.

Hæc obstructio oritur ex nimiâ copiâ lymphæ ad glandulam conglobatam delatæ : ex mixtione ejusdem cum partibus heterogeneis inspissantibus potissimùm : ex chili crassioris adventu ad quasdam glandulas ut ad mezentericas : ex externâ compressione factâ in glandulam : ex nativâ malâ conformatione glandulæ humores in textu suo difficulter transmittentis : ex nimiâ densitate & crassitie membranæ glandulam exterius investientis : ex nimiâ vi contractili carnearum fibrarum ( *a* ) sub exteriori membranâ glandulæ positarum : ex debilitate textûs fibrosi glandulæ : ex nimiâ dilatatione arteriarum venarumque sanguiferarum quæ corpus glandulæ subintrant & suprâ fibras carneas

---

( *a* ) Malpigh. opera post. Epistol. ad Soc. Reg. angl. p. 2.

disperguntur: ex præternaturali distensione uniûs aut plurium loculorum seu folliculorum intrâ glandulam positorum: ex effusione liquidi per disruptos ipsosmet loculos: ex calore nimio tum febrili, tum locali partes aqueas & subtiliores lymphæ in glandulis contentæ dissipante: apud infantes ex pravâ lactatione aliisque causis: in omni ætate ex labe hereditariâ lympham coinquinante.

Folliculorum, qui in glandulâ conglobatâ continentur, existentia, tam luculenter à Malpighio demonstratur, ut circâ hoc expertissimi illius Anatomici verba ipsamet transcribenda esse judicaverimus....

» In medio cujuscumque areæ loca-  
 » tur locus seu folliculus glandulosus,  
 » qui rotundâ vel ovali constat formâ,  
 » & ex majori minori-ve contenti cor-  
 » poris copiâ amplior vel contractior  
 » redditur. Membranâ candidâ integra-  
 » tur molli, quæ evacuato humore in  
 » se ipsam collabitur, & si secetur con-

» cavitas obvia fit, & perfimilis est glan-  
 » dulis lienis. Interdùm gemini loculi,  
 » vel tres in eâdem areâ continentur.  
 » Quoniam tamen contrectatis glandu-  
 » lis hujusmodi loculi exinaniti contra-  
 » hñntur & obturantur, ideò non per-  
 » petuò facilè patent, & per plura  
 » lustra meam mentem & oculos du-  
 » bios reddidère; tandem in glandu-  
 » lis ægrotantium Boùm & similibum ef-  
 » fulsit lux; interdùm autem adauctas  
 » glandulas ad latitudinem manûs de-  
 » prehendi, in quibus loculi tartareâ  
 » materiâ referti ità turgebant, ut exi-  
 » guâ indagine paterent. Deductâ igi-  
 » tur observatione in minùs morbosas,  
 » & postremò in integrè sanas, vèra  
 » patuit compages. In exaratis itaque  
 » glandulis quæ obstructæ dicuntur  
 » folliculorum membrana solidior &  
 » crassior existit, factâ comparatione  
 » cum sanis, & circà ipsas manifestio-  
 » res propagines vasorum sanguineorum  
 » varicosæ & reticulares quas interdùm  
 » in loculis grandioribus & quasi rubi-

» cundis admiratus sum. Ut autem in  
 » singulis glandulis emergeant loculi,  
 » exterior portio glandulæ lustretur,  
 » nam singuli Tumores exturgentibus  
 » intùs loculis patent, & sectâ glandulâ,  
 » sub ipsâ membranâ loculorum ordines  
 » fibrarum areis circumscripti occur-  
 » runt. Glandularum expositi folliculi  
 » replentur humore quodam cinereo,  
 » & parùm diaphano, si in naturæ  
 » statu spectentur : cæterùm ægro-  
 » tante animali diversa corpora con-  
 » tinentur ; ut plurimùm tartarei mu-  
 » cosique humores, vel concreti succi,  
 » ut in reliquis Tumoribus passim ob-  
 » servamus.

Et paulò infrâ.....

» Aliud quoque addam quod casu mihi  
 » observandum in Bove contigit, in  
 » quo tres glandulæ cavæ hepatis parti  
 » monstruosè adauctæ hærebant, ità ut  
 » quælibet magnitudinem ovi anserini  
 » æquaret : & cùm lymphaticum vas  
 » insigne pluribus furculis in unam ex  
 » expositis glandulis productum appare-  
 ret,

» ret, immisso atramento syringâ in-  
 » trà exaratum lymphaticum versùs  
 » glandulam, illicò exteriùs emersêre  
 » loculi glandulam conglobatam com-  
 » paginantes atramento turgidi, & in-  
 » gens portio ejusdem glandulæ deni-  
 » grata est, turgentibus reliquis lym-  
 » phaticis furculis ultrâ productis; fac-  
 » tâ deindè loculorum apertione, a-  
 » tramentum in singulis stagnabat.

Hæc Malpighius in operib. posthum. epistol. ad Soc. Reg. anglic... Attentè & quoquè perlègantur ea quæ ad demonstrationem folliculorum glandulas simplices constituentium protulit immortalis Boërhaavius in epistolâ anatomicâ ad Ruyschium.

Obstructio glandularum conglobatarum non potest dici strictè loquendo, morbus in excretionem læsâ, (quod verum est de aliarum glandularum obstructionibus) fit enim tantummodò in conglobatis simplex transmissio lymphæ valvulosæ alibi secretæ. Frequentior est hæc obstructionis species in ju-

venili ætate quàm in senili. Marcescunt enim & sæpè ad simplicem membranam rediguntur conglobatæ glandulæ in provectioribus.

Natam in humano corpore obstructionem glandulosam lymphaticam subsequuntur effectus diversi pro diversitate organorum quibus insident glandulæ obstructæ. In genere ab obstructis glandulis conglobatis sanguis defraudatur parte illâ mucilaginosâ & tenui quæ post diversos circuitus arteriosa nennvro-lymphatica invadit ut corpori nutrimentum suppeditet ipsiusque deperditiones resarciat: quod annotetur præcipuè in obstructionibus glandularum mezentericarum.

Ab humore lymphatico abundanti & serosiore crescit moles glandulæ, ejusque textus fit laxior: à lymphâ ficcâ & concretâ indurescit corpus glandulosum: ab acriori & copioso succo lymphatico distensæ eroduntur & destruiuntur membranæ glandulosæ.

Præcipuæ glandulæ conglobatæ qua-

rum aucta moles ad exteriora corporis prominet sunt lymphaticæ parotides & lymphaticæ maxillares Winslovii; quædam aliæ in collo dispersæ; lymphaticæ axillares; claviculares; thoracicæ externæ; adiposæ abdominis; inguinales, &c.

3°. Obstructæ glandulæ conglomeratæ quales sunt pancreas, parotides, maxillares, tertiam constituunt obstructionum glandulosarum speciem; nempe *glandulosam conglomeratam obstructionem.*

Notum est omnibus eâdem vi contractivâ cordis quâ sanguis in arterias protruditur, alios humores è penu sanguinis depromptos trajici in orificia vasorum secretoriorum non figurâ sed amplitudine inter se tantùm discrepantia.

Ergò contracto corde, sibi adaptata liquida recipient ductus secretorii glandularum conglomeratarum.

Quamdiù in prædictis glandulis secretiones & excretiones ritè peragen-

tur, tandiù nulla dabitur harum obstructioni occasio.

Hanc verò producunt aut abundantiores aut spissiores moleculæ liquidi secreti : imminutio cavitatis minutissimorum ductuum ad canalem glandulæ communem confluentium : præpeditus liquidi transfluxus per strictiorem viam ductûs communis excretorii : prava mixtura alterius humoris cum liquido glandulæ obstruendæ, uti fit urinæ refluxu ad glandulam conglomeratam : obturatum orificium externum ductûs excretorii communis : uno verbo, quodcumque valet aut excretoriorum cava minora efficere, aut molem transfluentis liquidi majorem, vel utrumque.

Quid ex obstructione glandulosâ conglomeratâ corpori eventurum sit patebit ex causâ obstruente, symptomatibus, naturâ liquidi in obstructâ glandulâ secreti, situ glandulæ partiumque vicinarum, temperie ægrotantis, morbi complicatione, &c.



*De sede Schirri.*

In omnibus humanæ machinæ partibus mollibus enasci Schirros probant observationes medicæ & apertiones cadaverum. Iis Tumoribus sæpè infestatur substantia hepatica, lienaris, pancreatica, renalis: ventriculo & intestinis supernascuntur Schirri: Schirro uteri & mammarum non rarò laborant mulieres: eo Tumore afficitur & quoquè vesica urinaria: & sic de cæteris organis interioribus quibus, datâ causâ, Schirri adveniunt.

Horum sedes frequentissimæ sunt loca glandulosa & organa secretoria tùm lymphatica, tùm alia.

Schirri exteriores occupant inguina, testes, mammas, axillas, collum, interiora oris, nares, oculos, cutem, tunicam adiposam, textum cellularem, musculos, membranas quæ investiunt ossa, cartilagine, tendines, ligamenta; & glandulas præsertim omnium illarum partium.

Eo autem jure sedes communior Schirri sunt glandulæ, 1°. Quia summè intricata est ipsarum compages anfractibus folliculis, vasculosis glomeraminibus immiffariis emissariis ductibus, &c..... Exindè enim de facili vitiantur glandulæ à congestionibus factis, minimâque datâ causâ obstruuntur. 2°. Quia hærent obstinatè obstruentia liquida in glandulosis carceribus. De summâ propensione glandularum ad obstructions differens Malpighius advertit optimè, *naturam tam multiplices glandulas condidisse, ut deficientibus aliquibus, aliæ presto essent.*

### De Schirri materiâ.

Schirros ab atrâ bile generari dixerunt antiqui. Mirificam mixtionem instituebant pituitæ præternaturalis & humoris melancholici naturalis: undè Schirri materia. Ab humore crasso & viscido illos Tumores produci Galenus evulgavit. Deîn, ex obstruente san-

guine partibus subtilioribus spoliato, coagulato & indurato existimarunt aliqui Schirros progigni. Tandem inter recentiores ( *a* ) pinguedo concreta & corrupta hærens in tunicâ cellulosâ glandulæ, pro genuinâ materiâ Schirri assignata fuit.

Etiamsi succus lymphaticus concretus & induratus, pro Schirri materiâ, iure meritò hodiè admittatur; attamen minutiùs rem perscrutando evidens est succum illum non unicam esse Schirrorum diversorum materiem. Et enim liquidum pancreaticum ( *b* ) concretum in ductibus virsungianis; indurata in biliferis biliosa ( *c* ) materies; in criptis folliculisque propriis indurescens ( *d* ) sebaceus humor; con-

( *a* ) Gorteri chirurgia repurgata, pag. 289.

( *b* ) Passim apud omnes fermè observatores leguntur Schirrorum pancreaticorum exempla.

( *c* ) Schirri hepatici qui adeò frequenter infestant infantes; homines melancholicos; virgines ictericas, chloroticas.

( *d* ) Morgagnius pluribus in locis. Boërrhavius epistol. anatomic. ad Ruysch.

crescens in glandulis pituitariis mucosus ( *a* ) narium succus ; hærentes & indurati in glandulis vasculisque secretoriis intestinalibus ( *b* ) succi intestinalium ; in lapideam indolem ( *c* ) commutatus feminalis liquor : ex iis omnibus observatis certò concluditur non solùm lympham propriè dictam , sed plures alios humores secretorios concurrere ad suppeditandam Schirrorum materiem.

Ergò duplex admittenda species materiei schirrosæ. Prima merè est lymphatica ut in Schirris glandularum conglobatarum. Altera minùs simplex dicitur biliosa, salivaris , urinosa , feminalis ; totque variis insignitur nominibus. quot sunt diversa colatoria in quibus fiunt Schirri.

( *a* ) Ruysch. epist. anatomic. 9.

( *b* ) Stalpartius. tom. 1. observat. pag. 237. Fabric. Hildanus centur. 2. observ. 86. pag. 293.

( *c* ) Vidi Parisiis mense Septemb. 1752 in cadavere rustici cujusdam testiculum cui supervenerat Schirrus pugni magnitudinem æquans : à compressione ortum fuisse testabatur ægri relatio : dissecuri Tumorem in cujus cavo reperi pulverem marino prorsùs similem.

Fatendum

Estendum tamen, inter varios humores, succum lymphaticum, palmam præripere in Schirris producendis: forsàn & nullus fit Schirrus à materiâ secretoriâ quâcumque, quòn materiæ schirrosæ permisceantur partes lymphaticæ.

Similis igitur natura materiæ œdema & Schirrum constituentis, scilicèt lymphatica: eò cum discrimine quòd multo sero permixta aquosisque partibus dives lymphæ œdematosa cuncta emolliat & relaxet; dùm ficca, concreta, dura lymphæ schirrosa, corporis solidi ad instar hæret præfixa parti schirrosæ.

Itaque nunc probè novimus quænam sit præcipua Schirrorum sedes; novimus & etiàm quænam sit ipsorum materies.

Ad illius productionem concurrunt constitutio phlegmatica, melancholica, cachectica; vita sedentaria, aut nimis exercitata; sanguis vel ex nativâ indole, vel per accidens mucosus, ter-

reus ; massa generalis lymphæ crassæ & tenacis, aut in grumos inspissatæ ; viru quodpiam ex genere coagulantium lympham inquinans ; humores secretorii quicumque nimiam copiam partium fibrosarum, oleosarum, terrearum onerati ; metastasis materiei lymphaticæ inflammatoriæ ad loca glandulosa ; mala tractatio œdematis ; impressiones æris aut humidioris aut siccoris ; longæ vigiliæ ; crassorum, viscidorum, crudorum alimentorum frequens usus ; parti inflammatæ applicatio fortiorum resolventium & repercussivorum, quibus discutitur sanguis, sed figitur ulterius lymphæ in vasis inflammatis ; cohibita suppuratio in glandulosis præsertim locis ; compressio glandularum aut aliorum organorum secretoriorum quâ sistitur effluxus liquidi secreti, mox inspissandi ; debilitas in textu vasorum aut receptaculorum secretoriorum ratione cujus remorantur liquida in iis & crescunt : uno verbo, Schirrus pro causa habet quidquid ita afficit organa

partium quæ Schirrorum sedes futuræ sunt, aut ità alterat naturalem consistentiam liquidi contenti, ut sistant humores, & exurgat materies schirrosa, qualis descripta superius.

*De efformatione Schirri simplicis.*

In efformatione Schirri duo diversa adia consideranda sunt. In primo statio lymphæ affluit & congeritur: in altero concrefcit & induratur.

1°. Lymphæ congestio hæc fit à causis generalioribus obstructionis lymphæ. Quæ causæ in efformando Schirri versantur circà aptitudinem loci qui plurimùm glandulosus ad lymphæ moram: circà abundantiam aut insuffationem lymphæ congestæ molem majorem efficientis quàm ut possit missaria locorum obstructorum subire percurrere.

Lymphæ congesta obicem ponit subsequens lymphæ columnæ oppositum: crescit quantitas suc-

ci lymphatici in obstructis organis quæ modò glandulosa sunt , modò vasa lymphatica solitaria , modò retia ple-xiformia lymphatica.

Lympha quæ in vasis receptaculis-que coacervatur , tenax admodùm & spissa ; maximâ pressione laterali diducit membranas solidorum coërcentium. Hinc amissus solidorum tonus aut multùm imminutus , cui succedit uberior faciliorque affluxus lymphæ spissæ vel inspissationi dispositæ.

2°. Quantacumque sit indoles schirrosa lymphæ in corpore circulantis , certâ debet gaudere fluiditate ut vasa propria percurrat. Ergò non concrescit & induratur materies lymphatica nisi post congestionem factam : ità ut plures sint & diversi alterationis gradus in lymphâ congestâ , coacervatâ , remorante , inspissatâ , exficcatâ , crescente , durâ.

In congestâ lymphâ schirrosâ diffi-pantur aquosa calore , motu , fortioribus solventibus aut repercussivis



condensatione spontaneâ, remorâ.

Diffatis mobilibus & aquosis ( *a* )  
 crassa & terrestria adunantur, compin-  
 guntur; paucis aut nullis intermedian-  
 tibus partibus aqueis suprâ se invicem  
 concidunt spissæ lymphaticæ moleculæ  
 quarum ex adunatione exurgit fex lym-  
 phatica iners, omni motu tum circu-  
 latorio tum intestino orba, de die in  
 diem durior evadens.

Dura moles lymphatica pressione  
 laterali invincibili & adeò obstina-  
 tē distendit solida continentia ut fibræ  
 fibris uniantur, membranæ membranis,  
 vasorum parietes inter se. Hinc inter-  
 ceptus quilibet motus non solum in  
 cavo Schirri, sed & in membranis am-

( *a* ) Aqueæ partes lymphæ schirrosæ dissipantur  
 aut avolando per viam transpiratoriam, aut per oscu-  
 la vasorum absorbentium ad communem humorum  
 circuitum redeundo, aut veluti per transcolationem  
 subeundo interstitiola vasorum obstructorum & sic ad  
 libera vasa properando. Tardiùs aut promptiùs dissi-  
 pantur ex partes aqueæ, prout magis aut minùs  
 energicæ sunt causæ dissipantes.

bientibus. Si omnimoda sit & absoluta in parte motûs privatio, Schirrus perfectus est: si alicubi partis schirrosæ motus supersit; imperfectus tantummodò ponitur Schirrus.

Schirri à lymphâ efformantur in lymphaticis, gignuntur ab induratâ adipe in membranâ adiposâ & ab aliis materiis secretoriis induratis in colatoriis diversis.

*Differentie in Schirris annotandæ.*

Schirrus *proprie dictus*, ille est qui cum symptomatis in definitione allatis habet circumscriptionem, quâ caret Tumor *schirroides* qui Schirro *proprie dicto* magis diffunditur: *Exquisitus* est Schirrus qui fit à lymphâ; *non exquisitus* qui oritur ab induratis aliis humoribus secretoriis, uti salivâ, succo pancreatico, bile, semine, mucositate &c.... *Perfecti* sunt Schirri, dum concreta materies omni vehiculo orbata immobilis est, numquam commovenda & ibidem

invariabiliter defixa, membranæ autem coërcentes omni fluido sunt destitutæ, vasaque cuncta omninò sunt oblitterata; uno verbo dùm pars schirrosa demortua est, sed sine putredine: *imperfecti* sunt Schirri quorum materia non adeò est compacta quàm liquari possit, & quorum vasa aliqua adhuc dùm proprio gaudent motu.

*Benigni* nomen habet Schirrus cujus materies non acrimoniosa est, manetque immobilis: supervenit *malignitas*, dùm humores qui antea quieverant, in motum aguntur, acres fiunt, corrodunt vicinas partes. Imperfectus Schirrus, malignus fieri potest quod perfecto numquam eveniet. *Purum* nominamus Schirrum à materiâ lymphaticâ non inquinatâ conflatum: *Impurus* fit dùm aggesta schirrosa materies inficitur viru quopiam, scrophuloso, scorbutico, cancroso, venereo.

Parti alicui sanæ superveniens Schirrus dùm existit per se *primarius* dicitur; si Schirrum in eâdem parte præcesse-

rit morbus primarius ut phlegmone, ulcus præmaturè clausum &c. *Secundarius* nuncupatur Schirrus. *Simplex* est Schirrus qui nihil habet quod non fit de suâ essentiâ : *complicatus* qui jungitur cum quopiam sibi alieno ; talis est Schirrus phlegmonodes, erysipelatodes, œdematodes, cancrôdes.

Annotandæ & quoquè sunt Schirrorum differentiæ ratione partium Schirro affectarum, an sint glandulosæ, tendineæ? &c... Ratione muneris parti affectæ proprii, nùm visui, nùm masticationi, nùm motibus muscularibus obstet Schirrus? an à pluribus annis, aut à paucis tempore existat ille Tumor? & sic de aliis tum essentialibus tum accidentalibus Schirrorum differentiis.

### *Signa & effectus Schirri.*

1°. Tumet Schirrus ob dilatationem vasorum & conceptaculorum à lymphâ congestâ.

2°. Renititur atquè durus est à compactâ ficcâque materiâ & à tensis membranis ambientibus, cedere nesciis.

3°. Indolens est ob constantem & validam compressionem fibrarum nervearum quæ nequè fluidum nerveum transmittendi, nequè vibrationis suscipiendæ sunt capaces. Si quis autem sensus in Schirro imperfecto percipiatur, oritur ex minori compressione nervorum quorumdam adhuc vibratiliū.

4°. Ab Schirris subtegumentosis non mutatur cutis color: magis autem albicat Schirrus dùm exterior est ob albidum lymphæ coacervatæ colorem trans cuticulam reflexum.

5°. Schirrus propriè dictus circumscribitur; dùm nulla circumscriptio designatur Tumor schirrodes. In primo casu certa lymphæ coacervatæ quantitas minùs occupat spatium, multòque magis cutem exterius propellit: quod fieri nequit, quòb observentur termini quibus basis Schirri à sanis partibus circumambientibus distinguitur: eadem

lympha in Tumore schirroso diffunditur magis atquè sensim in partibus vicinis evanescens, terminos vix sensibus obvios ponit. Illud notatu dignum videtur in plerisque Schirris circumscriptis glandulas obsidentibus, quòd limbus circumscriptionis veluti denticulatus tactui appareat, aut confectus globulis inæqualibus, parùm politis, irregulariter dispositis; cujus phœnomeni ratio petenda est ex folliculis glandularum hùc & illùc diductis & protuberantibus ob lympham concretam & velutì in globulos duros irregulares conformatam.

Iidem non sunt Schirrorum quorumcumque effectus. Pessimi sunt quandòque in internis sedibus. Supernascentes in intestinali tubâ volvulum (a) creant: in utero non sterilitatem tantùm aut partum difficilem producunt, sed &

---

(a) Fabric. Hildan. centur. 1. observat. 61. pag. 74.

(*a*) plura alia gravissima symptomata. In liene positus Schirrus subsequentes habet sæpissimè hydropes, aliosque affectus chronicos, &c...

Schirrus tùm internè, tùm externè vicinas partes comprimit quarum pro diversitate varii effectus oriuntur.

Nullâ conjecturâ opus est ad Schirros exteriores solo sensuum ministerio dijudicandos. Ast si quis ratiocinio locus sit pro Schirris internis, illi & causis prægressis & symptomatibus benè perpensis dignoscuntur (*b*). Calent,

(*a*) Plura extant observata Schirrorum uteri apud prælaudatum Fabric. Hildanum; inter quæ, Chirurgus ille centur. 7. observ. 57. refert se versùs quamdam honestam mulierem fuisse advocatum, quæ per sex dies integros parturitionis doloribus in vanum excruciatâ, è vitâ tandem decesserat. Aperto cadavere, uterum dilaceratum & caput infantuli in abdominis-cavitatem dimissum reperit Hildanus. Cujus horrendi phœnomeni causa fuerat Schirrus immensæ molis utero adhærens & colli uterini viam obturans egressuro fœtui.

(*b*) Ipsomet tactu percipiuntur quidam Schirri interni, talis est Schirrus ad convexam hepatis superficiem positus.

rubent, pulsant Tumores phlegmonoides; frigescit, pallescit, numquam pulsat Schirrus simplex: digito prementia œdema cedit, cui Schirrus resistitur: Cancer occultus dolet, Schirrus indolens est: iis variisque aliis signis Schirrum inter & alios quoscumque Tumores non dubia datur distinctio.

### *Schirri prognostica.*

1°. Schirrus interior periculosior est externo, tum ob difficiliorem medelam, tum ob præstantiam organorum interiorum.

Schirrus exterior factus ab accidenti externo minùs periclitatur quàm si à vitio interno profluat.

Schirri à pravâ & generali humorum diathesi, etiamsi curati fuerint, sæpè revertuntur.

Satius est illi quàm alteri parti insidere Schirros exteriores: sic pessimum est Schirrum supercrescere ocu-



lis ( *a* ) : pessimum & quoque uterum indurari , sæpè enim abit in cancrum semper mortiferum.

2°. Schirros perfectos eosdem semper futuros esse pronuntiandum est quò vel minima iis adveniat mutatio nequè in melius neque in pejus.

Schirrus perfectus in propriâ suâ naturâ consideratus nullum potest inferre ( *b* ) damnum , quatenùs immobilis in materiâ contentâ immobilis in vasis receptaculisque continentibus , tamquam corpori extranea pars spectari debet , nullum cum cæteris partibus iniens commercium. Si quid igitur noxii ab Schirro perfecto , corpori adveniat , tri-

( *a* ) Fabricius Hildanus centur. I. observ. I. vidisse se profert Schirrum extrâ palpebras prominentem , ovo anserino majorem , lividum , jam ad cancrum vergentem , immani hæmorrhagiâ aliisque gravissimis symptomatis stipatum , feliciter tamen curatum illæsâ visione.

( *b* ) Schirros perfectos nullâ sine noxâ etiâ in interioribus corporis posse diù subsistere demonstratur observatione multiplici in cadaveribus factâ.

buendum illud est auctæ moli majorique ponderi quibus vicinæ partes compressæ, distractæ, aggravatæ functionibus exercendis impares evadunt.

Imperfecti autem Schirri resolvi possunt, suppurari, aut cancrofi fieri.

Semper timendum in tentatâ Schirri resolutione nè humores attenuati & in motum acti acrimoniam concipiant.

Expectanda est Schirri resolutio, si imminutâ paulatim & minùs durâ factâ Schirri mole, nequè dolor in parte nequè ulla inflammationis suppuratio- nis aut canceri signa manifestentur.

Diffidendum ab Schirri imminutione quæ applicationem fortiorum resolventium & repercussivorum subsequitur: etenim hujusce imminuti Schirri reliquiæ sæpè cancerum excitant, aut Schirrum imperfectum in Schirrum perfectum commutant.

Si Schirri imperfecti cutis exterior incalescat & ad limbum Tumoris rubescat, fit Schirrus inflammatorius qui in suppuratum abire dijudicandus dùm

prægressis calore, rubore & pulsatione remolefcit Tumor. Suppurantis Schirri paucum est, spissum, & lentum liquamen; ficcitas in oris ulceris, pigra carniū pullulatio, partis indolentia. Si in suppurantibus glandulis supprimatur effluxus puris, Schirrum præfagimus futurum.

3°. In Schirro propriè dicto seù circumscripto cum lymphâ sit in vasis aut conceptaculis magis coacervata & concreta, ideò difficiliùs discutitur Schirrus ille, quàm Tumor schirrodes cuius lymphâ magis diffunditur minoremque est adeptâ duritiem.

4°. Benignus Schirrus periculosus non est: malignus eò majus secum importat periculum, quò major est illius malignitas, & quò major est in Schirro maligno humorum acrimonia.

5°. Schirri impuri, seù viru quopiam inquinati, prognosis eruitur, & à naturâ virûs, & à symptomatis quæ ab eo producuntur, & à partibus quibus Schirrus impurus insidet.

6°. Schirrus primarius sortem sequitur causæ à quâ ortus est: secundarius variat in eventibus pro sævitie, vetustate, naturâ morbi primarii à quo originem sumit Schirrus.

7°. Inter complicatos Schirros phlegmonodeus si vires insufficientes habeat suppurationi perficiendæ, sæpè tunc in cancrum vertitur. Semper pauca & lenta est Schirri phlegmonodei suppuratio. In Schirro erysipelatoso livor aut nigredo partis mortificationem denuntiant. Dùm œdemati complicatur Schirrus timendum nè rursus mollior facta materies cancrum accersat (a). Om-

---

(a) Schelhammerus memorabilem vidit in pellione quodam Tumorem schirrosus ab œdemate natum afficientem musculos scapulæ, pectoris, brachii, manus. Imperfecti Schirri naturâ gaudebat, nullis cessantibus remediis, immanibusque doloribus excruciatum agrotantem de medio sustulit... Materies schirrosa facta tunc fuerat cancrosa.

Vide apud Fabric. Hildanum centur. 4. observ. 73. ex Schirro sub axillâ, brachii Tumorem œdematosum enatum.

nium complicationum schirrosarum pe-  
jor est cancrofa.

8°. Frequenter in mammis fiunt  
Schirri quorum mutatio in cancos  
multum pertimescenda. A tonsillis schir-  
rosis angina. Schirrus musculos aut ar-  
ticationes afficiens motibus obstat  
plùs vel minùs. Ab Schirris compressi  
nervorum trunci paralyfes faciunt; com-  
pressæ arteriæ majores anevrismata;  
compressæ arteriæ minores inflamma-  
tiones producunt, &c....

9°. Schirrus minùs feliciter termina-  
tur in senibus, feliciùs in adultis; &  
magis faustum adhuc habet exitum in  
infantibus qui frequentes experiun-  
tur Tumores schirrosos remediis facilè  
cedentes imò & solo naturæ nisu sæ-  
pissimè solvendo. Si atrophîâ à longo  
tempore pueri extenuentur quæ medi-  
cam artem eludat, atque blando ab-  
dominis tactu renitens quidpiam & du-  
rum persentiatur in interioribus, certò  
pronuntiandum est Schirro tentari me-  
zenterium. Hoc apertione puerulorum.

Q

constanter se fuisse expertum testatur *Schelhammerus*.

10°. Suppressæ alicui evacuationi periodicæ supervenientes Schirri non curantur radicitùs nisi restituto evacuationis consuetæ effluxu.

11°. Schirri hæreditarii periculosiores magisque pertinaces sunt iis quos causa adventitia procreavit.

12°. Schirri qui medicamentis curari non possunt & quorum præsentia corpus notabiliter lædit ferro excindi debent. Caveatis autèm nè cum exciso Schirro præscindantur & quoquè nervus, vas majus sanguineum, partes tendinosæ.

13°. Tandèm, Schirri supervenientes corpori robusto, benè constituto, viribus valenti feliciorum habent prognosim quàm si corpus debile sit, cacochimicum, viribus exhaustum.

*Schirri generica curatio.*

Purum & simplicem Schirrum cura-

turus annotet nùm perfectus sit nùm imperfectus.

1°. Perfectus Schirrus, à causâ quâcumque productus fuerit, frustrâ medicamentis tùm externis tùm internis impugnatur. Iis enim non solum non discutitur sed nè quidem in minimo ui puncto commutatur. Unica in ferro excindente hunc auferendi spes est.

Excindatur igitur Schirrus perfectus, si nihil contraindicet. Hæc excisio ferro adaptato peragitur. Nè minima Tumoris excisi portiuncula relinqui debet; repullularet enim alter Schirrus priori malignior.

Dantur multiplices in Schirro excindendo contraindicationes: tales sunt vicinia aut contiguitas nervi, vasis maioris (a) tendinum (b): in substantiâ

---

(a) Mirari subest forsàn non semper æmulari Fabric. Hildani dexteritatem in abradendo Tumore subaxillari, ligatis supernè & infernè magnis vasibus. Casus tamen æquè periclitantes prosperè terminatos offert nostra chirurgia.

(b) Vidi Schirrum parti inferiori muscoli deltoï-

partium jactæ profundiores Schirri radices: nobilitas partium quibus Schirri insident & quarum destructio pejora faceret quàm est incommodum præsentis Schirri: adhæsió illius magna partibus duris: mala corporis constitutio aut ejus debilitas: ætas provectior aut infantilis: & quandòque generalis inemendabilis humorum depravatio.

More in tractandis vulneribus consueto persanatur relictum ab ablato Schirro vulnus.

2º. In medelâ Schirri imperfecti puri & simplicis locum obtinent medicamenta & interna & externa. Hæc ultima sufficiunt ad Schirrum imperfectum ab externâ causâ pronatum: utraque expetuntur pro Schirro ab interno vitio.

Resolutio Schirri imperfecti (quæ in

dis positum & notabiliter extrâ prominentem. Excisus fuit Tumor ille & incautè penetravit incisio usquè ad fortem & robustum tendinem communem deltoïdis: undè dolores atroces, & motus convulsivi qui persistere usquequò semi-excisis tendo prædictus scalpello omninò præcisus fuit.



quantum possibile est tentari debet) expetit statim topica emollientia, dein attenuantia, resolventia. Iis enim emolliatæ partes duriores lymphaticæ, mox in minores moleculas redactæ, naturali circuitui restituntur. Et si in lymphâ coacervatâ prædominet acrimonia minùs energica adhibeantur topica attenuantia cum diluentibus sociata.

Porro dum existit generalis humorum prava diathesis, non solis topicis utendum; opus enim est internis remediis ut prosperè succedat Schirri resolutio, semelque curatus non reviviscat Tumor. Itaque post emendata primarum viarum vitia, utendum est sed summâ cum cautelâ aperientibus, diureticis calidis imò & hydroticis, si abundans in corpore serum dissipandum sit. Ast si humorum existat acrimonia & metus sit futuri carcinomatis, diluentia, lenientia, edulcorantia imprimis spectant. Lacticinia hîc multum proficua sunt.

Accidit autem aliquoties ut in spe suâ delusus Medicus Schirros in suppu-

ratum abire advertat quorum resolutionem moliebatur. Quibus in circumstantiis lapide caustico aut ferro aperiendus est Tumor, methodicèque tractandum ulcus.

In genere Schirrus imperfectus & topicis & medicamentis internis resistens obstinatè, ferro abscindendus est, nè una aut multiplex existat ex prædictis contraindicationibus.

3°. Schirrorum viru quopiam inquinatorum curationem deducere convenit ex peculiari therapeiâ luis venereæ si Schirrus sit syphiliticus, scrophularum si sit strumofus, cancri si cancrofus sit Schirrus, scorbuti si indolem scorbuticam redoleat.

4°. Demùm advertatur sedulo, 1°. Nullum esse forsàn inter Tumores humorales qui tantam, quantam Schirrus à parte Medici remedia præscribentis attentionem exoptulet. Ex levi enim errore omnia in pejus ruunt. 2°. Quò tenuior est textura partium quas Schirri occupant eò mitiora topica ap-

plicanda esse. 3°. Satius esse Schirrum  
 imperfectum abire in Schirrum perfec-  
 tum quam si motu intempestivo mo-  
 veatur materies quæ in cancrsam to-  
 tiès abit. Sibimet igitur committatur  
 Schirrus in quo nulla affulget resolu-  
 tionis spes. 4°. In tractatione cujusli-  
 bet Schirri à mitioribus remediis inci-  
 piendum esse, mox procedendum ad  
 fortiora. 5°. Lentam esse ut plurimùm  
 curationem Schirri cujus concreta ma-  
 teries difficillimè discutitur, & cujus  
 suppurantis maximè tardigradi sunt  
 progressus. 6°. In excisione Schirri non  
 satis umquàm attendere posse Chirur-  
 gum nè lædantur partes quarum inte-  
 gritas vitæ aut functionibus essentia-  
 bus est necessaria. Undè eruitur quàm  
 absolute momentosa sit apud operan-  
 tem Chirurgum etiàm exactissimæ ana-  
 tomix scientia.





## SECTIO TERTIA.

*Includens brevem historiam plurium Tumorum, qui vulgò cognoscuntur nomine parvulorum Tumorum humoralium.*

**H**ACTENUS enarrata fuere quæ spectant ad quatuor primarios Tumores humorales : nunc deveniendum ad alios numerososque Tumores quorum descriptio non adeò exacta & absoluta reperitur tum apud Antiquos tum apud Neotericos, quin plurima in eâ desiderentur.

Magnam

Magnam in assignandis hisce Tumoribus lucem affundit D. de Sauvages, Professor Monspeliensis, in doctâ suâ Pathologiâ methodicâ. Ibî enim non solum à phymatis exactè distinguuntur maculæ, efflorescentiæ, cystides; sed & cujuscumque generis Tumorum species diversæ luculentissimè annotantur.

### De Furunculo.

*Furunculus* à Græcis *Dothien* dictus; ab Arabibus *Clavus* vel *Spina*; à Celso *Tuberculum* acutum cum inflammatione & dolore; gallicè, *Froncle*, *Clou*, est *Tumor inflammatorius globosus, valdè durus, acutè dolens, atro-ruber, ovi columbini molem ut plurimum non excedens, spontè suppurans.*

Sedet *Furunculus* in cute, aut in partibus immediatè suppositis; nominatim verò in glandulis miliaribus cutaneis, vel in sebaceis Morgagni, vel in criptis Boërhaavianis, vel in membranis cellularum adiposarum faciei

interiori cutis contiguarum.

Oritur à causâ inflammatoriâ sic afficiente has glandulas ut exurgant in Tumorem extrâ prominentem signisque prædictis insignitum.

Statum inflammatorium Furunculi necessariò præcedit obstructio sanguinea glandularum quæ Tumoris illius sedes sunt. Cui obstructioni datur occasio 1°. Ex congestâ copiosiori & inspissatâ materiâ transpiratoriâ, sudorificâ, sebaceâ, adiposâ, in glandulis & cellulis prædictis: undè nimia expansio membranarum glandulosarum, compressio arteriolarum circâ glandulas ramificatarum, difficilis sanguinis transfluxus, ejus hærentia. 2°. Ex inspissato & abundanti sanguine arterioso ad glandulas cutaneas aut subcutaneas delato, & in angustioribus illarum vasculis hærente. 3°. Ex vi quâcumque imminente cava horum vasculorum, aut in illis stagnationi sanguinis favente.

Remotè fit hæc obstructio glandulosa sanguinea à pluribus causis internis

proëgumenis solida fluidaque quæ sedes & materia Furunculi futura sunt à longè prædisponentibus; aut à quibusdam causis externis superficiem corporis afficientibus, uti ab acri frigore, &c.

Quâ positâ obstructione (a), si simul vigeant vires circulatoriæ sanguinem pellentes ad locum obstructum, status verè inflammatorius procreatur

(a) Probè distinguatur glandulosa hæc obstructio sanguinea ab obstructione glandulosâ simplici quæ descripta fuit in *secundâ Sectione*.

Et quidè constat 1°. Obstructionem glandulosam simplicem essentialiter consistere in præpeditâ excretionem materierum quæ in cavo folliculorum glandulosorum copiosius coacervantur. 2°. Obstructionem glandulosam sanguineam, de quâ hîc, peccare labe inflammatoriâ vasorum repentium suprâ membranas eorundem folliculorum aut glandularum.

Attamen fatendum rarò, si umquàm evenire obstructionem glandulosam sanguineam Furunculi quin præcesserit infarctus cavi folliculosi à materiâ secretoriâ congestâ; ità ut strictè loquendo, ex duplici obstructionis genere constet Furunculus, nempe obstructione cavi folliculorum, & obstructione arteriarum sanguinearum suprâ folliculos glandulosos ramificarum.

è quo fluunt morbosa Furunculi phœnomena.

1°. Moles naturali major sanguinis arteriosi in vasis glandularum prædictarum ea distendit & tumefacit. 2°. Cùm suprâ glandulas vel folliculos subcutaneos vasa arteriosa ramificentur in orbem, eodemque modo distensæ expandantur membranæ folliculorum; ideò furunculus in formam globi attollitur. 3°. Quia materia Furunculi multùm ad exteriora tendit, atque distractæ membranæ Furunculi globosi debilitantur; eâ duplici ratione in acumen sæpè definit Furunculus. 4°. Durus est ille Tumor ab spissâ & tenaci materiâ obstruente folliculorum cava; & ab spisso vasorum inflammatorum sanguine. 5°. A validè distractis membranis glandularum per infarctum & per motum inflammatorium convelluntur tenuissima filamenta nervea penicillatim ad mammillares papillas nerveas cutis tendentia; distrahuntur fibrillæ copiosissimæ vasis sanguiferis in-



inflammatis interspersæ ; undè dolor qui  
 eò auctior , quò sensu exquisitiori do-  
 nantur distractæ membranulæ & quò  
 potentior causa dolorifica. 6°. Tenaci-  
 tas & inspissitudo sanguinis furunculosi  
 atro-rubrum colorem Tumori commu-  
 nicant. 7°. Cùm obstructæ arteriolæ  
 quæ suprâ glandulas indicatas disper-  
 guntur determinatos nequè multùm  
 propagatos habeant limites , eo pacto  
 minùs phlegmone extenditur. Furuncu-  
 lus qui rarò admodùm ovi columbini  
 magnitudinem superat. 8°. Et cùm de-  
 biliora latera arteriolarum obstructa-  
 rum ab spisso sanguine & superabun-  
 dante distendantur plurimùm , ruptio  
 fit quorundam ex illis vasis cui succe-  
 dit Furnunculi spontaneum opus sup-  
 puratorium , quòd est summoperè do-  
 lorificum.

Rarò evenit Furunculum solitarium  
 erumpere ; sed plures simul , aut in eâ-  
 dem , aut in diversis corporis partibus  
 apparent. Uno curato , alter nascitur.  
 Et hæc obstinata Furunculorum repul-

lulatio aliquandò viget per tempus longissimum.

Post variolas frequenter erumpunt Furunculi deuteropathici. Alii febres acutas, malignas, aliosque morbos comitantur sub nomine Furunculorum sympathicorum. Annotari & quoquè debent Furunculi epidemici & endemici: critici & symptomatici.

Modò Furunculus solam cutem occupat & extrà prominet cum acumine: modò serpit profundius nequè externè acuminatus apparet. Primus benignus dicitur, alter malignus: ille faciliùs, iste difficiliùs suppuratur.

Nihil omnindò metuendum est à benigno & miti Furunculo qui per se sanatur. Boni sunt ominis Furunculi per corpus dispersi & suppurantes in morbis acutis cum ægrotantis levamine: mali ominis è contrà si ingravescant symptomata morbi post factam Furunculorum eruptionem. Melius est Furunculos extrò quàm intrò pelli. Dolor immaniter sæviens in Furunculis quibusdam ac-

cerfit vigilias , & febrem acutissimam quæ si superveniat cum pravo primarum viarum apparatu , aut cum malâ dispositione sanguinis , timendum est nè morbus gravis excitetur , ut febris putrida , maligna.

Tardiùs ad maturitatem deveniens Furunculus benignus , qui plerùmque tamen spontè sanatur , suppurantia topica expetit. Citò quidè promoven- da suppuratio in Furunculo maligno. Ferro , si necesse fit , sufficiens fiat incisio quâ facilè effluat pus. Sæviens dolor compescatur narcoticis. Generalia non omittantur inflammationis auxilia , nominatim venæ sectiones.

### *De Varis.*

*Vari* , sunt parvuli Furunculi , aut tubercula Furunculis simillima , parva , dura , prurientia ; nunc indolentia , nunc cum levi dolore ; ut plurimùm rubra , deìn in acumine albescentia : nascuntur in facie , aut in viciniis.

Varorum sedes sunt glandulæ sebaceæ Morgagni quarum cavitas in statu sano unctuosum & spissum humorem continet, concretioni maximè pronum. Multò minor est inflammatio in Variis quàm in Furunculis propriè dictis, sed magna est contentæ in folliculis Varorum materie spissitudo.

Juvenibus & ætatis robore fruentibus frequentiores sunt Varii. Ab expertissimo in arte viro relatum mihi fuit se observasse morbis inflammatoriis internis multùm obnoxia esse illa juvenilia corpora quæ Variis infestantur. Verùm eadem corpora, semèl prætermisissis juvenilis ætatis tumultu & æstu, ad ætatem provectissimam ut plurimùm devenire. Multùm prædicatur lac virginalis ad præcavendam faciem à Variis.

### *De Termintho.*

*Terminthus* est Furunculus atro-virescens tibiæ Franc. de Sauvages *Pathologia methodica* edit. ann. 1752.

Definitur

Definitur tuberculum inflammatorium atro-viridis coloris cujus summitati incumbit pustula nigra quæ exsiccata desquamatur, & sub quâ materies quædam purulenta latitat. Materies Terminthi est paucus sanguis inflammatorius multâ permixtus lymphâ spissâ acri, & veluti, atræ-biliosæ indolis.

Tibiæ potissimum infestantur Termintho. Frequens est hæc tuberculi species apud eos quorum tibiæ prætumidæ sunt lymphâ acri & spissâ difficulter per vasa propria circulante. Spontè suppurat Terminthus.

### *De Epinyctidibus.*

Materies Epinyctidum eadem est propè modum quæ terminthi. *Epinyctides* sunt pessimæ pustulæ coloris albi suprâ cutem, rubri verò infrâ cutem; circâ quas satis vehemens est inflammatio. Pustulæ illæ dolorem habent noctu præsertim sævientem; noctu &

etiàm numero crescunt Epinyctides: insomnia faciunt.

Epinyctis suppurans saniem sanguineam fundit. A frigore suscepto intròpulsam materiem Epinyctidum mortem accersisse ferè subitanèam constat observatis.

### De Phygethlo.

*Phygethlon* apud Græcos, & *Panus* apud Latinos unum & idem sonant.

Phygethli notæ sunt *Tuberculum inflammatorium externum, rarò suppurans, stipatum calore deurente & dolore mordaci.*

Non secùs ac furunculus glandulas cutaneas inflammatoriè aggreditur Phygethlon eo cùm discrimine, 1°. Quòd minores glandulæ inflammentur in Phygethlo, majores in furunculo (a).

---

(a) Diversam esse molem glandularum cutanearum docet anatome. Vide quæ de iis scripserunt Malpighius, Morgagnius, atque Boërhavius in epistol. anatomic. ad Ruysch.

2°. Quòd sanguis furunculofus fiffus admodùm fit & tenax : sanguis verò phygethlicus dilutior & acer exiftat in vafis glandularum cutanearum : primus fanguinis phlegmonodei , alter eryfipelatofì naturam redolet.

Duplex eft in eâdem glandulâ obftructio Phygethlum efformans. Primò enim obftruitur glandulofì folliculi cavum ab infiffato & acri humore fecretorio : fecundò hæret sanguis acer in vafis fanguiferis arteriofis fuprà folliculum repentibus. Ab ftatu inflammatorio Phygethli & ab acrimoniâ materiei coërcitæ eruuntur omnia Phygethli morbifica phænomena.

More Tumorum eryfipelatoforum arò fuppurat Phygethlon ob facilem refolutionem mobilioris ipfius fanguinis. Verùm fæpè curatâ inflammatione Phygethli, remanet fex dura in cavo folliculi , undè fupertes tuberculum durum & veluti fchirrofum.

Quod corporibus de cætero fanis accidit Phygethlon omni vacat periculo,

secùs ominandum de Phygethliis malignis & pestilentibus.

Utì parvula inflammatio (quæ essentialiter erysipelatoſa in induratum facile abit ob ſpiſſum humorem folliculi cavo contentum.) Tractandum eſt Phygethlon; & ex iis indicationibus eruenda curatio.

### *De Phymate.*

Quæ phygethli eadem eſt *Phymatis* ſedes. Minor eſt calor, rubor, ac dolor in iſto quàm in altero. Spontè naſcitur Phyma abſquè cauſâ evidenti; citò ſuppurat; non tantam acquirit molem ac Phygethlon. Sanguis Phymatis ad indolem ſanguinis phlegmonodei accedit. Sola natura abſquè artis adminiculo, & abſquè incendio Phymata curat per ſuppurationem: juvanda tamen aliquandò natura in hoc opere.

Quid per Phymata intellexerit Hippocrates Vide in coacis & alibi. De Phymatis venereis conſulatur *Aſtruciuſ*. *de Morbis venereis, tom. 1. pag. 264. & ſeq.*



*De Carbunculo aut Anthrace.*

*Carbunculum & Anthracem* alii conjungunt, alii separant. Nos utrumque spectamus tamquam unam & eandem Tumoris speciem intensitate symptomatum tantummodò discrepantem.

Modò simplicem, modò pestilentem Carbunculum esse volunt. Rectius quadruplex assignari debet species Carbunculi. Prima *Carbunculi simplicis, benigni*: secunda *Carbunculi maligni seu Anthracis vulgaris*: tertia *Carbunculi seu Anthracis pestilentialis*: quarta *Anthracis epidemici non pestilentialis*.

1°. Carbunculi simplicis & benigni notæ sunt parva Tumoris elevatio, ita ut quandòque vix extùs appareat, illius durities, color atro-ruber, dolor acer, calor deurens, in Tumoris acumine vesicula livida sub quâ latet gangræna, inflammatio circumambiens & partium vicinarum intumescencia.

2°. Noscitur Carbunculus malignus seu

anthrax vulgaris per summam duritiem, colorem magis nigricantem aut lividum, dolorem magis acerbum, calorem vividio-rem, unam aut plures vesiculas lividas aut nigras sub quibus sphacelus est, aliquandò loco vesicularum centrum nigrum aut cineritium durissimum, ambientis circuli fervidior-rem inflammationem & notabilem tumefactionem partium circumjacentium.

3°. Tertia species Carbunculorum seù Anthracum viget in illâ acutissimâ, malignâ, & ut plurimùm epidemicâ febre quæ pestis dicitur. Signa Carbunculorum pestilentialium sunt illorum eruptio in constitutione pestilentiali aut præsentem, aut quæ à paucò tempore grassabatur; major sævities symptomatum quàm in Carbunculis non pestilentibus, cum aliis signis febrili pestilentiali seù pesti propriis.

4°. Si Carbunculi seù Anthraces vulgaribus similes à loco in locum grassentur pluresque simul homines afficiant,

quoniam tamèn secum habeant charactèrem febris pestilentialis, tunc constituuntur quartæ speciei Carbunculi, nempe Anthraces epidemici non pestilentiales: tales sunt Carbunculi quos à regione in regionem grassari vidimus afficientes tùm bruta, tùm homines; aliquandò homines non bruta & vice versa.

Exteriores Carbunculi & Anthraces manifestant cutem & adipem suppositam. Si serpant profundius, plures alias partes exedunt. Prædicta tegumenta gangræna tenet in Carbunculo simplici; factò Anthrace succedit sphacelus.

In omni Carbunculo confirmato duæ partes distinguendæ sunt, nempe centrum & circumferentia Carbunculi. Centrum vel est gangrænosum vel sphacelatum: circumferentia magis aut minus est inflammata.

Carbunculi materies inflammatoria dijudicata per sævitiem symptomatum illius Tumoris, jure meritò censetur acris & ferocis indolis ad partis morti-

ficationem tendentis per quamdam speciem uisionis inflammatoriæ. Contentus in vesiculis Carbunculo superpositis liquor saniosus ; escharra in Anthrace brevi & spontè efformata ; subter ablatam escharram observata materies corrupta ; sordities & ficcitas in Carbunculi ulcere : ex iis omnibus patent essentia & vis materiei Carbunculum & Anthracem efformantis.

Quænam verò sit natura virûs quod inquinat materiem inflammatoriam Anthracum pestilentium ? Cum Sydenhamo respondemus, nos illud, pariter ac complura alia, circa quæ vecors & arrogans philosophantium turba nugatur planè ignorare. Id tantùm scimus naturam per apostemata diversa moliri expulsionem materiei pestilentis è corpore.

Carbunculus oritur in membranâ ad ipsam posâ & in cute per validam inflammationem multùm dolentem quæ in gangrænam citò abit. Sanguis inflammatorius Carbunculi acer admodùm & spissus validissimè commotus in proprii

priis vasis obstructis sæviens in lymphaticis quorum oscula subit, subito dirumpit vasculosos parietes, effunditur in interstitiis fibrarum, in textu cellulari, in cellulis adiposis; ibi putrescit brevi eoque facilius quò peior in ipso erat ad corruptionem dispositio: fit miscela sanguinis putrescentis, oleosæ materie adiposæ, sebacei liquidi, humoris transpiratorii & sudorifici; undè major in parte corruptio. Sanies in vesiculis colligitur sub epidermide. Interim validissimâ inflammatione Carbunculum circumambiente atquè summo hîc vigente calore difflantur humida, cutis abit in siccam, duram escharam. Tùm nisi naturæ beneficio, aut artis ope mortuum separetur à vivo per intermediam suppurationem aut per aliud quodcumque auxilium, corrumperentur vicinæ partes, serpens mortificatio ad latera propagabitur atquè destruet textum membranarum, musculorum aliarumque partium mollium sub tegumentis positarum.

Undè patet Carbunculum simplicem in Anthracem posse mutari, auctâ morbi sævitie; Anthracem in Carbunculum neutiquàm. Nèque difficile erit ex Carbunculi & Anthracis statu inflammatorio, gangrænoso, sphacelato, essentialia illorum symptomata deducere, imò & accidentalia, uti febrem, &c.

Etiàm si multò mitiora sint in Carbunculo benigno quàm in Anthracibus symptomata, attamen satis impropriè benignus nuncupatur cum ferox semper sit illius materia & in Anthracem facile mutetur. Causæ inflammationis validissimæ producent & quoquè Carbunculos, suppositâ tamen dispositione peculiari tum in solidis, tum in fluidis non facile præcisè determinandâ. Non rarò Anthraces etiam producit comestio carniùm ex animalibus affectis Carbunculo. Mense Novembris ann. 1752, ingressus est Nosocomium Monspeliense Miles annos circitèr trigintâ natus, qui decem Carbunculos, quorum novem minimi decimus mag-

nus erat, in naso aut suprâ nasum gestabat. Illorum carbunculorum causa fuerat comestio carnis vervecinæ Carbunculis infestatae..... Inter nostros rusticos frequentissimi sunt Carbunculi propterea quòd pastores comedunt agnos Carbunculis enecatos. Quod non rarò ipsemet observavi.

Dixerunt jamdudùm Occitanis familiares esse Carbunculos : & reip-sâ nunc videmus in plerisque vicis Monspelio vicinis endemicè grassari Carbunculos & Anthraces æstivâ potissimùm ( a ) tempestate. Febris maligna sæpissimè sibi adjunctos habet Anthraces sympathicos.

---

( a ) Nonnè ob comestionem carnis ovium quæ in Occitaniâ frequenter Carbunculis laborant, ut suprâ dictum est? Nonnè ex eo quòd per summos calores qui vigent in Occitaniâ atque per labores duros quibus Rustici indulgent; sanguis eorum multùm depauperatur parte suâ aqueâ, exaltantur sales & olea, inspissans acrimonia gignitur; uno verbo præparatur in humoribus materies inflammatoria, quæ si à causâ procatharticâ certo modo in motum agatur facit Carbunculos. Horum productioni remotè etiàm concurrat pravus Rusticorum victus.

Carbunculi pestilenciales indiscriminatim modò ex hâc, modò ex illâ parte superficièi corporis pestiferi erumpunt: sæpè orti à pustulâ grano milii non majori mox crescunt, dolent intensissimè aliaque præ se ferunt signa Anthracum pestilentium.

Quamvis ex annotatis signis characteristicis Carbunculorum pestilentialium, ii Tumores exactè designentur; cavendum tamen esse ab errore in diagnosi edocet nos, inter cætera, pestis quæ Monspeliæ grassata est annis 1629 & 1630. Carbunculi qui eâ in peste apparebant stipati erant signis diversis omninò ab iis quæ Carbunculis pestiferis sunt communia (a).

Singularem Carbunculi endemici speciem in urbe Rochacurvâ observari dicunt (b). Hoc Carbunculo suffocatur

(a) Riverii observ. communicatæ à D. Pomaret, Chirurg. Monspess. observ. 5.

(b) De la Médecine efficace, tom. 4. pag. 76.



patiens nisi novem noctes consecutivas infomnes tranfigat. Quâ de causâ, dùm ex unâ parte Medicus & Chirurgus artis auxilia adhibent, amici & parentes convocati saltant & choræas ducunt coràm ægrotante ut eum à somno avertant.

Anthraces epidemici talem determinatè, ut plurimùm, afficiunt corporis partem, uti fauces aliumvè quemcumque locum, nequè alibi quærenda est ipsorum ortûs ratio quàm in constitutione epidemicâ quæ nunc anginas, nunc pleuritides, nunc varia exanthemata producit.

Inter epidemicos Anthraces annotari meretur Anthrax phagædenicus indicatus à *D. de Sauvages in Pathologiâ methodicâ*. Anthrax ille carnes ad ossa usquè exedebat.

Inter omnes Carbunculorum species maximè periculosos esse Anthraces pestiferos evidentissimum est.

Carbunculi epidemici non pestilentes majus aut minus secum important periculum pro diversitate causæ gene-

ralis à quâ producuntur , pro diversis partibus quas tenent , pro temperie corporum quæ labem epidemicam suscipere.

Mitior est Carbunculus simplex Anthrace. Anthracum vulgarium non semper eadem est sævities cujus varietates ex prædictis eruere non arduum.

Quò major est acrimonia , spissitudo, maligna qualitas materiei Anthraces aut Carbunculos producentis , eò pejus ominandum & vice versâ.

Quò exquisitioris sunt sensûs partes Anthracibus infestatæ , eò major dolor, sæviora symptomata , majus periculum.

Summoperè metuendi sunt Carbunculi qui habent contigua quædam majora vasa aut partes vitæ utiles. Metuendi & quoquè sunt qui imis faucibus supernascuntur , ægros enim sæpè jugulant. Angulis labiorum non rarò advenientes Carbunculi etiamsi curati fuerint , sæpè post se relinquunt oris intorsionem.

Melius est extrâ prominere Carbunculos quàm intrâ partium textum sepe-  
 liri. Exitiale dùm ab exterioribus ad  
 interiora subitò transferuntur per me-  
 tastasim.

Minùs metuendum est à Car-  
 bunculis feбри malignæ supervenien-  
 tibus , quàm à febre malignâ erup-  
 tioni Carbunculorum superveniente.  
 In primo casu natura conatur expel-  
 lere materiem morbificam : in altero  
 indicia sunt summi & indestructibilis  
 vitii quo natura obruitur.

Carbunculos senilioribus corporibus  
 supervenientes , citiùs ociùs pessimos  
 esse probat observatio.

Si escharoticorum ope mortuum se-  
 pararetur à vivo suppuratioque interme-  
 dia instituatür bonum est : malum è  
 contrâ si carnes siccæ remaneant, nul-  
 lumque sit suppurationis indicium.

In genere Carbunculorum & An-  
 thracum causæ , symptomata , exten-  
 sio, profunditas, locus affectus, tempe-  
 ries corporis, anni tempus, diversa re-

gio, mali progressus lucem afferunt in præfagiendis eventibus.

In omni Carbunculo confirmato vel est gangræna vel sphacelus; ergò mors partis aut incipiens aut integra. Undè statim sese offert necessitas promptæ medelæ.

Tutissima Carbunculis ferenda auxilia, sunt ferrum, ignis, caustica.

Si simplex sit & benignus Carbunculus sufficiunt scarificationes, & suppurativa quæ generationem puris promovendo mortuum à vivo separare faciant; demùm deterfiva ulcus exigit. Pro circumstantiis magis aut minus profundæ fiunt scarificationes.

Ut plurimum statim adurere escharoticis convenit Anthracem usquè ad carnes vivas. Mox juvanda eschara separatio mixtione stiracis & basilici aut similibus. Ulcus, more solito in adustis, detergendum.

Sunt casus ubi cum promptius agendum sit, cauterio actuali seù igne aduritur Anthrax. Aliquandò etiàm scalpel

o radicitùs aufertur Carbunculus.

Quænam futura sit diæta indicat ævities symptomatum. Promovenda diaphoresis quæ optima contra materiem foventem Carbunculos. Necessitate exigente, emeticis & catharticiis evacuandæ primæ viæ.

Quid agendum sit pro sanandis Carbunculis pestiferis non est istius loci explanare.

### *De Paronychiâ seu Panaritio.*

Ridiculus sanè fuit quorundam Antiquorum conceptus de Paronychiâ. Paracelsus rodentem vermem collocabat in parte cui insidet ille Tumor (a): propriis oculis vermem hunc se vidisse assererebat Joannes Agricola Medicus chemicus (b): historia vermis in Paro-

---

(a) Paracelsus, lib. de ulceribus, cap. 17.

(b) Agricolæ Chirurgia.

nychiâ latitantis multùm fuit adornata apud Germanos : sed hæc aut similia antiquioris vulgi sunt fabulæ.

*Paronychia* Græcis, *Reduvia*, *Panaritium* Latinis, Foresto aliisque *Apostema calidum in summitate digiti*, gallicè *Panaris*, unum & idem sonant.

Est Tumor inflammatorius circà extrema cujusvis digiti cum calore deurenti, dolore atroci, aliisque symptomatis magis aut minùs gravibus.

Sedulò adverti debent diversitas & textura partium digitos componentium, cùm exindè fluant varia Panaritorum genera. Desumptis nominibus à loco ubi adest morbi fomes, & à signis Panaritii cujuscumque characteristicis sequenti modo determinari posse diversa Panaritia autumamus.

1°. *Panaritium externum mutabile & fugax*. Hujus character distinctivus est transitus facilis & frequens illius Panaritii ex uno digito in alium ejusdem aut alterius manûs. Hæc species vernaculo idiomate Monspeliaco dicitur

*lou Roudaire.* Occupat cutem extremarum phalangium & propagatur usquè ad adipem suppositam, sed non profundè. Omnium Panaritorum istud mihius est; inflammantur enim solummodo cutis & superficies adipis, illæsis remanentibus partibus membranaceis & tendinosi: Hinc non tam deurens calor, non ingens adeò dolor ac in aliis Panaritiis. Per effusionem feri acris cutem inter & epidermidem efformatur vesicula magis aut minùs extensa in extremitate digiti.

Oritur ut plurimùm hoc Panaritium à causis internis quæ modò hunc modò illum digitum aggredientes præcipuum symptoma Panaritii fugacis constituunt, nempè mutabilitatem.

Si inflammatio serpat sub unguis, aut adipem penetrando intimiùs, ad tendinea loca perveniat, tunc ea prima species in alias graviores mutatur. Fraudulosa est Panaritii fugacis therapeia; uno enim ibi curato, alter alibi renascitur.

2°. *Panaritium externum fixum* cum descripto summam habet similitudinem easdem partes tenet, eodem laborat inflammationis gradu; sed non transit à digito in alterum digitum ut fugax. Vesicula externi Panaritii fixi exactè circumambit unguem usquè ad radicem ubi non rarò excitatur multùm dolorifica suppuratio.

Secunda hæc species Panaritii vulgè dicitur *la Tourgnole*. Oritur tùm à causis internis ut fugax, tùm ab accidentibus externis, ut ab ictu, contusione puncturâ.

3°. Cùm constet sæpè inflammari cutem ungui suppositam, exindè eruitur genus *Panaritii subungualis*. Id si à propriâ causâ sub ungue natum per se existat, idiopathicum est. Aliquandò procreatur ab aliis Panaritiis, præsertim verò à duabus primariis speciebus Panaritium subunguale sæpè pro causa habet acum, spinam, aut festucam quæ defixæ fuerunt intrâ carnes & unguem. Ictum quo contunditur cutis ungui sup



posita ; quamlibet pressionem violentam quâ intercipitur aut retardatur sanguinis motus in prædictâ cutis portione. In istâ Panaritii specie molestissima excitatur inflammatio quam suppuratio sequitur. Viribus inflammatoriis & suppuratoriis radix unguis violenter separatur à plicaturâ semilunari cutaneâ intrâ quam firmiter retinebatur : productiones mammillares quæ à cute obliquè enascentes implantantur (a) intrâ ipsamet unguis substantiam , ab eâ eradicantur per remotiorem unguis à cute. Ex atroci dolore Panaritii subungualis fiunt vigiliæ pertinaces , febris vehemens aliaque gravia symptomata.

---

(a) Ut concipiatur quantus debeat esse doloris gradus in Panaritio subunguali , dùm unguis à cute separatur , sufficit nosse intima unionem unguis cum cute mediantibus prædictis papillis cutaneis. Tanta est hæc unio , ut Ruyschius existimaverit unguis non oriri ab iisdem papillis. Ruysch. tom. 3. thesaur. 3. pag. 16. & seq.

4°. *Panaritium adiposum* est vera phlegmone adipis coacervatæ suprâ phalanges eâ in facie quæ respondet tendinibus flexoribus. Hæc inflammatio non solum tenacissima est more inflammationum adiposarum, sed multò gravior. Exquisitus enim est sensus cutis adipem digitorum cooperientis & latent sub hâc adipe sensilissimæ partes membranacæ & tendinosæ.

Signa distinctiva Panaritii adiposi sunt Tumor digiti magis elatus quàm in aliis Panaritiis; cuncta symptomata phlegmones; stupor in manu. Febris sequitur inflammationis intensitatem & doloris acutiem.

Tùm ab accidentibus externis, tum à causis internis inflammatoriis oritur hoc Panaritii genus.

Sæpè multùm extenditur ejus inflammatio quæ per adipis continuitatem transit ab extremitate digiti ad basim: exindè brevi inflammatur adeps faciei internæ maticarpîi: & aliquandò eò

usquè procedit malum ut in monstro-  
sam crassitiem crescere manus visa  
sit.

Nisi Panaritio adiposo brevi succur-  
ratur, aut si vires morbificæ arti su-  
periores sint, serpit purulenta mate-  
ries hùc & illùc in palmâ manûs: ef-  
formantur sinus & fistulæ curatu diffi-  
ciles.

5°. Pessimum est *Panaritium vaginale*  
seù quod sedem habet in vaginis ten-  
dinum digitos flectentium.

Si Panaritium istud hæreat in polli-  
ce, locus affectus erit vagina ligamen-  
tosa includens tendinem musculi longi  
flexoris pollicis, protensa unâ cum ten-  
dine incluso à ligamento annulari pe-  
culiari usquè ad faciem cavam tertiæ  
phalangis pollicis propè basim, ubi &  
tendo & vagina terminantur.

Si quis aliorum digitorum hâc Pa-  
naritii specie laboret, morbi fomes  
erit vel in vaginâ unius ex quatuor ten-  
dinibus musculi perforantis seù profun-  
di; qui tendines transmissi per mag-

num ligamentum annulare carpi, distincti & quilibet peculiari vaginâ muniti tendunt ad facies internas tertiarum phalangium ubi implantantur propè basim: vel morbi fomes latitabit in vaginâ unius ex quatuor tendinibus musculi perforati seù sublimis, quorum tendinum insertiones inferiores sunt insertionibus tendinum profundi, & fiunt ad faciem internam secundarum phalangium propè basim.

Ergò sunt in quâlibet manu novem distinctæ vaginæ tendinæ quæ quinto huic Panaritiorum generi subjiciuntur.

Signis sequentibus designatur Panaritium vaginale. Parùm tumet digitus affectus; sed calor adest immaniter deurens, dolor vix tolerabilis est, febris viget acutissima, vigiliæ sunt pertinales, aliquandò adsunt deliria motusque convulsivi. Non in solo digito morbofo persentitur dolor, sed extenditur ad digitos vicinos, ad manum, demùm juxtâ omnem brachii longitudinem

linem : intumescit manus etiã magis notabiliter quã digitus affectus. Paucò tempore multùm propagatur inflammatio à parte in partem.

Factâ suppuratione in vaginâ inflammata pus effunditur in ipsius cavum ubi permiscetur cum humore quo acies interna vaginæ & tendo lubricantur continuò. Abundantior hæc purulenta materies vaginam distendit, tendinem comprimit ; acrior partes corodit : per viam vaginæ patulam eandem materies transfluit à digitis ad metacarpum , ad carpum , ad brachium. Hinc nova gravioraque symptomata in omnibus illis partibus.

Tantâ quantitate coacervatur materies purulenta , saniosa , ichorosa in vaginis tendinosi , ut aliquandò per sectionem chirurgicam effusa obstupefactum reddat operatorem præsumnam ipsius abundantiam. Nihil ergò mirum si toties mortem inferat istud Panaritii genus.

Sævities symptomatum Panaritii va-

ginalis, totiès ex eo advenièns mortificatio non in digitis tantùm & manu sed & in brachio, mira celeritas quâ serpit malum rectè percipiuntur ab eo qui norit 1°. Effectus validæ inflammationis membranacæ & tendinæ. 2°. Continuitatem tendinum digitos flectentium ab ipsarum insertione usquè ad musculos è quibus orti sunt. 3°. Quatuor tendinum musculi perforantis seù profundi communicationes mutuas & cum tendinibus musculi sublimis seù perforati. 4°. Omnium illorum tendinum intimas uniones cum fasciis ligamentosis phalangium & cum ligamento annulari carpi. 5°. Contiguitatem & consensuram tendinum inclusorum & vaginalium includentium. 6°. Inflammabilitatem adipis circumambientis vaginas.

Oritur Panaritium vaginale à causa inflammatoriâ internâ, externâ afficiente aut vaginam aut tendinem, vtriusque partem.

Nonnè ad genus Panaritorum va

ginalium referri potest inflammatio adveniēns fasciis ligamentosis (a) faciei internæ primarum & secundarum phalangium, tendinēs sublimis & profundi & horum vaginas transmittentibus?

6°. Maximè internum Panaritii genus est *Panaritium osseo-periosticum*, cujus materies sub periosteō latitat. In hoc genere non tumet externè sensibiler digitus affectus, nequè rubet; sed atrox & profundus persentitur dolor; adsunt insomnia aliaque symptomata quæ morbos maximè dolorificos comitantur.

Duplex annotandum in Panaritio osseo-periostico stadium, cujus in primo inflammatur expansio membranosa, fortis, extensu difficilis, sensu exquisitori donata; periosteum dicta:

(a) Vide *Vvinfl. expos. anat. Traité des os frais*, n°. 48. *Traité des muscles*, n°. 318. & n°. 324.

in altero stadio acris & purulenta materies hæret inter periosteum & os, destruit fibrosas emissiones quæ à periosteo proficiscentes subeunt poros osseos & in substantiam osseam disperguntur. In isto Panaritio distrahuntur, rumpuntur nervi vasaque periostica; caries ossi advenit, & à parte osseâ in alteram propagatur.

Si materies purulenta hæreat juxta bases secundarum aut tertiarum phalangium, corrodentur fibræ musculi sublimis tendinosæ, quæ implantantur propè basim secundarum phalangium; aut fibræ musculi profundi terminatæ propè basim phalangium tertiarum.

Extensio periostei affecti, causa à quâ afficitur & natura materiei acris purulentæ sub periosteo latitantis futurum eventum determinant.

7°. Si inflammentur capsulæ articulares & ligamentula quibus bases & capita phalangium uniuntur inter se, peculiare ponitur Panaritii genus quod *capsulare* aut *ligamentosum* dici meretur.



Atrocissimi sunt dolores hoc Panarium concomitantes : impossibilis præ dolore ingenti articulatarum phalangium motus.

Suppuratione destructis his ligamentulis & capsulis , separantur ab invicem phalanges quæ post incisas carnes spontè decidunt.

8°. Præter assignata Panaritorum genera annumerari volunt *Panaritium pedis digitorum*. » Id pollices pedum cum doloribus atrocissimis infestat & nihil aliud est quàm paronychia pedis digitorum cui gangræna & sphacelus & tandèm mors supervenit. Ex eâdem causâ provenit , & eamdem medendi methodum postulat. Tutissima est digiti resectio. *Allen..... tom. 2. pag. 434. de Ettmulleri sententia.*

Ex dictis eruendum est. *Primò.* Quòd quantâcumque sedulitate distinguantur sedes & symptomata variorum generum Panaritii ; attamen hæc inter se aliquotiès posse confundi , præ-

sertim Panaritia vaginalia & osseo-perioftica. *Secundò.* Panaritium vaginale procedendo ad extremitatem digit non poffe extendi ultrà bafim tertiæ phalangis, ibi enim terminantur tendinum flexorum vaginæ. *Tertiò.* Panaritium unius generis in aliud genus poffe degenerare, aut aliud genus fibi adungere. *Quartò.* Si uno eodemque tempore inflammentur omnes partes digiti jam enumeratæ, futurum *Panaritium* ex omnibus *compositum* generibus. *Quintò.* Demùm, ratione habitâ & partis affectæ, & causæ, & symptomatum rectè distingui Panaritia in benigna & maligna.

Generica inflammationis multum dolorificæ auxilia locum obtinent in Panaritio genericè confiderato: fingularitè verò tractantur peculiariora Panaritia.

Expeditiffima est curatio fimplicis Panaritii externi. Sublatâ forcibus parte epidermidis quæ in extremo digito efformat vesiculam, contenta

acris materies evacuatur, brevique regeneratur epidermis.

Incidendus est unguis sub quo latet pus ut facilis puri effluxus paretur.

Emollientia & suppurativa topica conveniunt in Panaritio adiposo quod ferro aperiendum ut evacuetur sine morâ materies. Ulcus tractandum est methodicè. Difficilior tædiôsaque est curatio, si ab acri pure adiposo vaginæ tendinum corrosæ fuerint; si efformati sinus aut fistulæ intrâ diversos musculos manûs per expansionem materiei purulentæ.

Ad curationem panaritii vaginalis frustra adhiberentur remedia, nisi, evacuaretur purulenta materies recondita in vaginæ cavo. Itaque protinûs & absquè ullâ remorâ incidantur profundè cutis & tunica adiposa. Deîn aperiatur vagina tendinosa: prosequenda illius sectio quòusque perventum sit ad morbi fomitem. Parcendum, quantum fieri potest, ligamento annulari carpi. Auferendæ partes demortuæ, si quæ sint.

Evocatâ materiâ , ulcus probè purgandum est. In vitis auxiliis quibuscumque aliquandò in mortificationem incidunt digitus , manus integra, brachium : quæ partes amputandæ.

In ultimis Panaritii generibus ad curationem integrandam festinandum est. Ideò profunda fiat incisio ad os usquè & satis ampla debet esse plaga ad hoc ut pateat os affectum. Si in punctis quibusdam tantummodò destructum fuerit periosteum ( quod rariùs ) exfoliatio ossis juvanda & illud servari potest : si in totâ ossis circumferentiâ suppuraverit periosteum, caries ossi advenit, quod auferendum. Eximi & quoquè debet phalangis, dùm capsulæ & ligamenta articulationis omninò aut quoad magnam partem periêre. Sublatis quibuscumque partibus demortuis , vulnus tractandum juxtâ artis regulas. Cavendum nè plaga obturetur priùsq̃ quam demortuæ partes omninò ejectæ fuerint. Si sphacelatus fuerit digitus integer ,  
hujus

hujus instituenda amputatio ( a ).

*De Pernionibus.*

Hyemali tempore, peculiari specie Tumorum infestantur pedes & manus; imò quandòque extremitas nasi. Ille Tumor à Græcis dictus fuit *Chimetlon*, à Latinis *Pernio*, gallicè, *Mule*, *Engelure*. Oritur à partibus aëreis nitro-

(a) Lex hæc est generalis in instituendis extremitatum corporis superiorum amputationibus quòd ex partes ossæ conserventur quæ demortuæ non sunt; sic dum quæstio est de manu amputandâ, tantum longitudinis ossium cubiti & radii conseruatur quantum possibile. . . . hæc regula, quæ in genere optima est, admitti non debet in iis casibus panaritorum ubi amputandæ sunt digitorum phalanges. Etenim experienciâ comprobatur quòd carie affectis tertiâ & secundâ phalangibus cujusdam digiti si duæ illæ phalanges auferantur primâ superstite plurima subsequuntur incommoda tum ob facilem læsionem apicis phalangis superstitis ab impetentibus corporibus duris; tum ob impedimenta ab illâ phalange allata in diversis manûs motibus & exercitiis. Tutius ergò est primam phalangem à metacarpio juxtà artis regulas reparare: hæc enim methodo citius peragitur curatio, nullumque imposterum incommodum superest.

sis (a), aut iis affinibus applicatis alicui ex prædictis locis corporis.

Etiam si generalissima sit hæc Pernionum causa, attamen indiscriminatim Perniones non adveniunt quibuscumque frigus patientibus. Quædam enim corpora invito maximè acri frigore Perniones eludunt, dùm è contrà quidam ad frigoris præludia statim iis Tumoribus afficiuntur.

Perniones frequentius invadunt pueros, mulieres, eaque adultorum corpora quorum textura est delicatula.

Undè eruitur debilem texturam extremarum partium corporis esse causam Pernionum, antecedentem seu proëgumenam: frigus pro causâ procathartica habendum esse.

Ab actione partium nitrosarum ærearum in prædispositas extremas partes corporis sequentia exurgunt phœnomena. Stringitur cutis digitorum

---

(a) Consul. experiment. Muschenbroëkii.

pori ejus partim obstipantur ; sanguis ad interiora repellitur ; coagulantur fluida in pedum , manuum , nasi vasis circulantia , præsertim lymphæ ; minùs mobiles fiunt illi humores difficiliùsque progrediuntur per vasa cutanea quæ à fluidorum moleculis lentè , difficilè , inæqualiter fluentibus distracta , & velut concussa eam in fibris nerveis excitant distractionem cui debetur dolor , pruritûs nomine donatus : quod primum est nascentium Pernionum symptoma : Continuatâ frigoris seù partium nitrosarum impressione in prædictas partes quæ sunt à corde remotissimæ , magis densantur lymphæ & sanguis , magis corrugantur vasa , determinata fit in iis obstructio lymphatica & sanguinea cui inflammatio succedit ; intumescit enim pars , calet , rubet , cum pruritu maximè ingrato , noctu præsertim sæviente ; imò cum dolore acri , pungente , rodente .

In errorem inducitur qui existimat ab aliâ quâcumque causâ præter actio-

nem frigoris posse produci & foveri talem inflammationem quæ Perniones faciat : hæc enim inflammatio ab aliis inflammationum speciebus distinguenda, unicè debetur energiæ nitrosarum seu frigoriferarum partium (a). Ideò vigente frigore vigent Perniones, cessante hyemali tempestate illi evanescent.

Quæ primariò rubentes erant Perniones, dein livescunt ob immutatam fluidorum obstruentium densitatem per vim frigoriferam. Attendamus ad mutationes quæ fiunt in cute etiã benè valentium à passo frigore : statim color cutis mutatur in pallidum lividumque ; crescente frigore livescit intentius.

Periodicè recurrunt ut plurimùm Perniones : qui enim hyemæ præceden-

(a) Partes frigoriferas verè intromitti in textum partis Pernione affectæ, innuisse videtur *Sennertus* dum ait : „ Nequè enim qui valdè refrigerantur, nudam saltèm alterationem patiuntur sed aliquid substantiale parti affectæ communicatur, &c.



i vigeant , initio subsequenti hye-  
 nis recrudescunt , & sic per plurimum  
 annorum seriem. A nimio calore  
 dolor intenditur in Pernionibus ,  
 propterea quod quæ antea hærentia  
 quiescebant fluida subito à cito ca-  
 lore multum in motum aguntur , un-  
 de magnæ vasorum & consequenter  
 fibrarum nervearum distractiones. Præ-  
 terea cum rigida sint & corrugata va-  
 sa partis affectæ Pernione , ea non  
 obediunt contentorum fluidorum mo-  
 tibus , rumpuntur aut ad ruptionem  
 accedunt , dum calore exagitabuntur  
 tumores ; unde doloris augmentum.  
 In mortificationem abire visi sunt Per-  
 niones nimis excalescenti. Et quidem  
 constat , humores congelatos , si à ca-  
 lore subito resolvantur , putrescere at-  
 que sphacelum creare.

Plerumque sponte resolvuntur Per-  
 niones & absque ullo remedio curan-  
 tur. Aliquando in suppuratum abeunt.  
 quo in casu sæpè efformatur ulcus for-  
 didum carnes profundè exedens. Rarò

evenit mortificationem Pernionibus supervenire; nisi adsint illi Tumores in corpore pessimè disposito, aut quædam accidentia externa adveniant. Difficilior est Pernionum curatio vigentibus frigoribus quàm iisdem remittentibus. Varia prædicantur ad debellandos illos Tumores. Pernionibus resolutioni habilibus conveniunt topica resolventia, spirituosæ præsertim; exulceratis Pernionibus detergentia, exsiccantia, consolidantia: tandèm si mortificatio immineat aut præsens sit, recurrendum ad ea quæ mortificationi adversari dictum fuit alibi.

### *De Parotidibus.*

Tumores *Parotides* dicti consistunt in præternaturaliter auctâ mole glandularum parotidum, positarum ad utrumque latus inter aurem externam & portionem posteriorem maxillæ inferioris, salivale liquidum ab arterioso sanguine secernentium per minimos

canales confluentes ad stenonianum ductum qui perforans muscolum buccinatorem in oris cavo aperitur circa secundam & tertiam dentem molarem superiorem.

Indiscriminatim non confundendus quilibet Parotidum Tumor; sed hujus diversa sedulo annotari debent genera.

*Primò.* Occurrit *Parotis inflammatoria* quæ duplex, nempe vel primaria vel secundaria.

Rarius, primario generatur inflammatoria Parotis: accidit potissimum in juniore ætate & mitior est quam in ætate provecâ, cum vel feliciter suppuret, vel resolvatur ut plurimum.

Secundaria Parotidum inflammatio oritur, 1°. Ab hærentiâ sanguinis intrâ textum glandularum Parotidum in quibusdam febribus malignis, ardentibus, aliisque. 2°. A metastasi excernendorum præternaturaliter retentorum. 3°. A materiâ quorundam affectuum superficialiorum intròpulsâ &

ad Parotidas determinatâ. 4°. Ab actione mercurii per frictions in corpore intromissi & certis in circumstantiis Parotidas elevantis in Tumores dolentes inflammatorios. 5°. A quibusdam percussione capitis quas subsequitur major derivatio sanguinis ad Parotidas.

In acutis morbis futuræ prævidetur Parotides inflammatoriæ, ab iis signis quæ denotant sanguinis impetum fieri versus superiora.

In febribus malignis Parotides inflammatoriæ, præduræ. ustionis sensum habentes, & lividæ mali moris sunt. Funestæ in acutis Parotides dolorificæ suppurati expertes (a).

Frequens satis & multum funesta est introductio materiei Parotidis inflammatoriæ ad cerebrum, pulmones, aliamque partem nobilem.

---

(a) Hippocrat. coac. lib. 2.

Metuendæ sunt Parotides inflammatoriæ quæ morbi cujusdam acuti sunt superstites (a).

Tutò pronunciatum de Parotidum febrilium eventu, contemplando nùm ingravescat nùm mitescat febris è quâ Parotides promanant.

Mali Parotidum inflammatoriarum eventus aliquandò præveniuntur largâ hæmorrhagiâ, alvi fluxu bilioso, urinâ copiosâ, crassâ (b).

Inflammatoria Parotis tum primaria tum secundaria redolet ut plurimum naturam phlegmones schirrosæ: quod satis solemne est in inflammationibus quæ loca glandulosa tenent.

Secundò, Parotis purulenta fit aut vitio locali dum glandulæ illius inflammatio abiit in suppuratum & efforma-

(a) Parotides rubræ, exacti jam morbi superstites, in febribus ortæ signa sunt erysipelatis in facie nascituri. Quin etiam ex talibus convulsiones accipiunt cum aphonîâ. Hippocrat. coac. lib. 2.

(b) Vide Hippocrat. ibidem.

tus fuit abscessus: aut translatione puris à diversis corporis partibus ad Parotidas.

Desideranda est puris in Parotidibus confecti prompta evacuatio. Benè operandum est si evacuatum purus bonus sit: malè judicandum, si corruptum existat. Noscitur quondam in suppuratum abiit Parotis ex signis notatùm de phlegmone suppuratâ.

Frequentes sunt Parotides purulentæ per metastasim. Locum habentur  
1°. In febribus lentis symptomaticis quondò scilicèt sanguini remixta materies ulceris, fistulæ, abscessus obfidendum organum quoddam, ad Parotidas deponitur quas in Tumore elevat: quondò similis fit remixtio ichorosæ, saniosæ, purulentæ materiei carcinomatum, cariei: quondò in quâpiam cavitate collectum purus resorbetur osculis vasorum absorbentium permiscetur toti sanguini & inter circulandum ad Parotidas defertur & colligitur. 2°. Fit etiàm hæc Paroti-

is species à metastasi puris per acutum morbum efformati in aliquo viscere undè rapitur ad glandulas parotidas. 3°. A præmaturè clauso ulcere externo partium à capite etiàm maxime diffitarum, uti femorum & tibiarum. 4°. Ab abscessu externo non satis citò aperto: undè ad interiora refluxus materiei purulentæ; atque aliquandò raptus versùs Parotidas, vel per anarrhopiam vel per catarrhopiam.

Dùm post suppurationem interni cuiusdam visceris aut post empyema fiunt pitis gravitas, stupor, sonitus bomboque aurium, surditas cum comate, purulentæ præfagiuntur Parotides. Præsentiantur etiàm si signis puris in sanguine succedat dolor glandularum Parotidum: si intropulso quoque abscessu externo doleat caput & rapti ad superiora puris sint indicia.

Quotiès post factas Parotidas purulentas minuuntur morbi symptomata, bene sperandum; malè, quotiès non minuuntur aut adaugentur.

Pessimæ sunt citò evanescentes e Parotidum species. Pessimæ quæ fiunt sub morbi finem exhaustisque ægri viribus.

Pus effluens per aliquod colatorium ut intestinale, renale, interim immutata morbi sævitie & evanescente Parotide morbum aliquandò solvit.

Materies purulenta facto impetu & promptè ad Parotidas colligitur in morbis acutis: lentè sensim & sine sententia in chronicis.

*Tertiò.* A venenorum exhaustorum materia ad Parotidas delata alterum fieri Tumorum Parotidum genus probant hæc *Senerti* verba.... » Sed & venenorum exhaustis Parotides accidere possunt; id quod *Vitebergæ* factum meminimus. Cùm enim ancilla quædam piscis coctura ex vase in quod glis incidit & in aquâ suffocatus fuerat aquam imprudens haussisset ac in eam piscis coxisset: studiosi, nè fallor decem, cùm hospitâ ægrotare cœperunt & aliquot ex iis mortui sunt. Exi-



» qui convaluerunt, duobus etiàm Pa-  
 » rotides post aures erupuerunt.

*Quartò.* Quæ per bubones & anthra-  
 ces ad exteriora vergere confuevit  
 pestis materia, sæpè ( *a* ) etiàm versùs  
 Parotidas convertitur. Undè genus  
*Parotidum pestilentialium*, quarum even-  
 tus eruas è febris pestilentialis histo-  
 riâ.

*Quintò.* Demùm in temperamentis  
 leucophlegmaticis præsertim adveniunt  
 Parotides aut œdematosæ aut schirro-  
 sæ, prout vel fluxilis vel concreta hæ-  
 ret lymphæ coacervata copiosius intrâ  
 texturam Parotidum.

Istud Parotidum genus designasse vi-  
 detur Duretus ( *b* ) his verbis... » Sin  
 » autèm crassi & frigidi humores in-  
 » flectunt cursum ad caput, comata  
 » & Parotidas adferunt. Hujus generis  
 » Parotidas paraplegiæ supervenientes

---

( *a* ) Vide diversas pestis Historias passim apud  
 Scriptores Medicos.

( *b* ) Duretus in coac. Hippocrat. lib. 1.

» pessimas esse pronuntiavit Hippocrates (a).

In Parotidibus generatim consideratis optanda resolutio, si materia contenta bona sit; & è contrà si materia sit prava, maligna, venenosa, pestilens.

Ut plurimum pertinaces magis sunt Parotides inflammatoriæ secundariæ quàm primariæ. Inflammatoria ab actione mercurii, imminentem ptyalismum præfagit.

Parotis œdematosa facilè in schirrosam & in cancrösam mutatur ab actione fortiorum resolventium & repercussivorum.

Parotides quæ ab inquinatâ generali sanguinis massâ oriuntur, etsi benè suppuraverint, attamen salutem non portendunt.

---

(a) Vide quæ de iis protulit Daretus in lib. coc. Hippocrat. pag. 116.

Lex hæc est generalis & invariabilis quòd Parotides quæcumque erumpentes sine symptomatum imminutione, vel cum eorum augmento, malæ sint; & dicuntur *symptomata*: Parotides erumpentes cum symptomatum remissione, bonæ sint; & *criticæ* nuncupantur.

Ut feliciter procedat curatio Parotidum; attendere juvat nùm primariæ nùm secundariæ sint.

1°. Parotidis primariæ tùm inflammatoriæ, tùm purulentæ, sive œdematosæ, sive schirrosæ curatio repetenda est ab iis quæ dicta sunt in curationibus phlegmones, œdematis & schirri.

2°. In Parotidibus secundariis perscrutandis auxilia interna desumenda sunt à methodo curandi morbos è quibus promanant Parotides.

In genere si bona sit materies Parotidis inflammatoriæ, non nimis impacta, nec maligna, nec pestilens, in vasis integris coacervata tentari potest resolutio topicis appropriatis.

Si mala fit materies, non resolubilis, pestilens aut maligna, adjuvanda suppuratione maturantibus & suppurativis.

In Parotidibus purulentis quibuscumque non expectandum quominus natura sibi viam aperiat, sed citò ferro utendum est. Mox expurgandum ulcus, & procuranda cicatrix quod plerumque facilè non (a) exequimur.

Parotis venenosa expetit alexipharmaca & promptam materiei expurgationem.

In Parotide actione mercurii productâ per dies aliquot supersedendum est frictionibus mercurialibus.

In tractatione Parotidum tum criticarum tum symptomaticarum abhorrendum à repercutientibus.

Si debilior sit natura sibi que non sufficiat refocillanda est: & è contrâ temperandi sunt nimii ipsius motus.

---

(a) De difficultate persanandi ulceris Parotidum  
Vide Ledran observ. chirurg. tom. 1. pag. 6.

sic naturam dirigendo, ars meliùs succedit.

### *De Bubonibus.*

*Bubo* genericè consideratus est Tumor humoralis inguinibus insidens. Incipiens seù imperfectus *Bubo* merè lymphaticus est: *Bubo* perfectus schirrho-phlegmonodes existit. Quæ distinctio ad explicandam *Bubonis* efformationem summè utilis.

Imperfecti *Bubonis* signa sunt Tumor inguinalis exiguus, renitentia & durities, nullus fermè dolor, nullomodò aut parùm mutatus cutis color.

Perfecti *Bubonis* notæ sunt major Tumoris moles, ipsius dolor, calor, rubor, durities, lentor ad suppurationem.

Sedent *Bubones* quicumque in glandulis conglobatis quæ locantur ad inguina. Duplex fit obstructionis species in illis glandulis antèquam *Bubo* perfectionem fuerit adeptus. Obstructio

antecedens lymphatica est: locum habet in vasis lymphaticis valvulosis corpus glandulæ inguinalis ingredientibus ex unâ parte & egredientibus ex alterâ. Obstructio subsequens est sanguinea: accidit in apicibus sanguiferarum arteriolarum quæ majores disperguntur suprâ membranam externam glandulæ inguinalis; mox ramis minoribus & plerùmque multiplicibus penetrant substantiam glandularem atque extremis propaginis suprâ folliculos & ad vicinia desinere videntur.

*Sextuplex* annotandum venit Bubonum genus: scilicet Bubo *simplex*; Bubo *febrilis*; Bubo *pestilentialis*; Bubo *venereus*, *Poulain*; Bubo *puerilis*, le *Croissants*; Bubo *scorbuticus* & *scrophulosus*.

*Primò*. Si à causâ quâpiam (nequè febrili, nequè pestilentiali, nequè venereâ, nequè scrophulosâ, nequè scorbuticâ) lymphæ quæ per vasa bartholiniana ad glandulas inguinales defertur, ibi hæreat spissior, siccior, concrescens obstructio nem faciet quæ principium est Bubonis.

simplicis. Crescet subindè schirrosa hæc obstructio : comprimuntur arteriæ sanguiferæ in exteriori membranâ glandulosâ dispersæ & suprâ folliculos ramicatæ : hinc difficilis transitus sanguinis per extrema arteriarum compressarum : facta obstructio sanguinea : subsequens inflammatio.

Ergò in efformato Bubone simplici vasa lymphatica schirrosa sunt ; vasa sanguifera tenet inflammatio. Ex quo duplici morbofo statu fluunt pathognomonica Bubonis simplicis symptomata.

*Secundò.* In febribus quibusdam , magnis potissimùm , sanguis & lymphæ fluendum per vasa minima parum abiles lentescunt , hærent pluribus in locis , eòque faciliùs quòd in febrium malignarum genere vires cordis & arteriarum non validè impellant. Si igitur portio materiei febrilis ad inguinæ determinetur , obstructiones procreat tum in lymphaticis tum subindè sanguineis glandularum inguinalium :

undè Bubones febriles.

*Tertiò.* Eo tempore quo grassatur pestis aut uno vel altero anno post illam (a) vigent Bubones pestilentiales qui modò solitarii, modò cum carbunculis erumpunt. Bubonum non pestilentium characterem servant pestilentes in majori suâ sævitie.

*Quartò.* Bubonibus ex impurâ venere ortis sæpè infestantur inguina. Illi Tumores subsequuntur luem venerearum tum recentem tum inveteratam, gonorrhæam virulentam suppressam parcius-vè fluentem & ulcuscula carcerosa.

Non secùs ac cæteri Bubones, licè diversâ causâ, efformantur Bubones venerei in quibus primò & essentialiter obstruuntur vasa glandularum inguinæ.

(a) Febres quæ anno uno vel altero post graviores pestem grassantur pestilentes sunt & similes medendi rationem sibi vindicant. Sydenham de febre pestilentiali & peste.



lium lymphatica; per accidenstantum inflammatis earum arteriis sanguiferis.

*Quintò.* Rariùs scorbutum, sæpiùs luem strumosam comitantur Bubones, ideò scorbutici & strumosi dicti.

*Sextò.* Pueris & adolescentibus sæpè adveniunt duri Tumores glandularum inguinalium: parùm aut nihil habet inflammatorii hoc Bubonum genus quod inter alia genera mitius est.

Jàm verò cognoscitur Bubo simplex 1°. Per absentiam signorum luis venereæ, gonorrhææ virulentæ, febris vel alterius morbi antecedentis aut concomitantis Bubonem. 2°. Per præsentiam Tumoris inguinum initio parvuli, duri, mox pedetentim crescentis, rubri, dolentis, calentis. Bubonibus simplicibus proniora sunt ea temperamenta cachectica quorum humor lymphaticus inspissatione peccat, aut huic suscipiendæ multùm dispositus est. Plurimum lentæ sunt Bubonis simplicis inflammatio & suppuratio. Timendum nè longiori remorâ puris fiant fistulæ

perniciosæ & curatu difficiles (a). Non ergò expectandum quòd spontè rumpatur ulcus, sed à Chirurgo aperiendum illud est.

In febribus malignis Bubones symptomatici erumpentes sine imminutione symptomatum aut cum ipsorum augmento exitiales pronuntiantur : & è contrà præfagitur salus à criticis Bubonibus quibus succedit remissio symptomatum. Pessimum est si in Bubonibus febrilibus observentur durities, sensus ustionis, lividitas, gangrænodea dispositio; interim pulsu existente debili, obscuro. Noscitur materiam febrilem Bubones producentem peccare potissimùm inspissatione, dùm Bubones sunt indurati absquè ullo ustionis sensu; simulque adfuerunt vehementia rigorum febrilium, inæqualitas potius

---

( a ) Vide quæ proferunt circà periculosas Bubonum fistulas Fabric. ab aquâpendente, lib. 1. de Tumoribus cap. 13. Zacut. Lusitan. lib. 1. cap. 72.

quàm frequentia pullûs, sopor, somnolentia obstinata, delirium obscurum, urinæ sanis similes aut quales jumentorum.

Prædominans materiei febrilis Bubones facientis acrimonia declaratur per rigores febriles minores, corporis calorem acrem, cutem veluti exsiccatam, oris & faucium ardorem, sitim intensam, delirium cum vigiliis, pulsum frequentem correptum, urinas rubras admodùm ardentes & aliquandò sanguinolentas, deniquè per sensum ustionis in Bubonibus. In genere periculosiores sunt Bubones febriles ab acri quàm ab spissâ materiâ tùm ob difficiliorem medelam febrium malignarum ab acri, tùm ob frequentiorum ad interiora metastasim acris humoris Bubones facientis.

*Febres in Bubonibus calamitose sunt omnes, præter ephemeræ. Hippocrat. aphor. 55. lib. 4. Qui sine causâ manifestâ nascuntur Bubones, cum viscerum inflammationibus unâ invadunt; ob eamque cau-*

*Sam febres cum iis conjuncta pessima esse solent. Galenus.*

Ab aliis Bubonibus quibuscumque haud difficile distinguuntur pestilentes Bubones; si attendatur ad pestiferam constitutionem vigentem aut à paucò tempore evanitam.

*Benigna Bubonis eruptio quæ materiam morbificam foràs ablegat, ægrotañtes pestiferos ab luctuosissimo discrimine liberat Sydenham. Lubricam atquè alea plenam in se esse pestis per Tumores judicationem ex eo manifestum est, quòd interdum Bubo qui primum laudabiliter ac cum symptomatum remissione protuberavit, postea ex improvìso dispareat ejusque loco macula purpurea; certissimi mortis indices, succedant. Sydenham. Pestilentes Bubones qui cum fluente liquidis, maximèque aquosis, cruditatis participibus excrementis alvo, lethales fiunt. Duretus in coac. Hippocrat. lib. ultimo. Præstat in peste febrem supervenire Buboñi, quàm febrì Buboñem. Duretus in coac. lib. 1.*

Bubones venereos distinguit Astrucius

cius in phlegmonodæos , œdematodæos , & schirrodæos: quæ variæ species determinantur per diversitatem symptomatum. Viru venereum cum lymphâ glandularum inguinalium commixtum , hanc inspissat & Bubonem creat nunc in dextro nunc in sinistro , nunc in utroque inguine. *Vide Astrucium de morbis venereis.*

Quid de Bubonibus scorbuticis & strumosis sentiendum sit edocemur per causam & effectus strumarum & scorbuti. Illi Bubones facilè ab aliis distinguuntur per signa horumce morborum characteristica.

Eò tempore quò accrescit corpus , eù dùm plùs additur partibus solidis nostri corporis quàm fuit amissum , redundans lymphæ coacervatur in juvenilium corporum glandulis inguinalibus , quæ intumescunt & indurantur. Nihil metuendum est ab hâc Bubonum specie. Solius naturæ vires resolutionem t plurimùm perficiunt.

Ex iis quæ hæctenùs de diversis Bubo-

nibus prolata fuêre intelligitur signis peculiaribus designari unamquamque Bubonum speciem; diversissimamque de illa afferendam esse prognosim. Omnia Bubones criticos intròpellentia rejiciendos sunt. Quandòque profundius serpi exulcerati Bubonis materies (a) gravissimamque infert symptomata, cavendum nè incautè Bubones confundantur cum herniis inguinalibus (b) & præsertim cum enterocele crurali.

Quod attinet ad therapeiam Bubonum 1°. Bubonum pestilentialium, venereorum, scorbuticorum & strumoforum cura, ad curationem morborum è quibus sobolescunt ii Tumores, remittentur.

(a) Thomas Bartholinus observavit in muliere Bubonem exulceratum è quo simul cum pure exhibant materies alimentares. Undè nullum dubium quin pus usque ad intestina penetraverit eaque corroderit. *De Médecine efficace, tom. 4. centurie 9. observ. 57.*

(b.) Imperitus Barbitonfor Bubonocelen pro Bubone venereo habuit, secuitque, prodeuntibus ex intestinis alvi fœcibus. Petr. Marchet. observ. 55. videlicet istius nostri Tractatûs pag. 7. nott. (c).

ha est. Bubones pueriles si spontè non  
 resolvantur diùque persistant, curantur  
 facillimè corporis exercitatione; par-  
 tioribus alimentis; purgantibus; levi-  
 bus incidentibus; topicis emollientibus,  
 attenuantibus, discutientibus. 2°. Bu-  
 bo simplex expetit diætã generalia-  
 que remedia quæ in curatione phleg-  
 mones fuerunt designata. Itaque eò te-  
 uior diætã præscribatur quò major est  
 Bubonis simplicis sævities, majorque  
 gradus febris à Bubone excitatæ. Si  
 Bubo sit incipiens & futuram promit-  
 tat resolutionem ea adhibeantur re-  
 solventia quæ Tumori partim schirro-  
 to, partim leviter inflammato conve-  
 niunt. Si vel impossibilis vel contrain-  
 dicata sit resolutio, Tumor in pus ver-  
 tatur suppurantibus depromptis è classi-  
 ficatosorum & attenuantium, ob iner-  
 tiam & spissitudinem materiæ Bubo-  
 nis. Factâ suppuratione, illicò ferro ape-  
 riendum est ulcus quod more consue-  
 to detergetur.

*De Tumoribus Buboni-formibus.*

Etiàm si nomen Bubonis apud Græcos significet ipsum inguen; voluerunt tamen Tumores glandulosos inflammatorios sub axillis, in jugulo, & ad latera maxillæ inferioris enascentes, Bubonum titulo etiàm insigniri. Spurii illi Bubones, rectè *Buboni-formes* (a) dicti Bubonibus veris seu inguinalibus simili easdem obtinent differentias: sunt enim modò simplices, modò febriles nunc pestilentes, nunc venerei; aliquid quando scorbutici vel scrophulosi. Tumorum Buboni-formium eventus variant pro varietate causæ Tumoris, extensionis, profunditatis, terminationis. Citiùs procedit suppuratio Bubonum sub axillis aut in collo, tardiùs in inguinibus. In vico Sancti Bricii propè

---

(a) Astrucius de morbis venereis, tom 1. lib. 3 cap. 5. pag. 229.



Montepelium vidi in ægrotante Rustico Bubonem subaxillarem malignum & exulceratum tantæ extensionis ut binorum pugnorum magnitudinem adæquaret. Apertio cadaveris Chirurgo instituta docuit à pure corrosivo ità denudata fuisse vasa subaxillaria ut nè minimum adipis frustulum superesset ; imò exteriùs corrosas fuisse membranas venæ axillaris quæ insufflata , ob tenuitatem membranarum subitò disrupta fuit.

### *De Scrophulis.*

*Scrophula*, *Strumæ*, gallicè *les Écroüelles*, sunt Tumores lymphatici schirrosæ naturæ, à *viru scrophuloso* excitati in locis glandulosis, plerùmque indolentes, insensibiliter efformati & succrescentes, signisque characteristicis insigniti.

Innumerabilium symptomatum cattervam in humano corpore excitat viru scrophulosum uti spinam ventosam,

pædarthrocacem , plerosque rachitico-  
rum affectus , phthifim ( *a* ), alvi fluxus  
maximè perniciosos , febrem lentam ,  
marasimum , hydropem , eryfipelas ,  
exanthemata , aliaque plura morbifica  
fymptomata quæ à lue fcrophulofâ  
progigni dignofcit obfervator fedulus.  
Sed hæc propofito aliena.

Sedes propria fcrophularum funt  
glandulæ conglobatæ feù lymphaticæ  
quæ per totam ferè corporis regionem  
( *b* ) difperguntur , præfertim verò illæ

( *a* ) Vide Morton de phthifi fcrophulofâ.

( *b* ) Rectè in externas & internas dividuntur glandu-  
læ conglobatæ quæ ftrumofâ lue afficiuntur. 1°. Exter-  
næ funt glandulæ lymphaticæ juxtâ falivares conglu-  
meratas pofitæ ; jugulares quæ fecundùm venæ jugu-  
laris internæ tractum ordinantur ; cervicales ad poſte-  
riora & ad latera colli copioſiſſimè difſeminatæ ; axilla-  
res , inguinales , mammariæ , & innumeræ aliæ glandu-  
læ conglobatæ inter-mufculares aut adipofæ , ad ex-  
teriora capitis , pectoris , abdominis & extremitatum  
difperſæ. 2°. Glandulæ conglobatæ internæ funt mezen-  
tericæ , & eæ omnes quas in cavis pectoris , abdomi-  
nis , & intrâ viſcerum contentorum textum detexit Ana-  
tomicorum ſolertiâ.... Conſulantur Vvarthonus , Mal-  
pighius , Vvinſlovius , Morgagnius.

quæ locantur ad collum, axillas, inguina, genua, cubitum, carpum, digitorum articulationes.

Oriuntur strumæ à cacochymiâ lymphæ viscosæ & acris quæ per vasa bartholiniana ad glandulas conglobatas defertur. Determinata hæc lymphæ strumosæ cacochymia glandulas lymphaticas obsidens causam proximam & continentem scrophularum ponit: & non amplius scitur ( quidquid de proprietatibus salium in viru scrophuloso contentorum fusè sed non dilucidè enuntiaverit Charmettonus ( a ) ).

Virulentam lymphæ strumosæ cacochymiam constituunt 1°. Lues strumosa à parentibus transmissa. 2°. Lac nutricis scrophulosæ ab infante haustum; vel idem lac, etiâ si sana fuerit nutrix, in primis viis infantis malè ela-

---

( a ) Essai théorique & pratique sur les Écroüelles par Mr. Charmetton, Chirurgien de Lyon, imprimé à Avignon 1752.

boratum aut perversum 3°. Apud juveniores, aut apud virgines picâ laborantes absurdorum, crudorum usus 4°. Apud omnes ingesta quæ valent glutinosos, viscosos & acres humores supeditare 5°. Vitia motûs circulatorii vel excessu vel defectu peccantis 6°. Sanguis spissus & acer lympham ejusdem indolis è penu suo in secretoria lymphatica emittens 7°. Deniquè causæ quæcumque internæ, externæ, fortuitæ, necessariæ, quibus viscositas & acrimonia succo lymphatico conciliantur.

*Benignas inter & malignas strumæ æqua datur distinctio. Benignæ duriusculæ sunt, mobiles, indolentes, cuti concolores, aliquandò inflammatae sed leviter, exulceratae, mitè suppurantes; uno verbo levibus stipatae symptomatis. Malignæ verò duriores existunt, immobiles partibusque vicinis adhærentes, dolorificæ, subrubræ aut lividæ, maligniter exulceratae, signa gravia præ se ferentes & sæpè morbos gravissimos*  
post

post se trahentes. In assignandis strumarum diversitatibus ad sequentia juvat attendere.

1°. Modò unica existit struma: modò plures adsunt. Struma dùm unica est, rarò efformatur à solâ glandulâ obstructâ, sed fit concursu plurium glandularum strumofarum veluti coacervatarum. Strumæ multiplices vel solitariè in diversis partibus disperguntur, aliæ ab aliis remotissimæ: vel non longè à sese mutuò enascuntur in eâdem parte.

2°. Scrophulæ collum occupantes aut superiores, aut mediæ, aut inferiores sunt: nunc tracheam-arteriam & laryngem attingunt & comprimunt; nunc directione ad posteriora ab iis partibus recedunt; quandòque longâ serie ordinatæ tendunt à jugulo ad claviculas & *concatenata* dicuntur: vasa jugularia aliquoties attingunt iisque adhærent.

Axillis & inguinibus advenientes Scrophulæ confundi possunt cum bu-

bonibus, aut cum tumoribus buboniformibus, à quibus tantum videntur differre ratione causæ.

Cubito, carpo, digitorum articulationibus, genibus frequenter supernascuntur Scrophulæ, quæ, more obstructionum à congestione, fiunt sensim & sine sensu. Has strumas comitantur articulationum immobilitas, dolor acutissimus, summi ponderis sensus, sæpè ossium extuberatio, caries. Dantur strumæ omnium profundiores, quæ ossibus uti costis adhærescunt, atque sese tumefaciendo propellunt musculos aliasque partes molles superpositas.

Advertere jam convenit frequentius quàm vulgò creditur Scrophulis laborare interiora corporis. *Barbettus* (a) in cadavere virginis quæ strumas in collo gesserat, reperit mille ultra glandulas scrophulosas à faucibus ad

---

(a) *Barbettus* lib. 2. cap. 2.

os pubis usquè. *Fontanus* (a) disse-  
cuiit cadaver juvenis qui à strumis  
fauces & vias aëreas comprimantibus  
suffocatus fuerat: repertæ sunt strumæ  
in ventriculo, pulmonibus, omento,  
mezenterio, pancreate, intestinis,  
collo vesicæ. *Heurnius* (b) scrutatus  
est cadaver puellæ quæ diù strumis  
multis & magnis in colli ambitu &  
sub axillâ finistrâ laboraverat: obser-  
vatum est mezenterium, omentum,  
pancreas innumeris & prægrandibus  
scatere strumis; peritoneo, diaphrag-  
mati, mediastino, uterique ligamen-  
tis plures infederant Scrophulæ; ori-  
ficium ventriculi superius strumas etiàm  
habebat; hepar, lien, pulmo extùs  
intùsque strumis referta erant; tuni-  
cæ intestinorum & renes minutissimis  
Scrophulis infestabantur; demùm in

---

(a) Nicol. Fontanus, respons. & curat. medic.  
pag. 66.

(b) Heurnius, observ. 10.

durâ meninge struma reperta fuit.

Ex quibus millenisque similibus observatis constat ab obstinatis & malignis strumis exterioribus, semper suspicandam esse internarum scrophularum existentiam.

3°. Plurimum in acquisitâ mole variant Scrophulæ, quarum aliæ minimæ sunt nucis avellanæ aut ciceris magnitudinem non superantes: aliæ majores existunt quales vulgò in collo inguinibus, aut axillis observantur: aliæ maximæ molem capitis infantum adæquantur ab axillâ utrâque propendere visæ sunt (a). Scrophulas in collo cujusdam austriaci vidit *Fabricius Hildanus* (b) quæ in tantam magnitudinem excreverant, ut colli circumferentia sese ad spithamas ferè quatuor extenderet: iis strumis non solùm replebatur spa-

(a) Observ. Philipp. Salmuth, Sereniff. Princ. Danhalt Med. primar.

(b) Fabric. Hildanus centur. 3. observ. 85. monstruoso & scrophuloso collo.



tium quod est inter collum & basim maxillæ inferioris ; sed etiã ad aures, cuturam lambdoideam , mediamque partem sterni producebantur illi Tumores. *Dominicus Panarolus* Medicus Romanus ( *a* ) vidit in juvene duodecim annos nato Tumorem scrophulosum qui post mortem fermè quadraginta libras ponderavit.

In molem adeò prodigiosam ( *b* ) temporis lapsu , strumas aliquandò excrescere mirari desinet qui animo volutaverit immensam copiam liquidorum quæ intrà notabile temporis spatium ad Tumores strumosos affluit ; sensimque & sine sensu distendit partes solidas quarum vasa sunt dilatabilia usquè ad stupendam tumefactionem.

---

( *a* ) *Dominic. Panarol. Medic. roman. observ. tom. 4. De la Médecine efficace pag. 216.*

( *b* ) In brachio mulieris observatus est Tumor lymphaticus enormis qui ducentas circiter libras ponderabat. *Ephemerid. German. ann. 1692. Dec. 3. observ. 2.*

4°. A parentibus in prolem transmittitur viru scrophulosum, quod uni familiæ semel affixum, obstinatè propagatur à generatione in generationem. Labes hæc infantibus communicata, citiùs ociùs per varia signa moribifica & per Tumores strumosos manifestatur. Si sit adhibenda fides observationibus ad me transmissis, sæpissimè Scrophulis infestatur proles illorum qui lue venereâ laborarunt etiàm si antè prolem genitam benè curati fuerint, aut tales apparuerint. Undè suspicandum an umquàm in statum perfectè sanum redintegretur lymphæ quæ viru venereo præsertim inveterato semel fuit inquinata.

5°. In Hispaniâ endemicè grassantur strumæ: an ob aëris, alimentorum, alteriusve causæ externæ & universalis impressiones morbificas? an ob lue veneream neglectam? ultima suspicio verosimilior est. Tirolenses incolæ endemiis strumis laborare dicuntur. Endemiæ quòque sunt strumæ in cer-

tis Galliæ Provinciis uti apud (a) Boïos. Vernacularum strumarum grassantium in diversis regionibus causas perquirant qui probè norunt harumce regionum constitutionem aëream, solem, vicissitudines tempestatum; atque incolarum vivendi normam, temperiem.

6°. Eædem semper non sunt acrimonia & viscositas lymphæ strumas efformantis. Mitior aliquandò hæc materia profundè non serpit, partes vix irritat: aliquandò malignior membranas, musculos, tendines, cartilagine exedit; sæpè acerrima ipsammet substantiam osseam corrodit; tunc verè canerosa. Variare quòque colorem & consistentiam materiei strumosæ evincit inf-

---

(a) An non satis verosimiliter incusari possunt numeræ aquarum vivarum Borboniarum scaturigines, à quibus testante indigenâ D. Goutaudier, Medicin. Doct. strumæ glandulæ thyroideæ potissimum proveniunt. Indolem schirrosam redolent ex strumæ & crassimè in suppuratum abeunt.

pectio. Albida, pallida, grisea, flavescens, subrubra observatur: gipseam mellitam, pultaceam, gelatinosam aqueam, saniosam, sevo similem indolem diversis in casibus obtinet: tantam duritiem habere visa est ut cultro firmissime adacto resisteret.

7°. Signis peculiaribus distinguuntur strumæ venereo morbo complicatæ a strumis simplicibus: suas & quodque notitas habet quælibet species strumarum complicatarum quibus & genus complicationis cognoscitur & ab aliis non complicatis Scrophulis secernitur.

In genere strumæ sunt Tumores maxime pertinaces & curatu difficillimi.

Semper timendum à præsentia viri scrophulosi in corpore. Si enim pedes figat in quopiam nobili viscere, aut generali productâ humorum depravatione febrem lentam excitet, mortem affert ut plurimum.

Pessimi sunt ominis malignæ strumæ terminatæ in ulcera cacoëthea aut cancrofa; in exostoses vel caries

in fistulas aut partium mollium mortificationem; in subdolam suppurationem, absquè symptomatum gravium apparatu, inferiora corrumpentem.

Benè ominandum à benignis Scrophulis mobilibus quæ ad felicem exitum tendere videntur nequè ulla molestia excitant symptomata.

Timete strumas quæ plurimùm multiplicantur; quæ nimiâ mole præditæ sunt; quæ viis aëreis sunt vicinæ; quæ articulationes, quibus insident, destruunt; quæ ab exterioribus ad interiora, factâ metastasi, repelluntur; quæ sunt hereditariæ.

Minus noxiæ sunt Srophulæ in juvenili quàm in provectiori ætate: in hâc frequentiores, in istâ rariores. Apud pueros quorum parentes scrophulosos fuisse noscitur, etiâmsi in tenerimâ ætate strumæ non appareant, suspicandus est illarum exortus versus septimum, octavum, aut nonum ætatis annum.

Curatæ strumæ, sæpè reviviscunt

nunc in eodem nunc in altero loco. Aliquando perniciofa fit harum curatio ob refluxum verfus interiora materiei ftrumofæ, quæ antea ad eos Tumores veluti ad emunctorium tendebat.

Strumæ vel funt incurabiles, vel curationem fufcipiunt.

1°. Si in curandis radicitus Tumoribus frophulofis Medicina chirurgiaque impotentes funt, ad palliativa confugiendum, ut mitigatio fymptomatum, & talis qualis vitæ prolongatio obtineantur. Quæ indicationes palliativæ adimplentur diluentibus, edulcorantibus, incralfantibus, lacticiniiis, narcoticis, & purgativis lenibus identidem repetitis. Horum remediorum efficaciam leniuntur & invifcantur acriores materiei frophulofæ particulæ, major quies ægro conciliatur, diesque illius diutiùs protrahuntur.

2°. In tractandis ftrumis curabilibus advertendum quænam funt ægrotantis ætas & temperies; quænam appareant figna morbifica; quibusnam in fedibus

hæreant strumæ ; nùm recentes nùm inveteratæ sint , nùm simplices nùm cum altero viru complicatæ.

*Primò.* Si cum viru venereo complacentur strumæ , statim methodicè tractanda lues venerea , postmodùm strumarum medela suscipitur. Si febris lenta , marasmus , hydrops aliique affectus scrophulas comitentur , præscripta remedia iis morbis debent accommodari.

*Secundò.* Simples strumas tractandi methodus eadem semper futura non est , sed varianda pro diversis circumstantiis.

In genere , remedia interna quæ summi sunt usûs ad immutandam sanguinis & lymphæ Scrophulosorum constitutionem versantur circà humectantia , diluentia , levia aperitiva , sudorifica non incendiiosa , solventia inter quæ dulces præparaciones mercûriales , lacticinia & præsertim lac asininum quod præstantissimum dùm febris lenta scrophulis adjuncta est. Designata re-

media alterantia præscribuntur sub formulis diversis uti jusculorum, apoze-  
matum, ptisanarum, decoctionum  
opiatarum, bolorum. Potiones cathar-  
ticæ & ab initio & in decursu morbi  
locum obtinent; non secus ac vena-  
sectiones casibus exigentibus celebra-  
dæ, & diæta exactissima.

Evenit aliquoties, præsertim in in-  
fantibus, per remedia exacerbari stru-  
mas: tunc quæcumque remedia rejici  
debent & expectandum à solâ diætâ  
conveniēti, cum ætatis & tempera-  
menti mutatione Scrophulas evanitu-  
ras. Dùm verò à remediis non ingra-  
vescit morbus, ea per plurium anno-  
rum seriem iteranda sunt: pertinax  
enim viru strumosum nonnisi successio-  
ne temporis & remediorum constanti  
actione destruitur.

Summa & quoquè attentio debetur  
usui remediorum externorum, quæ  
spectant ad res solventia cautè applican-  
da si Tumor resolubilis sit & nihil con-  
traindicet, ad suppurantia benè electa



dum per suppurationem terminandæ strumæ, ad deterfiva (a) pro ulcere efformato, ad caustica & ad ferrum pluribus in circumstantiis.

Cæterum in collo numerosiores & confertissimæ strumæ nèque aduri nèque ferro tolli debent; mors enim operationi brevi succederet. Parcendum etiàm strumis adhærentibus trunculo nerveo (b), vasi notabili, &c.... Attendendum ad exostoses & caries à strumofâ labe productas; ad sinus, fistulas, labra ulcerum callosa: iis aliis-

(a) Difficillimam esse ulcerum scrophulorum deterfionem cuilibet notum est; inter diversa mundificantia quæ pro iis ulceribus adhiberi possunt, nulla novi tam efficacia quàm pomata D. Goulard Experimentissimi Chirurghi Monspeliensis. Hoc remedio horrenda ulcera scrophulosa sive simplicia sive cum alio viru complicata feliciter deterfa fuisse, plures sunt testes oculares qui confirmant. Quibus in casibus & sub quâ formulâ iis pomatis utendum sit vide in Epistolâ D. Goulard ad D. de Lamartinière, Regis Chirurgum Primarium. Monspeli mens. Novemb.

1751.

(b) Fabric. Hidan. observ. 35. centur. 3.

que strumarum symptomatibus juxta  
artis regulas succurritur.

*De Cancris in genere.*

Tumor inter cæteros maximè atrox,  
græcè *Carcinoma*, latinè & gallicè  
*Cancer* nuncupatur. Signis insignitur di-  
versis pro vario Cancris stadio.

Nascentis & tenelli Carcinoma-  
tis non semper facilis est cognitio.  
Hæc eruitur ut plurimùm à prægres-  
so schirro imperfecto in quo sensus  
titillationis, pruritûs, puncturæ, &  
tandèm doloris perſentitur; quibus  
aliæ Cancris notæ succedunt. Schirrus,  
Carcinomatis germen, modò intrà pau-  
cum tempus cancroſam induit naturam;  
modò & sæpiſſimè schirroſus manet  
per plurium annorum ſeriem. Abſquè  
præexiſtentibus ſchirris enaſcuntur Can-  
crici à meris verrucis. Evenit etiàm ma-  
ſam fungoſam ſatis mollem nulloque

tacto schirrosam in Cancrum degenerare (a).

Cancer confirmatus sed adhucdum occultus, tactu durus percipitur, figurâ rotundus, superficie inæqualis, colore lividus aut subniger, calore deventi exardens, doloribus lancinantibus modò per intervalla recurrentibus modò fermè continuis stipatus, vasis sanguiferis tumentibus lividis aut atris circumdatus, prominente apice exulcerationis proximæ nuntio ditatus.

Cancer exulcerari incipiens *Dorsum*, est, excoriationem eamque spontaneam putrilaginosam patitur; stillat humor tenuis, acris; mox hiat ulcus foridum, horrendum visu, inæquale, cum obris fungosis, præduris, inverfis; sanies funditur copiosa, fulva, virens, atra, vomitabilis, tetrum & cadaverosum odorem spargens, vicinas partes & in

---

(a) Leg. Van-Svieten in aphorif. Boërhaav. n°.

latum & in profundum obstinatè eor-  
rodens, hæmorrhagias faciens; dolore  
in Cancro ulcerato exacerbantur, funt  
intolerabiles; alia demùm gravissimæ  
lethaliaque symptomata procreantur.

Plurimas certè mutationes patitur  
fluidum Carcinomatis materiem suppe-  
ditans ab eo instanti quo obstructio-  
nem lymphaticam posuit, usquequæ  
acquisiverit indolem acerrimam, om-  
nium remediorum virtutibus superio-  
rem, corpori mortiferam.

Quo pacto inspissata, concreta, iner-  
moles lymphatica commutetur in sa-  
niem corrosivam, perspicuè explanari  
maximè arduum, nè dicam impossibi-  
le. Quod huic disquisitioni lucerè  
videtur affundere, paucis accipite.

1°. Sivè ab schirro imperfecto, sivè  
à verrucâ, sivè à massâ fungosâ oriur-  
dum sit Carcinoma; lymphæ aut hu-  
mor ipsi analogus vasa schirri, verru-  
cæ, aut fungi obstruens peccat tan-  
tùm adauctis quantitate, spissitudine  
aut induratione; nullis vel levissimis  
acrimonia

acrimoniæ indicibus apparentibus.

2°. Ad circumferentiam schirri imperfecti partibus cooperientibus per dissectionem denudati qui in Cancrum commutari incipit, maculæ rubræ observantur ut plurimum; vel serum effusum extrâ vasa & schirri limbum irrorans. In primo casu verosimiliter inflammabantur vicinæ schirro partes; undè per ictus vasorum inflammatoriorum commovebatur futura Cancri materia: in altero casu aquearum partium vehiculo dissolvebatur; quod solemne est in schirris œdematosis in Cancrum abeuntibus.

3°. In Cancro quocumque occulto e corpore eradicato & oculis anatomicis subdito duplex distinguenda est pars. Prima quæ maximè mollis est, ad tactum diffuens, putrida, livida aut nigra, saniosa, materiei verè cancro-  
sæ fomes est & veluti receptaculum. Altera sanior aut minùs morbosa substantiam habet duriores; vasa & vesiculas quæ humorem lymphaticum ma-

ximè inspissatum & immeabilem coercent : nulla sanies in hâc secundâ Cancrici portione. Modò in medio Tumoris , modò versùs latera collocatur liquidi cancrofi receptaculum ; undè absquè dubio ad partes saniores seminum cancrosum propagatur lentius , celerius , pro virûs majori aut minori acrimoniâ. Receptaculum cancrosum aliquotiès cavitatem repræsented acriori humore plenam : sæpiùs autem solida destructa & permixta cum cancrofâ sanie hunc Cancrici fomitem constituunt. Talis certissimè dispositio est partium solidarum & fluidarum in omni Cancro occulto. Sanies hujusce Cancrici constanter inodora apparet ; sed igni exposita fêtidissimum spargit odorem.

4°. Saniei è cancris exulceratis effluentis indolem acerrimam & velut corrosivam demonstrat præsertim sævities illius humoris non molles tantùm partes obstinatè exedentis sed & ossa ipsamet. Quò impressionibus aëris exterioris ulcus cancrosum magis expe-

nitur eò fetidior magisque corrosiva evadit sanies.

Ex dictis patent gradariæ perversiones materiei cancrofæ : harum autem planè ignoratur physica ratio.

Non ex prædictis tantummodò Carcinomatum exulceratorum symptomaticis detegitur saniei cancrofæ essentia ; sed eam etiàm confirmant sequentia observata.

D. Ledran Chirurgus parisiensis aperiebat vesiculam in medio extirpati Cancri mammarii positam , ex apertura saliit humoris contenti portio supra Diffectoris vestimenta quorum color omninò fuit devoratus : idem humor consperfit faciem in quâ per plures horas dolores deurentes viguere (a). Linthea Cancro applicata à mordente sanie penitùs exesa (b) non secùs ac si aquâ orti tacta fuissent vidit D. Van-Swie-

---

(a) Ledran Traité des opérations , chap. du Cancer, pag. 378.

(b) Gerard Van-Svieten commentar. in aphorismis Boërhaav. n°. 499.

ten. Medico , qui uxorem Cancro exulcerato defunctam habuerat , fetidissimus cancriosus odor in naribus mansit quo tandem confectus obiit. Humorem è Cancro depromptum Chirurgus degustavit , sapor humoris acerrimi tam obstinatè linguæ inhæsit ut præ nauseâ invincibili in cachexiam tabidam inciderit Chirurgus ille & defunctus fuerit ( *a* ). Nicolaus Tulpius dum Medicinam faceret apud vetustam matronam quæ à longo tempore Cancrum mammaram ulceratum patientibus , vapore illius Carcinomatis in syncopen projectus fuit & palatum exulceratum habuit : ancilla quæ eadem ægrotanti inserviebat maligno vapore ita fuit inquinata ut ipsi in utraque mammâ & sub axillis sordida & cancriosa ulcera advenerint ( *b* ) : undè propriâ experienciâ suffultus Tulpius

---

( *a* ) Gualt. Harris-Anglus observ. de morb. gravior.

( *b* ) Ex observ. Nicol. Tulpii. Vide. *De la Médecine efficace* , tom. 4. pag. 38.



cancrofa ulcera contagiofa eſſe affirmabat.

Nulla eſt pars corporis tum interna tum externa ubi non enaſcantur Carcinomata ; nullibi verò frequentius quàm in locis glanduloſis. A Cancris exterioribus afficiuntur præſertim mammæ, labia, nares, oculi, aures, axillæ, inguina, uterus. Cancer faciei attingens labra, nares, oculos, mentum, dicitur *noli me tangere*: cave nè confundatur cum herpete exedente. Ulcus cancroſum ad inferiora & præſertim ad crura poſitum celerrimè carnes depaſcens, *Lupus* denominatur. In ipſâmet cerebri ſubſtantiâ, Cancris fuerunt obſervati (a). Mulieres frequentius quàm viri, ætas ſenilis sæpiùs quàm juvenilis Cancris infeſtantur.

Sedulò diſtinguenda ſunt varia Carcinomatum genera & ratione ſignorum morbificorum & ratione cauſæ produ-

---

(a) De Tumoribus cancroſis cerebri vide Ephemerid. German. Sepulchret. Bonet. &c....

centis & foventis. 1°. Fiunt Cancres *simplices* qui modò ab accidenti externo promanant uti à corporibus duris partes glandulosas fortiùs confricantibus, comprimentibus; ab intempestivè applicatis causticis, suppùratis, solventibus, emollientibus: modò à causis internis quibuscumque lympham spissam & acrem deponentibus intrà glandularum aut vasculorum secretiorum strictiores anfractus: modò deniquè à retentis materiis excretioni dicatis, à percussis herpetibus, à pravo victu spissiores & acres humores generante, à mœrore aliisque tristibus animi affectibus quorum tanta est aptitudo ad depravandam solidorum fluidorumque nostrorum œconomiam.

2°. Fiunt Cancres *complicati* qui nunc scrophulosi, nunc venerei, aliquandò cacochymici & cachectici dici merentur. Si absquè causâ externâ & evidenti Cancer adveniat homini cujus in familiâ viru scrophulosum hereditarium est, Cancrum strumosum dari certò pro-

nuntiamus: Carcinomata strumosa deuteropathica locum habent dùm sublati strumis prioribus verè cancrofi Tumores succedunt. Ulcuscula superficialia, parùm cava, callosa, contumacia, erodentia, frequenter repullulantia enascuntur in palato, faucibus, linguâ, gingivis, naribus, variis genitalium partibus in utroque sexu: hæc certò proclamantur venerea si aliundè dignoscatur existens morbus venereus; alia semper suspicanda si impurus aut lubricus concubitus præcesserit (a). Dùm generalis humorum & nominatim lymphæ massa spissa & acris existit, aut grumosa, aut exsiccata, aut partibus heterogeneis crassis & inspissantibus inquinata, frequenter fiunt glandulosæ obstructions quæ primò schirrosæ dein in cancrosas facile mutantur. Undè adeò familiaria Carcinomata apud ca-

---

(a) Astrucius de morbis venerèis, tom. 1. pag. 42. & 305.

cochymicos & cachecticos. 3°. Nunc cutem aut adipem occupant Cancri superficialii dicti ; nunc intrâ textum musculorum partiumque infimarum sepe liuntur profundiores. Aliquandò multiplicibus & longis radicibus implantantur & partibus adjacentibus firmiter adhærent Carcinomata : aliquandò ab omni nexu vicinorum libera existunt.

Annotandæ etiâ sunt Carcinomatum differentiæ. 1°. Ratione molis minima sunt quandòque ; talia in pudendis, naso, faucibusque nascuntur ulcuscula venerea. Cancer mammarum aliarumque partium modò in minus modò in majus volumen extenditur. Monstruosi observati sunt Cancri ut in quâdam ancillâ cujus in crure enatus est Cancer sexaginta libras ponderans (a) : diversa hæc Cancrorum

---

(a) Tulpii observ. de la Médecine efficace, tome 4. pag. 30.

moles semper est in ratione compositionis quantitatis fluidorum in Cancro aggestorum & extensionis solidorum fluida cancrofa continentium. 2°. Ratione numeri cum modò unicus, modò multiplex in corpore Cancer appareat. Carcinomata multiplicia vel per varias corporis partes solitariè disperguntur, vel ad eundem locum veluti confluentia sese invicem tangunt & aggeruntur.

Quid sperandum metuendumque sit de Cancris: quidque agendum in ipsorum therapeiâ, jam jam patebit dum de Cancro mammas obsidente.

### *De Cancro mammarum.*

Frequentiùs quàm cæteræ partes corporis Cancro infestantur mammæ mu-ebres (a). Remotè oritur ab obstruc-

---

(a) Observatis etiàm constat virorum mammis Cancros accidisse; sed hoc perrarum.

tione schirrosâ quæ fit tum in vasis lymphaticis mirum in modum supra pelliculas cellulares corporis adiposæ mammarum dispersis; tum in numerosissimis glandulis racemosis intra substantiam mammariam disseminatis; tum in ductibus lactiferis juxta se invicem positis, veluti coarcervatis, albidiorum mammæ portionem efficientibus, confluentibus ad commune quoddam receptaculum.

Huc reuocandæ generaliores schirrosarum obstructionum causæ: præsertim verò 1°. Stagnatio spontanea abundantioris spissiorisque materie adiposæ intra cavitates spongiosas mammariæ substantiæ; exindè enim non solum in induratum abire potest ipsamet adeps, sed ipsius auctâ mole certo certius lymphaticorum cava minuuntur, undè remora lymphæ aliæque conditiones schirris producendis necessariæ quæ observanda apud obesiores mulieres. 2°. Similis spontanea stasis lymphatici liquidi copiâ aut qualitate pec-

cantis in propriis vasis, & in corporibus glandulosis mammæ per quæ transmittitur. 3°. Spontanea remora lactis in ductibus galactophoris apud nutrices imprimis annotanda. 4°. Vitia priùs existentia in mammarum vasis, cellulis, glandulis, ductibus, vel debilioribus quàm ut contenta fluida propellant, vel strictioribus quàm ut liquores advenientes liberè transmittant. 5°. Labes ab accidenti externo inflicta solidæ mammarum substantiæ.

Si antecedentes schirri mammarum in Cancrum commutandi causas expendamus, has advertemus plerùmque consistere in suppressis menstruis aliisque evacuationibus consuetis; in continuo mœrore animique abjectione, quæ pathemata si quid possint in machinam humanam, maximè in muliebrem: antecedentium hujus morbi causarum numero adscribi quòque merentur corporis contudentis actio valida in mammas, earundem compressio ab indumentis strictè nimis thoracem amplexantibus.

Quicumque mammarum schirri in Cancros non degenerant. Si perfecti sint schirri nunquam suam mutabunt naturam, mole & pondere tantum molesti vicinis partibus & exinde aliquando ipsis perniciosi : schirros imperfectos per numerosissimorum annorum spatium in mammis latitasse absque ullo cancrose nature indicio testantur historiae medicæ.

Schirrosum germen Carcinomatis nascentis in mammâ nunc exterius est & attingit tenuem membranam communem cuti firmiter adhærentem; nunc profundius sepelitur supra crassam & robustam membranam interiorem musculo magno pectorali annexam; nunc medium tenet, in substantiâ mammariâ glanduloso-vesiculosâ latitans. Modò unicus, modò plures tactu in mammâ percipiuntur schirri. Ii difficilîus deteguntur si ad axillas accedentes sub crassis fasciculis fibrosis muscoli pectoralis delitefcant.

Schirri mammarii in Cancrum abire



incipientis, Cancris confirmati sed occulti, demùm exulcerati signa depromantur ex enarratis dùm de Cancris in genere. Falsâ judicatione meros mammarum schirros pro Carcinomatibus nẽ habeas; jàm jàm facta Carcinomata cum diversis Tumoribus nẽ confundas. Ab aliis exactè distinguatur Cancer mammarum venereus tam occultus quàm exulceratus.

Mammæ Cancrorum hic est habendus conceptus; hæc est illorum progressio.

Schirrus in substantiâ mammæ positus futuri Cancris est causa antecedens; superveniens quidpiam sive externum sive internum quod materiem schirrosam commoveat & exasperet pro causâ morbi determinante statui potest.

Itaque causa hæc commovens, quæcumque sit, in motum paulò citatiorem concitat crassum sanguinem in vasis sanguiferis quibusdam partis schirrososæ contentum; semi-inflamantur hæc vasa & quâlibet sui dyastole im-

petunt in substantiam schirrosam qua  
 ibi durissima ubi humores penitus sunt  
 concreti, ibi minus dura ubi datu  
 simplex lymphæ inspissatio: hinc præ  
 ternaturales succussiones fibrillarum  
 nervearum quæ ictibus vasorum semi  
 inflammatorum exponuntur, atquè sub  
 sequens in mammâ sensus aliquorum  
 quasi punctorum dolorificorum.

Successivè & tardissimè propagatu  
 sanguiferorum in parte schirrosâ inflam  
 matio; aliquantisper adaugetur lym  
 phæ maximè spissæ sed non adhuc con  
 cretæ motus in lymphaticis mamma  
 riis quæ mirum in modum cum sangui  
 feris inflammatis intertexuntur. Ni  
 miùm distenta rumpuntur quædam vas  
 tùm sanguinea tùm lymphatica; & in  
 eâ schirri determinatâ parte ubi è rup  
 tis vasis liquida extravasantur, dabi  
 tur fomes seu receptaculum primigeniæ  
 materiei cancrôsæ.

Nulla quidè ex tali partis statu  
 expectanda suppuratio sed vera putre  
 do quæ vasis viventibus nervisque in

egris interposita utrasque partes irritat, undè novus adveniens irritatis variis status inflammatorius; atquè excitati dolores acerbi Cancrum confirmatum individuè concomitantes.

Interim putrefacta materia, sensim & sine sensu, aliquandò etiàm celeriter depascitur partes circumpositas, vesiculas adiposas mammarias, vasa tùm sanguinea tùm lymphatica suprà membranas vesiculares repentia, glandulas intrà schirri substantiam interspersas, ductus lactiferos, uno verbo solida quæcumque putrilaginosæ novi Canceri materiei obvia: hinc destructio solidorum, fluidorum extravasationes, putredo adaucta.

Si minores sint acrimonia & causticitas hujus materiei cancrôsæ facilè per tempus longissimum tolerabitur occultus Cancer: & è contrà brevi in exulceratum abibit propter majorem acrimoniæ & causticitatis gradum. Dùm ad certam sævitiem pervenit Carcinoma, sæpè emittit undiquè radices qui-

bus firmiter implantatur diversis partibus: aliquandò nullæ radices emittuntur. Hinc distinctio Cancrorum in adhærentes & mobiles.

Porrò crescit moles mammæ Cancro occulto affectæ; vasa cutaneâ compriuntur, difficilior fit per venas sanguinis reditus, eæ tument, varicosæ apparent, nunc lividæ, nunc atræ pro diversâ alteratione contenti sanguinis.

Non rarò tunc temporis ichorosus humor per papillam aut ex areolâ transfudat (a) cujus transfudationis cessatio subsequens habet subitanea magnaque Cancri incrementa. Id non levi attentione dignum symptoma designat vel fomitem succi cancrofi esse in hâc mammæ massâ albidâ quæ concursu ductuum galactophororum efformatur; vel saltèm eos ductus non secùs ac glandulas sebaceas areolæ communicatio-

---

(a) Lédran. oper. chap. du Cancer pag. 385.

nem habere cum vasis lymphaticis mammae ichorem ex receptaculo cancroso haurientibus.

Non solum ad interiora sed etiam ad exteriora de die in diem proserpens seminum cancrosum ad cutem pervenit cujus excoriationem suscitatur unà cum stillatione ichoris tenuis & acris. Tandem veluti divulsa rumpuntur tegumenta Cancro superposita, tunc dehiscit ulcus horrendum cum signis alibi notatis.

Lipothymia, febris lentæ, marasmi & aliorum symptomatum quæ Cancrum inveteratum concomitantur, ratio petenda est ab admixtione materie cancrose cum massa sanguineâ.

Juxta diversas circumstantias variæ erunt Carcinomatum tum mammae tum alias quascumque partes obfidetium prognostica.

Cancer confirmatus positus in iis partibus quas ferrum excindens non potest aut non debet attingere, incurabilis est. Pessimum signum si plures si-

mùl Cancri in corpore appareant ; aut, si uno extirpato, alibi schirrus renascatur in Cancrum brevi mutandus. Maxime periculosum magna vasa Cancris esse vicina aut adhærentia ; tunc enim ferè semper contraindicatur operatio, etiàm si aliquoties à peritis Chirurgis feliciter instituta fuerit.

Mala est Cancrorum adhæsió partibus offeis, uti dùm Cancer mammaram adhæret costis & sterno. Quò plures & longiores emittit radices Carcinoma eò magis fixum & immobile apparet. Existialis Cancer mammaram qui comites habet schirros aut Cancros sub axillis positos, præsertim si Tumores illi subaxillares non vacillent ; periculosissima semper horumce Tumorum excisio. Sæpè complicatur uteri Carcinoma cum Cancro mammario : quod suspicandum à retentis menstruis aut à dolore ad uteri regionem : quod certissimum fit per effluxum saniei è vaginâ, dùm simul existit Cancer mammarius.

Carcinomata hereditaria nullâ arte

curari possunt ; non secùs ac Cancrì efformati in corporibus cacochymicis, cachecticis, strumofâ labe infectis. In genere infausta semper præfagi debent à Cancris vitio generali productis ; à nimis inveteratis ; à mole ingenti præditis. Cancer venereus frictiones mercuriales absolutâ necessitate expetit quibus aliquandò sanatur Cancer aut saltèm iis destructo viru venereo felicior est subsequentis operationis eventus.

Benè sperandum dùm præceps fertur auxilium Cancris incipientibus, ab accidenti externo ortis, nullum signum operationem contraindicans præ se ferentibus.

Complicatio œdematis cum Schirro Cancrum sæpè accersit molliori factâ schirrosâ materie. Schirrus phlegmonodæus si nequè in perfectum abeat, nec resolvatur, nec suppuret, cancrusus fit.

Emollientibus medicamentis Tumores cancrofi exacerbantur uti millenis observatis constat. Diffidendum etiàm ab applicatis resolventibus, repercutien-

tibus, acribus quibuscumque. *Quibus  
Cancris occulti nascuntur, non curari præ-  
stat: curati enim subito intereunt; non cu-  
rati diutiùs vivunt.* ( Hippocrat. aphor.  
38. lib. 6. )

Rarissimi sunt casus huic similes quem  
observavit D. Ledran. Vidit nempe  
magnum carcinoma mammarium quod  
gangrænâ supervenienti absquè arti-  
ope integrè eradicatum & à pectore  
separatum fuit ( *a* ).

Carcinoma quodcumque vel incurabile est, vel curabile, vel dubium in  
eventu.

1°. Cancer tum occultus tum exulceratus quem incurabilem novimus e  
præcognitis labe hereditariâ, vitio generalis humorum, Tumoris vetustate, n  
miâ mole hujus cum magnis vasis adhærentiâ, aliisque circumstantiis, operationem respuit utpotè curationi radicali insufficientem. Sola igitur tunc lo

---

( *a* ) Ledran, Traité des opérations, pag. 399.



cum habet palliatio.

Si incurabile Carcinoma occultum sit, neglectis remediis externis quibus Tumor exasperatur & ad ulcerationem adducitur, omnis cura palliativa versatur circà remedia interna. Hæc deducuntur ex lenientibus, diluentibus, levissimè aperitivis, lacticiniis præsertim quibus præstantiùs nihil ad edulcorandos humores eorumque acrimoniam obtundendam. Hic etiàm locum obtinent ea remedia quæ absorbente virtute sunt prædita. Opiata summi sunt usûs ad quietem ægro conciliandam doloresque compescendos. Mitia cathartica non negligantur, sed cautè & prudenter debent administrari.

Si exulceratum sit Carcinoma topicis utendum anodinis obstupefacientibus variâ sub formâ præscribendis. Plurima prædicantur hujusce modi topica inter quæ plerùmque cæteris præferri merentur præparaciones plumbi in epistolâ D. Goulard jàm citatâ descriptæ; putredinem arcentia conveniunt

ulceri cancroso quod sæpè sæpiùs de-  
tersivis anodinis mundandum est.

2°. Quoties Cancer recens erit, à  
causâ externâ productus in corpore benè  
constituto, absquè adhærentiâ notabi-  
li, & apto loco situs, sine morâ extir-  
pandus est nè propagato cancro sæ ma-  
teriei seminio morbus fiat incurabilis:  
in vanum remediorum tam interno-  
rum quàm externorum ope tentaretur  
Cancri confirmati curatio. Itaque de  
instituentâ extirpatione si quæstio sit,  
statim exacta habeatur præparationum  
ratio in venæ sectionibus, mitiori ca-  
thartico, medicamentis lenientibus ac  
sanguinem diluentibus; atquè si vires  
deficiant, restaurantibus: dein juxtâ  
optimas artis regulas excinditur Can-  
cer, attendendo nè quidpiam cancrosi  
in loco supersit; exindè enim brevi re-  
pullularet Tumor cancrosus malignior  
priori. Factâ extirpatione præscribatur  
diæta tenuis, nequè omittantur remedia  
quæ post graves operationes chirurgi-  
cas solent adhiberi.

Cæterùm extirpatio meliùs succedit in Cancro occulto quàm in exulcerato etiàm si iste præ se ferat conditiones instituendæ operationi requisitas.

3°. Sæpè de nascentium Cancrorum eventu ancipites artis magistri dubitant nùm extirpari debeat Tumor, nec-nè. Impossibile prorsùs est certas circà hoc in scriptis regulas tradere, cùm judicatio in hâc re pendeat à millenis circumstantiis solo clinico obviis & ab instanti ad instans mutabilibus.

Aliqui suffulti pluribus historiis medicis quibus constat absquè notabili malo Cancros in corpore diù hæsisse, operationem damnant.

Alii indiscriminatim, quoscumque Tumores cancosos extirpandos esse præcipiti judicio pronuntiant.

Vitandum extremum utrumque. 1°. Si senior sit ægrotans, debilioris temperamenti, & recidiva æquo jure timeatur, rejici debet operatio. 2°. Si Cancer sit in corpore juvenili benè valente, nequè timeatur morbi reditus

absquè ullâ remorâ ad extirpationem  
recurrendum nè qui priùs curabilis bre-  
vi incurabilis fiat morbus.

v. sup. la nature  
de l'air fixe.

### De Emphysemate.

Emphysema generali significatione  
sumptum audit tumefactionem à flati-  
bus in variâ corporis cavitate collectis  
si in cavo intestinali coacerventur  
Tympanitis ; si in scroto , Pneumatoce-  
le ; si in sacco herniali umbilici , Pneu-  
matomphalos nuncupatur ; & sic de  
variis partibus in quibus flatus colliguntur.

*Emphysema* verò propriè dictum , dicitur  
quo hîc , *Tumor flatulentus* , *apostema ventosum* , gallicè *Emphyseme* , est  
Tumor cuti concolor , valdè elasticus  
compressus nempè citò sese restituens  
dùm percutitur edens murmur quoddam.

Statuendæ quædam sunt in Emphysematibus differentiæ.

1°. Totius habitûs corporis intumescenti

nescentia à flatibus Emphysema *uni-*  
*versale* constituit. Insigne talis Em-  
 physematis exemplum Monspeli vidimus in Milite quem vino sepultum malevoli facto vulnere in inguine follibus inhumaniter insufflarunt, ità ut, miser ille à collo ad calces usquè Emphysematosus factus fuerit: post crudelem hanc operationem sibimet derelictus fuit, sensuumque adhuc compos præ suffocationis imminentis periculo ad partem anteriorem colli forcibus sectionem instituit; undè flatibus vias aëreas comprimantibus exitus liber. Ad nosocomium fuit delatus ubi per plures scarificationes & per remedia convenientia intrà quindecim circiter dies curatus est summâ omnium obstupescatione.

Emphysema *particulare* huic aut illi indiscriminatim corporis parti infidet, frequentius verò palpebris: & hanc speciem particularis Emphysematis præsertim respicit Tumor quem describimus.

<sup>1</sup> palpebrarum  
 2 umbilici  
 3 scroti et  
 4 articulorum  
 + pneumato  
 blepharon  
 2 pneumatophalon  
 3 pneumatocele

Hh

2°. *Indolens* existit ut plurimum Emphysema : interdum dolet acutissime (a); quo in casu minus facile cedit digito prementi.

3°. Modò & sæpiùs *fixa* sunt Emphysemata in locis ubi sedem posuere modò tamen à parte in partem *oberrant* redeuntia per periodos ; hæc ultima species *flatus furiosus* vel *ambulans* fuit nuncupata (b).

4°. Si absquè ullo præexistente morbo Emphysemata fiant in parte quam à flatibus ibi permanentibus *idiopathica* sunt : fiunt Emphysemata *sympathica* à morbo antecedente , præsertim à vulneribus thoracem penetrantibus , à costarum fracturis , &c....

Emphysema quodcumque sedem ha

(a) Legatur observatio Emphysematis quod ad acutos dolores excitabat, ut noctu diuque ægrota vexaretur incidens præ dolore in syncopen.... *De Médecine efficace*, tom. 4. pag. 173.

(b) Descriptio hujus Emphysematis periodici reperitur in prax. chirurg. special. Joannis Michaëlis.

pet in textu cellulari adiposo subcutaneo, hîc crassiori, ibi tenuiori, ubique fabricato cellulis membranaceis inter se communicantibus.

In iis cellulis dilatatis veluti in spongioso corpore aër Emphysema produciens includitur. Facile concipitur quomodo aër externus per vulneris aperturam in textum cellularem intromittatur: nullumque dubium est quin etiàm internus aër thoracicus trans pleuram diaceratam in textum cellularem sese inueniet, undè trans musculos intercostales ad superpositam adipem pervenit.

Major autem est difficultas in explicandâ collectione aëris in Emphysemate idiopathico. An per poros vasorum sanguiferorum exeunt partes aëris elementares in ipsomet sanguine contentæ, coadunantur in textu cellulari ubi propriâ vi elasticâ distendunt et in Tumorem attollunt solida continentia? An priùs in humoribus textus cellularis coercita elementa aërea

calore loci aliâvè causâ extrahuntur & acquirunt essentielles dotes aëri communis? Oriri hunc aërem, cum quibusdam Authoribus autumamus ex motu putrefactorio materiei oleosæ cellularum adiposarum. Quo motu extricatur aër elasticus qui à cellulâ in cellulam transcurrit, has dilatat & ampliores reddit, undè Emphysema.

Ergò quæcumque motum putrefactorium valent concitare in succo oleoso textûs cellularis subcutanei inter causas Emphysematis antecedentes recensenda. Evidentes quidem sunt eæ causæ putrefactoriæ in loco gangrænâ affecto cui phlyctænæ emphysematosæ succrescunt: minùs evidentes in aliis plerisque casibus.

Quò major est quantitas majorque expansio aëris collecti in datâ portione textûs cellularis eò major moles & tensio Emphysematis: & vice versâ. Hinc eruendæ diversitates Emphysematis mollioris aut magis renitentis; ma



gîs aut minùs elevati ; indolentis aut dolorifici. Difficiliùs explicatur Emphysema mutabile & oberrans à partibus in partes quas periodicè afficit. Istud observetur quoad Emphysemata extremitatibus corporis supervenientia, numquàm verè emphysematosas fieri plantas pedum manuumque palmas : nonnè ob rigiditatem nimiamque renitentiam membranularum tùm textûs cellularis aut adiposi tùm tegumentorum superpositorum quæ compressiones ferme continuas à corporibus duris patiuntur ?

Curandum Emphysema vel est particulare vel universale.

*Primò.* Solis remediis externis plerùmque curatur Emphysema particulare. Si fit symptoma vulneris cujusdam, sæpè sufficit vulnus dilatari ad hoc ut Tumor emphysematosus evanescat. Si Emphysema idiopathicum sit, applicanda sunt topica carminativa. Probè distinguatur an molles & relaxatæ, an ficcæ & tensæ sint fibræ in Em-

physemate : exindè enim variare debet topicorum electio. Dùm invitis topicis Tumor persistit obstinatè, is perforabitur veruculo triangulari cujus operi flatus exhibunt.

*Secundò.* Emphysema universale exigit tùm interna tùm externa remedia. Statim plures instituantur in variis partibus scarificationes ; dein carminativa & resolventia topica adhibeantur ; remedia interna præscribantur flatus discutientia , viscidosque attenuantia humores à quibus ut plurimum oriuntur flatulentia.

*Tertiò.* Insuper cùm calor sanguinis nimius concurrat persæpè ad producenda Emphysemata , ideò tùm ad Emphysema universale tùm ad particulare convenit venæ sectio plùs vel minùs repetita. Cave tamèn nè sanguinem mitti jubeas in casibus Emphysematum vel œdematosorum vel ad œdema vergentium ; & in aliis ubi directè contraindicatur venæ sectio. Liberaliter è contrà mittatur sanguis

Hum Emphysemati adjuncta est inflammatio.

### De Bronchocele.

*Bronchocele*, gallicè *Goiëtre* tot diversis nominibus apud Antiquos insignitur, ut magna exindè oriatur ipsorum in scriptis obscuritas. Definiendus est Tumor positus ad anteriora colli, magnâ ut plurimùm mole præditus, aliquandò mollis, sæpiùs durus.

Genuinam sedem habet Bronchocele in glandulâ thyroïdeâ ad anteriorem laryngis convexitatem positâ, duabus portionibus lateralibus oblongis æqualibus invicem unitis efformatâ, texturâ densâ donatâ. Sedet etiâ quandòque in glandulis vicinis.

Varias Bronchoceles species statui volunt pro diversitate materiei inclusæ. Illa aliquandò reperta fuit aquosa aut etiâ merè flatulenta (*Albucasis*); modò gelatinæ, melli, adipi, pulti similis est; modò humore purulento scatet Bronchoceles cavitas (*Boneti se-*

*pulchret.* ); grumi sanguinei aliquoties in eâ latitant (*Langius*); tandem in massam quamdam carnosam notabilem excrescens glandula thyroidea Bronchocelen etiâ facit. Ergò alia est Bronchocele quæ ad excrescentias alia quæ ad Tumores humorales attingit.

Eadem semper est Bronchocelon quarumcumque causa proxima, scilicet humorum congestorum in cavitatibus glandulæ thyroideæ aut glandularum vicinarum vis multò major quam est resistentia tum membrarum interna glandulæ cava efformantium, tum membranæ exterius involventis affectam glandulam. Quâ data causâ, ultra terminos naturalem multum progredietur hæc glandula laxa plurimumque extensibilia collata tegumenta exterius propellentur per adauctam tumefactæ glandulæ molem. Ex scriptis mihi communicatis constat Bronchocelen visam fuisse usque ad umbilicum propendere.

Causa

Causæ Bronchocele antecedentes & procatharticæ diversæ sunt prout varias producunt illius Tumoris species. *Consulantur quæ dicta sunt de obstructio- nibus glandulosis* ).

Sedem etiã ponit sed rariùs Bronchocele in glandulâ thymus dictâ cujus pars superior extrâ pectoris ca- vum extenditur. Inter varias hujusce Tumoris causas annumeretur congestio albæ & veluti lacteæ materie quàm in foetuum thymis detexit Morgagnius.

Cur endemia sit in subalpinis regio- nibus Bronchocele meritò deduci vide- tur ex aquâ frigidâ quam regionum illarum incolæ copiosè bibunt, gla- ciem aquæ immiscentes uti mos est in calidioribus regionibus. Nonnè ad Bronchocelen aliquandò referri pos- sunt frequentes tumefactiones glandulæ thyroïdæ apud Boïos quorum regio innumeras habet aquarum vivarum scaturigines? (*Vide caput de Scrophu- lis* ).

Nosco mulierem cui Bronchocele

supervenit ex nixibus quos parturiendo edidit. Perperam cum strumis glandularum colli anteriorum confunditur. Bronchocele: toto cœlo diversum est istud duplex Tumoris genus, etiã eandem partem teneat. Frequentiù mulieribus quàm viris Bronchocele evenire creditur.

Bronchocele incipiens aliquando curari potest bonâ victûs ratione medicamentis internis resolventibus topicisque discutientibus. Plerùmqu incurabilis est ille Tumor dùm a certam pervenit molem. Constante eadem permanet efformata Bronchocele carnosã quæ absquè ullo periculo toto vitæ decursu existit, pondere & mole tantùm molesta. Aquæ aut flatus in hoc Tumore contenti possunt extrahi per punctiõnem factam cum veruculo triangulãri. Bronchocele si tunicata sit, nempe inclusa proprii kyfisti, absolutè potest extrahi operatione; sed attendatur nè vas majus aut nervus implicentur.

*De Ecchymosi.*

Inter maculas potiùs quàm inter Tumores propriè dictos recenferi meretur *Ecchymosis* seù *Ecchymoma*, latinè *Sugillatio*, gallicè *Echimoſe*, *Meur-triffûre*.

Morbus ille atro-rubrum statim præ se fert colorem qui dilutior in dies evadit, prout sensim & sine sensu discutitur *Ecchymosis* materia. Effusio sanguinis in textu partium sub cute positarum est causa proxima & continens *Ecchymomatis*. Prædictæ effusioni ansam præbent externa accidentia ut 1°. Contudentis corporis actio quâ veluti per attritionem hùc & illùc rumpuntur vascula quædam sanguifera. 2°. Vulnus corpori obliquè inflictum, & non rarò operatio phlebotomiæ; dùm sanguis è plagâ profluens partim imbibitur à cellulis adiposis. Nisi multum impropiè *Ecchymomata* nuncupantur maculæ quædam in

morbis quibusdam tùm acutis tùm chronicis & frequentissimè in scorbuto apparentes ad corporis superficiem. Etiam si Ecchymosis morbus sit i se levis admodùm, cavendum tamenè gravis fiat tùm ob ipsius complicationem cum læsis partibus vicinis vasculosis, membranaceis, tendineis, ossibus; tùm ob magnam quantitatem sanguinis effusi discussioni inhabilis aut in textu partium putrescentis.

Abiquè remediorum apparatu curatur levis Ecchymosis: aqua frigida aqua Reginæ Hungariæ, aut Spiritu vini sæpe totum opus absolvunt. Graviorum & complicatorum Ecchymosum varia symptomata indicabunt diversam curandi methodum.

*Paucissima proferuntur circà theoriam quorundam Exanthematum aut Efflorescentiarum.*

Humores quicumque circulatorii



secretorii, excretorii, qui ad colatorium cutaneum appellunt diversorum exanthematum materiem suppeditant. Hæc materia, pro diversâ exanthematum indole, existit sanguinea, lymphatica, sudorifica, transpiratoria, sebacea, adiposa, aquea, flatuosa, ichorosa, saniosa, purulenta, & tandem ex pluribus composita.

Exanthematum alia sunt acuminata elatioraque; alia magis sunt depressa: alia distincta sunt & separata; alia confluunt & veluti aggeries efformant: alia rubra, alba, aut pellucida, sanguinis, lymphæ, feri aut puris colores præ se ferunt; alia diversis aliis coloribus insignita depravationem liquidi stagnantis designant: alia citò erumpunt; alia lentè prodeunt: alia corporibus de cætero sanis adveniunt; alia morbos magis minùsve graves comitantur, antecedunt, subsequuntur.

Exanthemata quorum causæ antecedentes & remotæ adedò diversæ sunt eandem constanter obtinent causam

proximam , actionem scilicèt fluidorum contentorum majorem quàm est renitentia solidorum continentium. Quæ causa locum obtinet & verè sufficiens est sivè in propriis vasis fluidum retineatur , sivè extrà ea fuerit effusum.

Quælibet exanthemata vel existunt per se primariò ; vel morbos priores sub titulo symptomatum comitantur vel etiàm morbis qui evanüere succedunt. De iis breviter agendum.

### *De Herpete.*

*Herpes*, gallicè *Dartre* est exanthema pallido-rubrum , parùm elevatum pustulosum , pruriginosum.

....*Species*....*Herpes simplicissimus*, asper, farinosus, sine papulis, rubri coloris variegati. *Herpes miliaris*, conflatus pustulis granis milii non majoribus. *Herpes ulceratus*, exedens, esthiomenos, multùm serpit & obstinatè. *Herpes occupans eam corporis regionem*

ad quam cingulum ponitur, ideòque cingulum vel zona dictus; hujus speciei Herpetis eruptionem antecedunt molestissimi dolores pruriginosi ad hypochondria, deìn assurgunt papulæ rubræ nunc corpus veluti cingentes, nunc ab umbilico ad genua usquè disseminatæ, brevi albescunt eæ papulæ quarum quælibet escharam habet, de lapsâ è papulis escharâ totidèm remanent ulcuscula (*Tulpii observ.*). Herpes infantibus puerisque familiaris spontè evanescit in adultâ ætate. Herpes venereus tum miliaris tum ulceratus, plerùmque callosus. Herpes virûs scorbutici soboles, pustulis rubris, lividis, aut flavis scatens. Herpes particularis tum idiopathicus tum sympathicus huic aut illi parti insidens. Herpes universalis omnem ferè occupat cutem, sæpissimè totâ epidermide successivè corpus desquamatur in hâc ultimâ Herpetis specie.

....*Sedes* Herpetum est in texturâ cutis, nominatim verò in ipsiûs glandulis.

.... *Materia* Herpetum consistit in viscidiusculis acribusque humoribus glandulas cutaneas obstruentibus. Stagnantes illi humores majorem acrimoniam & spissitudinem contrahunt; unde dolores maximè permolesti, vasculorum ruptiones & generatio puris usque ad partes carneas serpentis nominantur. A diversitate regionis quam occupat ille Tumor & à varietate symptomatum, diversæ eruntur Herpetum species.

Cavendum nè intropulsa Herpetum materia inflammationes internas viscerum gangrænam, aliaque morbifica symptomata accersat. Quod sæpè fieri millenis comprobatur observationibus medicis.

### *De Scabie.*

*Psora* Græcis, *Scabies* Latinis, gallicè *Gale*, morbus vulgatissimus cognoscitur eruptione pustularum valde prurientium, contagiosarum, hinc & inde

indè ad corporis superficiem, præsertim & ferè semper primariò inter digitos positarum.

...*Species*... Scabies sicca in quâ pustulæ exilissimæ sunt numerosissimæque, nihil aut parùm ichorosi liquidi fundentes. Scabies humida majoribus prædita pustulis è quibus pus saniesque fluunt. Scabies chronica quæ per plurimum annorum spatium continuò affligit. Scabies intermittens erratica qualis observatur in subjectis quibusdam evanescere per quoddam tempus, mox levi datâ causâ recurrere. Scabies intermittens periodica certis anni temporibus constanter revertens. Scabies convalescentium quæ post morbos quosdam diuturnos erumpit. Scabies puerulis familiaris quâ sæpè alii morbi prævertuntur, aut facti curantur (*Celsus*). Scabies critica quâ puellæ quædam laborant usquequò fluentibus menstruis ab eâ liberentur. Scabies demùm venerea.

Quæ diversæ species Scabiei, &

aliæ, si quæ sint, vel idiopathicæ sunt vel sympathicæ; nunc exurgunt à vitio constitutionis subjecti, nunc fiunt à lue è corpore scabioso ad corpus sanum transmissâ.

... *Materies* Scabiei efformatur verosimiliter liquidis grumosis simul & acribus colatorium cutaneum obstruentibus. Horum liquidorum quædam partes volatilissimæ è corpore scabioso exhalantes & corporis cujusdam sani superficiem attingentes subeunt poros epidermidis, miscentur cum humoribus vasorum absorbentium, hæc liquida labe scabiosâ contaminant: Undè transmissio contagiosa. Efformata in corpore, absquè ullâ communicatâ labe, Scabiei materia morbum hunc etiâmpone.

Ex cognitis Scabiei indole, causis, signis, progressibus, quid de morbo sperandum sit aut metuendum concluditur.

Sulphurea præstantissimi sunt usus in Scabie.

*De Impetigine.*

*Impetigo* in tres dividitur species quarum prima benigna est; altera gravior; tertia maligna admodum existit.

*Primò.* *Impetigo* benigna est affectus cutaneus ad scabiem siccam multum accedens; licet inter digitos primario non oriatur, ut in scabie solemne est. Benignæ *Impetiginis* præludia sunt sensus pruriginosus in cute; illius nativi coloris in rubrum hic & illic mutatio. Quibus prægressis apparet *Impetigo* quæ insignitur pustulis ficcis, confluentibus, acriter prurientibus, in squamas & furfures abeuntibus; nullum effundentibus humorem nec purulentum, nec saniosum, nec ichorosum.

Quandòque membra singularia infestat *Impetigo* salvo reliquo corporis habitu: plerumque per totam corporis superficiem dispergitur.

Si ad mitiorem indolem tendant

hujus Impetiginis tubercula, morbus tunc scabiei fit similior: si ad ferociorum naturam accedant, Lepra constituitur.

*Secundò.* Impetigo gravior seu *Lepra Græcorum* pustulas habet majores quam in scabie; numerosissimas in cruribus & brachiis & facie atque etiã ad alia cutis loca erumpentes; obscure rubentes mox lividas; squamulis donatas post desquamationem emittentes ichorem acerrimum & tenuem; tandèm rursùs exsiccatas crustisque duris sese cooperientes.

Non veluti pustulæ scabiei solitariæ suprà cutem disponuntur tubercula hæc leprosa, sed quasi conglobatim erumpunt & per aggeries.

*Tertiò.* Impetigo maligna, *Lepra Arabum* aut *Elephantiasis* ob numerosiorum symptomatum catervam difficilè definitur.

Hujus signa sunt epullulatio pustularum contagiosarum, confluentium squamosarum, durarum, indolentium.



rubro-lividarum, dùm exulcerantur faniem fetidam emittentium. Præter hæc tubercula, defœdatur cutis fissuris quibusdam, & maculis lividis quæ ad speciem *vitiliginis* spectant.

Porro cùm intacta non sint interiora organa in Elephantiasi, doloribus capitis quibus divexatur æger succedunt morosis & tristitia; urinæ turbidæ sunt quales Jumentorum; respiratio difficilis; pulsus parvus & inæqualis est; anhælatio fœtet. Hæc autem accidunt morbi initio, dùm scilicet cutis tantummodò aspera est, scabra, rugosa, livida.

Progrediente morbo horrenda visu ægrotantis est facies tùm à livido ipsius colore tùm à pustulis quibus deturpatur; labra tumida velutì propendent; pustulæ ulceraque narium cavitates opplent; vox rauca & clangosa est; defluunt capilli; os, palatum, fauces, radix linguæ tuberculis flavis aut sublividis obsidentur; pedes manusque multùm prætumidi sunt.

Tandem auctâ morbi sævitie, ulcera cacoëthea ulterius atque ulterius serpunt partes miserè depascentes fetidissimumque odorem spargentes.

Prædictæ Impetiginis species graduum tantummodò differunt. Gradus diversos determinat major aut minor materiei Impetiginis malignitas. Quis autem auit præcisè assignare morboscram & constitutionem humorum Lepras efformantium? Quid ad rem elucidandam adeò decantata apud Antiquos inordinata mixtio salium fixorum & volatilium cum impuris sulphuribus? Consequentias eliciendo a iis symptomatibus quæ in sensu incurrunt id tantum certò scitur lympham aliosque humores colatorium cutaneum obstruentes in Lepris peccari 1°. Spissitudine, undè obstructio. 2°. Acrimoniâ insigni huicque morbo propria quâ superficies corporis corroditur.

Senes vino liberaliùs indulgentes Elephantiasis quandòque invadit ( *Ett*

*aulerus* ). Nunc à parentibus transmit-  
itur leprosa lues ; nunc humorum de-  
ravatione spontaneâ generatur. Ca-  
endum nè Lepra Græcorum abeat in  
elephantiasim quæ certò lethalis.

Graphicam Elephantiasis descriptio-  
em lege apud Aretæum.

Præter assignatas Impetiginis spe-  
es annotanda venit Impetigo vene-  
ta ( *vide Astrucium* ). Imò & annume-  
ri debet Impetigo scorbutica cujus  
descriptionem reperies apud Auctores.  
Præterùm in diversis Impetiginis specie-  
bus judicationes methodusque curandi  
variuntur ex cognitâ indole materie  
orbificæ & ex symptomatibus.

### *De Pustulis.*

*Pustule* sunt parvuli Tumores ex ge-  
nere exanthematum ; diversi colores ;  
vel abeuntes in pus , saniem , icho-  
rem , in crustas & squamulas ; vel ex-  
siccati absquè crustarum & squamu-  
rum vestigiis.

1°. Pustulæ *venereæ*, plerùmque ficcæ, aliquandò purulentæ, oriuntur in capite, ad frontem, tempora, alia nafi, ponè aures, ad scrotum & alibi. Harum sedes sunt receptacula humoris unctuosi qui à viru venereo impiffatus hæret in sebaceis glandulis remorâ acrimoniam concipit, solidi continentia corrodit; plerùmque subsequenter crustis ficcis, rarò excitatâ suppuratione.

Advertant ii quibus tractandæ luveneræ frequenter cura committitur, num feliciùs non procedat actio mercurii in ægrotantibus qui tales in superficie corporis ferunt pustulas?

2°. Pustulæ *variolose inflammatorie* tertiâ quartâve morbi die erumpunt, septimâ aut octavâ in suppurationem abeunt, dein exsiccantur. Undè triplex diversus in iis pustulis distinguedus status inflammationis scilicèt, suppurationis & exsiccationis.

Pustularum materiam suppeditat virus variolosum cum humoribus permixtum

mixtum, ad cutem delatum ubi tum in vasculoso tum in glanduloso systemate inflammationes excitat, quibus opus suppuratorium succedit.

Inflammatæ pustulæ modò lentiùs modò promptiùs erumpunt: major aut minor excitatur in iis inflammationis gradus: confluentes sunt vel discretæ: majorem vel minorem molem acquirunt: tardiori, nimis præcipiti, vel eos inter medio passu procedunt: parùm aut valdè rubent, vel alio pravo colore inficiuntur ut fusco, nigro. Pustulæ purulentæ vel fundunt bonum pus, vel ichorem.

Quæ in variolosis pustulis factæ observationes & ad prognosim ferendam & ad curandi methodum dirigendam summè utiles.

3°. Pustulæ *morbillosæ* variolosis multò minores ætatem infantilem plerùmque aggrediuntur: pulicum morsibus haud absimiles sunt; suprà cutem parùm elevantur, erumpunt ferè semper primariò in facie undè ad inferiora se-

se diffundunt: nullum emittunt humorem sed exsiccantur ruptâque cuticulâ superficiem corporis conspergunt squamulis quæ deinceps decidunt.

4°. In febre miliari perspicuæ sunt ad collum, pectus, in digitorum interstitiis, & interdum in toto corpore pustulæ quædam à similitudine cum milii seminibus *miliares* dictæ. Plerumque pullulant xâ. aut xiâ. ab initio morbi die. Subalbidæ sunt. Nunc oriuntur solitariæ: nunc interspersas habent alias pustulas rubras: undè divisio febris miliaris in simplicem & compositam (*David Hamilton de febre miliari*). Sæpè pruriunt pustulæ miliares, præsertim dum rubræ ipsis permiscentur circa xviii<sup>am</sup>. vel xxi<sup>am</sup>. morbi diem exsiccantur & epidermidem cor rugatam relinquunt. Quoties pustulæ miliares lenis & perennis transpirationis auxilio sese ostendunt, aliaque febris symptomata mitescunt, res bene se habent: è contrâ si à frigore suscepto aut ab aliâ causâ pustulæ delites-

cant, timenda materiei metastasis ad cerebrum, morsque brevi subsequens.

5°. Infantum in capite & facie frequenter enascuntur pustulæ albicantes quæ deinceps luteæ evadunt, & in crustas abeunt ichorem fundentes magno cum pruritu. Morbus hic nomen habet *Crustæ lacteæ*, *Achorum*, *Ignis vocatici*, *Tinea*.

6°. In partibus diversis oris interni generantur ulcuscula seù pustulæ quæ *Aphthæ* nuncupantur. Eæ pustulæ modò albicantes sunt & tunc meliores; modò fuscæ, flavæ, lividæ, nigræ & tunc pejores. Majori aut minori numero epullulant. Infantibus, senibusque frequentiores sunt. Absquè ullo rægresso aut concomitante morbo oriuntur ob humorum & nominatim succi salivalis acrimoniam: in pluribus morbis perspicuæ fiunt pustulæ aphthæ sympathicæ.

Sedem habent tùm in minoribus salivalibus glandulis labialibus, buccalibus, lingualibus, palatinis, aliisque in

ore interno positis: tùm in excretoriis ductibus illarum glandularum.

7°. Pustulæ *miscellaneæ* quæ in febribus diversis nonnunquàm ad superficiem corporis enascuntur. Pustulæ illæ aliquandò criticæ, aliquandò symptomaticæ sunt.

8°. Pustulæ *essera* dictæ sunt eruptiones cutaneæ per totum corpus dispersæ, quasi ab apicibus vel culicibus ubique demorsus fuisset æger. Alternatim pruriens & pungens dolor excitatur in iis pustulis. Intrà breve tempus spontè evanescunt essera sine ullo effuso humore. Interdùm morbos febriles antecedunt.

9°. Pustulæ *scabiei* (vide caput de scabie). Pustulæ *leprosa* (vide caput de impetigine). Pustulæ *herpetica* (vide caput de herpete). Pustulæ *epinyctideæ* (vide caput de epinyctidibus, &c)

### De Papulis.

Papulæ, gallicè *Boutons*, quæ apud omnes ferè Pathologos cum pustulis



lis confunduntur, ab iis tamen debent distingui in quantum ferè semper resolutione dissipantur Papulæ, quod non evenit pustulis quæ rarò resolvuntur, sed ferè constanter suppuratione terminantur, vel in crustas abeunt aut squamulas.

1°. Papulæ majores sunt parvuli Tumores rubicundi, in facie præsertim enascentes, juvenibus calidoque temperamento præditis familiares, rarissimè suppurantes, sed ferè semper resolutione terminati. Sæpè adveniunt iis quibus suppressa est quædam evacuatio solita, uti hemorrhagia narium quâ non infrequenter laborant juvenes. Perniciosa est quibusdam intro-pulsio materiei Papularum illarum ope repercussivorum.

Aliquotiès eædem Papulæ alicui parti semèl affixæ, ibi diutissimè remorantur ut iis accidit qui per totum vitæ decursum Papulas rubras gerunt suprâ nasum.

2°. Ad Papulas minores pertinent primò sudamina apud nostrates *Cam-*

*broul* Papulæ scilicèt grani milii circiter magnitudinem habentes, rubræ in ambitu, lymphidæ in apice, sensum pruriginis in cute excitantes, pueris & juvenibus familiares, æstate præsertim observabiles, & apud eos quibus facilis est diaphoresis. Majori quantitate coacervantur ad humeros, brachia, femora, & ad genitalium vicinia. *Secundò* Papulæ roseæ, veluti vesiculares, calentes, prurientes, subitò accidentes, citò decedentes ut facillimè redeant, dicuntur gallicè *Porcelaine*.

*De Phlyctænis, Bullis & Ampullis.*

Ejusem definitionis terminis comprehendendi debent *Ampullæ*, *Bullæ* & *Phlyctænæ*, quæ nihil aliud sunt quàm epidermidis suprà cutis superficiem parvæ elevationes, pellucidæ ab humore aqueo, ichoroso, flatuloso productæ.

1°. Æstivo tempore sæpè per totum corporis habitum subitò enascuntur Bullulæ pellucidæ granis milii non majores, quæ brevi post ortum evanes-

cunt. Ebullitio sanguinis aut motus ejus intestinus adauctus hæc producit exanthemata.

2°. Bullæ pellucidæ febriles à quibusdam variolosæ lymphaticæ dictæ, sunt species Bullarum in quâdam febre auctâ productarum. Eæ Bullæ inflammatis variolosis pustulis majores sunt; intrâ brevissimum tempus efformantur, & paulò post evanescent.

3°. In erysipelate ampullæ sæpè excitantur continentes serum acre effusum sub epidermide. Aliquandò cutis supposita ab illo sero corroditur undè gangrænæ periculum.

4°. Phlyctænæ nunc ab externâ nunc ab internâ causâ producuntur. Externarum Phlyctænarum exemplar suppeditant Bullulæ in parte ambustâ excitatæ: internarum verò numero adscribuntur Phlyctænæ ad ambitum aut suprâ diversos Tumores calidos positæ: non secùs ac Phlyctænæ ichorosæ, saniosæ, emphysematosæ quæ partibus gangrænâ affectis superveniunt.



## SECTIO QUARTA.

### *De Tumoribus Cysticis.*

**T**UMORES *cystici, tunicati, folliculosi* unum & idem sonant. Distinguntur membranis efformantibus. Cystides seu folliculos fluidum quoddam includentes. Actio quâ congeruntur fluida intrâ Cystidum folliculorumvè cava, nuncupatur obstructio cystica. De illâ nunc paucis.

---

### CAPUT PRIMUM.

#### *De Obstructione Cysticâ.*

**D**UPLEX distinguenda venit Obstructionis cysticæ species.

*Prima* fit à collecto cruore intrâ  
distensa

distensas arteriarum venarumque tunicas, ut in *aneurysmate vero & varice*: à congestâ lymphâ in vesiculis dilatatorum vasorum Bartholinianorum, ut in *hydatidibus*: à cumulatō numore aqueo intrâ expansas membranas investientes medullam spinalem, ut in *Spinâ Bifidâ*. Huc etiã bullæ, ampullæ, & phlyctænæ de quibus in Sectione tertiâ.

Hæcce primaria species Obstructionum cysticarum oritur aut à debilitatiōe textu membranarum ab humoribus sanguineis, lymphaticis, aqueis multum distensarum; aut à violentâ actione prædictorum humorum in membranas non satis renitentes ut ut naturali tono præditas; aut à concursu ductarum virium fluidi in imminutas solidi resistentias.

Differt hæc Obstructio ab aliis quibuscumque Obstructionibus non cysticis, quòd istæ consistant in infarctu plurium vasculorum alicujus partis, illa verò fiat ex congestione humoris

in uno majori eodemque cavo membranoso in formam Cystidis expanso

*Secunda* Obstructionis cysticæ species inter eas omnes Obstructiones quæ fiunt in humano corpore maximè tardigrada existit. Debetur congestionentissimæ fluidorum oleosorum, sebaceorum, aliorumvè intrà loculos quosdam membranosos.

Ii loculi sunt vel cryptæ & lacunæ subcutanæ, vel glandulæ sebaceæ, vel & imprimis cellulæ adiposæ.

Ab Obstructionibus illorum loculorum exurgere *Atheromata*, *Melicerides*, & *Steatomata* non tantùm firmissimæ rationum momentis evincitur sed & observatis demonstratur. (a)

In punctulis incipiunt eæ obstructiones; sensim & sine sensu crescunt tandemque in molem majorem, mi-

(a) Millies evolvantur quæ in sententiæ Malpighianæ gratiam effatus est Boërhaavius in epistola anatomicâ ad Ruyschium.

Consulatur & quòque Morgagnius pluribus in locis

norem, aliquoties ingentem attolluntur folliculi obstructum fluidum coercentes.

Obstructionum cysticarum quarumcumque causæ, phænomena, diversitates, eventus, ex unoquoque Tumore cystico speciatim considerato patebunt.

## CAPUT SECUNDUM.

### *De Spinâ Bifidâ.*

**P**ERTRACTANDUS jam venit Tumor recens natis adeò perniciosus, *Spina Bifida* nuncupatus. Quo fato tum apud veteres omninò prætermissa fuerit Spinæ Bifidæ historia; tum apud quosdam recentiores breviter adeò & negligenter tradita, planè ignoramus.

Ut ea quæ ad Spinam Bifidam spectant methodicè pertractentur, statim

indicabimus aliquas observationes factas in infantibus Spinâ Bifidâ laborantibus: deïn ratiocinia ab experimentis elicientes hujus Tumoris theoriam trademus.

*Observationes diversæ circâ Tumorem qui dicitur Spina Bifida.*

*De Spinâ Bifidâ qua statim à nativitate mortem accersit.*

OBSERVATIO PRIMA. Mulier gravida cecidit supina in lumbos, sed sine ullâ subsequente cutis contusione. Infans in lucem editus habuit in lumbis insignem Tumorem, quo aperto effluxit humor aqueus & infans mortuus est.... Inspectio Tumoris in cadavere docuit spinæ vertebrae ut lacerae sic à se invicem disparatas esse, nec non propagines nerveas per Tumorem dispersas ( *Tulpius* ). Alia exempla Tumoris lumbaris vide apud *Tulpium*.



*De Spinâ Bifidâ quartâ nativitatîs die  
per mortem terminatâ.*

OBSERVATIO SECUNDA. Matrôna quædam gravida alimentum quodpiam avidissimè appetebat, quod concessum parùm tamen palato arrisit: undè mœrore tædioque correpta fuit. Tandem peperit puellam extenuatam cujus in regione ossis sacri aderat tuberculum ad ovi anserini magnitudinem elevatum, inæquale, aquâ & flatibus repletum. Humor aqueus per tenuem illius tuberculi membranam copiosè exsudabat; hinc absoluta virium immunitio & mors infantis quartâ die adveniens.... Dissectione apparuit inter quartam & ultimam lumborum vertebram cavitas rotunda, aliquo modo ad latus dextrum vergens, hujus magnitudinis ut minimum digitum facilè exciperet, &c.... (*Fabric. Hildanus*).

*De Spinâ Bifidâ quam mors subsequuta  
est tertio atatis mense.*

OBSERVATIO TERTIA. Puella in lucem fuit edita cum Tumore in lumbis

posito. Pugni magnitudinem æquabat Tumor ille, in medio veluti carneus, & de cætero pellucens adinstar vesicæ aquâ lymphidâ repletæ. De die in diem crescebat magisque fiebat carnosus. Mense tertio ægra periit motibus convulsivis correpta.... Examini anatomico subditus Tumor totus carneus demonstrabatur, nè guttula remanente aquosi humoris qui forsàn eruperat in cavum abdominis quod multùm erat tumefactum. Sub Tumore præternaturaliter hiabat columna vertebralis foramine ovum columbinum admissuro (*Muyfens*).

*De Spinâ Bifidâ quarto circiter ætatis mense lethali.*

OBSERVATIO QUARTA. Mater utero gerens de scalis delapsa est suprà dorsum, absquè tamen subsequente abortu: convenienti tempore peperit puellam quæ suprà vertebrae lumborum Tumorem habebat magnitudine ovi, mollem, diversicolorém, tactu cedentem veluti vesica humore reple-

ta. Tandem topicorum applicatione ruptus fuit Tumor qui materiam serofam, purulentam, fetidam emisit. Tertiâ die convulsivis motibus agitata puella mortua est. .. Perscrutatâ Tumoris sede, nullus hiatus repertus est quo ad abdomen penetraretur. Duæ vertebræ lumbares desiderabantur, & in eo substantiæ ossæ defectu denudata erat spinalis medulla (*Gaspar. Bauhinus*).

*De Spinâ Bifidâ annum attingente.*

OBSERVATIO QUINTA. Ad infimam ossis sacri partem in infante Tumor erat Spinæ Bifidæ similis, qui partim pellucidus, partim opacus, & admodum mollis existebat. Inter omnes Spinâ Bifidâ correptos nullum se vidisse asserit *Ruyschius* tamdiu superstitem quam hunc. *Vivit enim*, addit Anatomicorum Princeps, *in hunc usquè diem, annum jam ferè agens; forsàn ob affectus decliviorum situm* (*Ruysch. observat. anatom. 35.*) Legatur & etiàm observatio trigesima quarta de Tumore lumbari in fœtu cum Spinâ Bifidâ.

*De Spinâ Bifidâ ad mensem decimum  
quintum protractâ.*

OBSERVATIO SEXTA. Anno 1684, Ruyschius vidit in filiolâ cujusdam Procuratoris Amstelodamensis Tumorem lombarem minoris pugni magnitudini æquiparem, rugis refertum, cui accessit gangræna. Decimo quinto post natiuitatem mense (raro autem tamdiù vivunt, inquit Ruyschius) humor contentus erupit & puella vitam finivit... Perscrutato malo se se obtulit in unicâ vertebrâ apertura tam exigua ut vix ciceris granum admitteret. Adactò stilo evidentissimè demonstratum est Tumorem hunc nihil aliud esse præter expansionem membranarum spinalem medullam investientium, ab humoris repletis copiâ (*Ruyschius observat. anat. 36.*)

*De Spinâ Bifidâ due observationes Societati Regiæ Scientiarum Monspeliensi communicatæ anno 1750 à D. Farjona Doctore Medico Monspessulano.*

OBSERVATIO SEPTIMA. Mense Januario

nuario anni 1748, uxor Agricolaë cujusdam Monspeliaci peperit infantem qui ab utero gestabat Tumorem situm inter ultimam vertebra[m] dorsalem & primam lumbarem. Ad circumferentiam cæruleus, in centro subruber erat ille Tumor: nucem mole æquabat: sub Tumore defectus ossæ substantiæ percipiebatur. Levi concussione fluctuationem quamdam advertere licebat. Quod autem sedulò pensitandum, si comprimeretur fortiter Tumor ad partem superiorem, puer sopiebatur, & partes inferiores motum amittebant. De die in diem incrementa sumebat Tumor; die undecimâ spontè in soporem incidit ægrotans, duodecimâ verò ruptus est Tumor & intrâ semihoræ spatium puer obiit.... Denegata fuit libertas examinandi Tumoris in cadavere.

OBSERVATIO OCTAVA. Mense Septembri anni 1749, natus est Monspe-  
lii infans qui in utero contraxerat Tu-  
morem inter ultimam lumborum ver-  
tebram & basim ossis sacri. Parvâ

nuce non major erat Tumor, superficie corrugatus, vini feculenta colore æmulans, epidermide spoliatus, liquorem sensibilibiter fluctuantem includens, sub se apparens habere defectum ossæ substantiæ.

Ab iis initiis compressus Tumor non post se trahebat ægri soporem & extremitatum inferiorum paralytim, ut in antecedenti observatione.

Interim quâ proportione crescebat Tumoris moles, delebantur rugæ illius superficiariæ, sed color primarius idem persistebat.

A Medico certò lethalis judicatus infantuli status, inexpertis ferè sanus videbatur usquè ad sextam à natiuitate diem quâ spontaneus sopor invasit, & lactationi repugnavit æger: tunc magna fuerunt Tumoris incrementa: ob compressionem ad superiora Tumoris motus inferiorum deperdebatur, summusque sopor superveniebat, stimulo corporisque agitatione indigens ut discuteretur.

Die septimâ Tumor incipit ad exteriora madefieri.

Die octavâ stillavit paulatim liquor serosus, sufflavus, tingens lintea.

Die nonâ ad majorem molem pervenit Tumor, magis distracta cutis disrupta fuit & ex dehiscente Tumore effluxit magna feri subflavi quantitas. Intrâ semihoram circiter puer mortuus est.

Tâm sedulò examinata morbi progressio, ulteriorem expetebat in cadavere faciendam indaginem: hæc reipsâ locum habuit.

Itaque dissectis tegumentis & carnibus Tumorem circumambientibus, os sacrum ab ossibus iliis sejunctum est, & suprâ lumbarem regionem, ferræ beneficio, divisa fuit columna vertebralis. Quâ factâ separatione, liquor subflavus & viscidiusculus visus est effluere ex utrâque parte canalispinalis. Similis liquor priùs ex Tumore, incautè inter disseccandum aperto effluxerat. Flaccidior apparuit quàm in

statu naturali dura mater medullam spinalem ambiens.

Verùm ut dilucidius morbi fomes introspiceretur, carnibus omninò spoliata fuit pars vertebralis columnæ è corpore jàm separata: mox resectis & ablatiis vertebrarum epiphisibus spinalibus quarum ea quæ Tumori respondebat merè cartilaginosa erat, nudis oculis advertere licuit, quantum concurrerent membranæ medullam investientes, ad efformationem Spinæ Bifidæ. Ideò stilo sursùm adacto tum inter duram & piam matrem, tum inter piam matrem & medullam, sensim & sine sensu perventum est ad cavitatem Tumoris.

Hujusce cavitatis facies interior lævis erat, innumeris irrorata vasis sanguiferis, & nervosis ramificationibus productis à notabili nervoso fasciculo quem ad Tumorem distinctè emittebat medulla spinalis.

Tandem dissectis membranis constituentibus Tumorem, luce clarius de-



monstratum est ex piâ durâque meningibus extrâ canalem spinalem multùm expansis & cum cute superpositâ unitis efformatam fuisse Spinam Bifidam.

Cæterùm cerebri cerebellique substantia naturali mollior erat, atquè hîc magis illîc minùs imbibita eodem humore qui ex canali spinali effluebat, dùm ferrâ divisa fuit columna vertebralis. Ventriculi cerebri hunc humorem abundanter continebant.

*Spinæ Bifidæ descriptio.*

Spina Bifida est Tumor cysticus inter morbos congenitos recensendus utpotè adveniêns foëtubus adhuc hospitantibus in utero.

Oritur ut plurimùm in lumbis, sæpè etiàm in dorso, rarissimè ad nucham & ad partem inferiorem exteriorem ossis sacri (a).

---

(a) Ruyfch. observ. 34. & 35.

Eadem semper non est Spinarum Bifidarum moles tùm in ipsarum principio tùm in progressibus. Statim ab infantis nativitate modò ovi anserinæ magnitudinem æquat Tumor ille, sæpè nucis, rarò pugni: crescit deindè plùs vel minùs pro copiâ & viribus fluidi contenti, renitentiâ & extensione solidi continentis.

Nunc fuscus, sæpiùs limpidus existit Tumor: nunc partim opacus & partim limpidus: nunc subruber in centro, & ad circuitum alterius coloris: aliquandò velutì carneus in aliquâ sui portione apparet.

Constanter major est in centro Tumoris mollities; ità ut ibi digito premente defectus ossæ substantiæ subtùs percipi videatur, nec non quædam fluctuatio.

Quandòque suâ epidermide spoliatur Spina Bifida, aliquandò non: plerùmque initio rugas habet quæ crescente Tumore & extensâ cute delentur Spinæ Bifidæ signum characteristi-

cum est Tumor mollis in lumbis recens natorum sese offerens, qui aut spontè ruptus aut arte apertus citam mortem post se trahit.

Non idem est vitæ terminus apud omnes infantes Spinâ Bifidâ laborantes, quia eodem semper passu non progreditur natura morbosa in efformando illo Tumore, ejusque percurrendis temporibus. Frequentissimè paucis post nativitatem diebus rumpitur Tumor, liquor effluit simùl cum vitâ. Hæc rarò ad menses, rariùs ad annum & ultrà protenditur. Tumoris ruptio vitæque finis sunt duo accidentia inseparabilia.

Jàm verò, quænam solidæ fluidæque partes in Spinâ Bifidâ vitientur exponendum breviter, facem præferentibus observatis.

*Primò.* Falsum est vertebrarum epiphyses spinales ità esse in hoc affectu bifurcatas, ut vulgò putarunt. Ut ponatur, sufficit si, vi quâpiam extropulsis illis epiphysibus quæ in foetu & in recens nato

vel merè cartilaginosa sunt, vel ossifieri incipientes laxè uniuntur teneris ossiculis corpus vertebrale constituentibus, si inquam, dehiscant vertebræ à parte posterioricâ: eò majori facilitate talis fit hiatus quòd debilissima sint & multùm extensibilia ligamentula cruciata foëtûs vertebrae unientia. Rarissimè sub isto Tumore desideratur una aut altera vertebra (a)

Trans aperturam à dehiscentibus posterioricè vertebris factam extuberant expansæ membranæ medullam spinalem investientes & ratione ipsarum expansionis ad exteriora prominet Tumor quem describimus. Dissectio Spinæ Bifidæ docuit (b) plures ad eam efformandam concurrere cavitates concentricas quarum hic est ordo. Sub expansis tegumentis communibus reperitur expansio ductûs ligamentosi investien-

---

(a) Vide prius citatam observationem Gaspari Bauhini. Observatio quarta.

(b) Consulantur observatio sexta & ultima.

tis omnem faciem internam canalis spinalis : subjacent expansæ binæ laminæ duræ matris : fundum Tumoris efformat dilatata arachnoïdea. Exindè facile concipitur 1°. Eò ampliores futuras esse eas cavitates concentricas quò magis sunt externæ. 2°. Priùs esse expandi arachnoïdeam, deïn aliarum partium superpositarum dilatationem subsequi.

Portiuncula spinalis medullæ quæ Tumori correspondet, modò intacta apparet, modò flaccidissima diffluit, modò deficit omninò : sæpè demonstrati fuêre fasciculi nervei à medullâ in substantiam Tumoris emissi (a).

Secundò. Nullâ conjecturâ opus est ut dignoscatur fluidum quo membranæ medullam ambientes distenduntur in Spinâ Bifidâ. Etenim ex rupto aut aperto illo Tumore magna exire advertitur feri copia : imò etiàm similis liquor

---

(a) Vide observationes primam & ultimam.

per resectum canalem spinalem in ægris Spinâ Bifidâ demortuis affatim effluit à superioribus ad inferiora descendendo.

Rectè igitur à Ruyschio prolatum fuit hunc Tumorem *hydropem esse particula spinalis medulla, eundemque esse affectum qui in capite fœtus hydrocephalus audit*: effatum Ruyschianum confirmant plura observata (a) quibus certum fit sæpè advenire Spinam Bifidam infantibus hydrocephalicis.

Itaque si in fœtu aquosus ille latex quo, in hydrocephalo interno obruuntur cerebri substantia, ventriculi, membranæ ipsius, inflectat cursum ad magnum foramen occipitis, facilis erit descensu via per patentem ductum spinalem sensim & sine sensu coacervabitur liquor & tandèm copioso proventu distendet modò hîc modò illîc membra-

---

(a) Legantur ephemerid. natur. curios. & observatio ultima à nobis suprâ relata quâ constat cerebrum ejusque ventriculos sero superabundanti irrorari, &c

nas involventes quæ suâ vice erumpent in cartilagineas, flexibiles, facileque dehiscentes vertebrarum spinales epiphises : hinc excitatus Tumor qui nihil aliud est quàm Spina Bifida.

Ex omnibus suprâ dictis & ex æquo ratiocinio iis suffulto patet cùm fœtus peculiaris sit Spina Bifida ? cùm sæpiùs excitetur in lumbis quàm in aliâ columnæ vertebralis sede ? cùm modò majorem modò minorem habeat magnitudinem ? cùm ad certum incrementum pervento Tumore in soporem incidat ægrotans ? cùm certa & indubia ad mortem prognosis ?

Spinæ Bifidæ causæ antecedentes eadem prorsus sunt ac hydrocephali interni : imò , strictè loquendo , Tumor ille est merum symptoma hydrocephali sed gravissimum & semper lethale. Nequè hîc moramur objectiones deductas ex observatis mulieribus quæ post lapsus ( *a* ) aut post diversas phan-

---

( *a* ) Legantur observationes prima & quarta.

tasias ( *a* ) peperêre infantes cum Spinâ Bifidâ , cùm nihil obstet quominus gravidæ ceciderint aut picâ malaciâ vè laborarint , dùm gerebant fœtum hydrocephalicum.

Semèl admissò liquore hydrocephali à cavitate Tumoris ad cerebrum continuitate columnarum aquearum protenso , in promptu explicabuntur ægrotantium sopores , stupores , artuum inferiorum paralyfes , mortis acceleratio aperto Tumore.

Spinæ Bifidæ curatio palliativa ( alia enim non datur ) consistit in eo quòd nunquàm aperiatur Tumor , nihilque applicetur quod promptiorem rptionem suscitet : exindè enim certa & prompta mors.

Caveant gravidæ mulieres nè commissis erroribus in victu fœtum in utero hospitantem labe hydrocephali & Spinæ Bifidæ contaminent.

---

( *b* ) Observat. secunda.



## CAPUT TERTIUM.

*De Meliceride , Atheromate  
& Steatomate.*

**T**UMORES efformati cystidibus seu folliculis à cute suppositâ verè distinctis, includentibus materiem modò melli, modò pulti, modò sebo similem, nuncupantur *Melicerides, Atheromata, Steatomata*. Quæ nomenclaturæ à græcis vocabulis mellem, pul-tem & sebum significantibus desumptæ fuêre. Illorum Tumorum theoriam mox therapeïam trademus.

## THEORIA.

Exigit bona methodus ut in exponendis iis quæ ad theoriam horumce Tumorum spectant, ordini sequenti adstipulemur.

*Quid sint & quomodo efformentur  
Cystides Meliceridum, Atheroma-  
tum & Steatomatum?*

A vero maximè alienum est Cystidum parietes esse partes crassiores humoris cujusdam juxtà se invicem appositas, ordinatas, & efformantes involucrum membranaceum, dilatabile in orbem, expansibile, &c.....

Nequè veritati magis consonat opinio illorum qui in parte affectâ supponunt fieri erosionem, divisionem aut quamlibet separationem fibrillarum membranacearum quæ à succo coacervato successivè magis distensæ & ab invicem separatæ nihilominus hinc & indè alias emittunt fibras quæ tandem omnes mutuò concurrunt ad efformandam membranam cujus cavitas representabit Cystim (*Carolus Musitanus*).

Etiàm si prædictis verosimiliorem, attamen rejiciendam censemus hypo-

thesim quâ admittitur congeries va-  
forum variè dilatatorum & expansio-  
rum, sacculis membraneis occlusorum,  
& Cysti communi obvolutorum (a):  
parùm enim congrua est illa opinio &  
phœnomenis observatis in exortu pro-  
gressibusque illorum Tumorum, & no-  
tionibus anatomicis, & inspectioni Cys-  
tidum manu chirurgicâ eradicatarum.

Ut autem quid sentiendum sit hâc  
in re, paucis enarretur, à limine at-  
tendamus ad ea quæ mirabili artificio  
detexit Malpighius circâ folliculos seu  
loculos membranofos per corpus disper-  
sos; efformantes variis in locis cava

---

(a) Sic censuit D. Hugo Gourraigne, Doctor  
Medicus Monspeliensis in Dissertatione de Tumori-  
bus tunicatis propugnatâ Monspelii, Præsidi D. Fitz-  
Gerald Professore Regio, die 10 mensis Septembris  
anni 1733. Verùm nescio quâ fortunâ, eandem Doc-  
toris Gourraigne Dissertationem à latino in gallicum  
sermonem conversam à verbo ad verbum reperierim  
in opusculo cui titulus est... *Traité des Tumeurs en-  
xistées par le Sr. Rey ancien Chirurgien du Régiment  
de Picardie, actuellement de la Citadelle de Besançon,  
imprimé à Bruxelles l'an 1752.*

variæ figuræ, sphæricæ scilicèt, sphæroïdeæ, ovalis, cylindricæ, digitalis, lenticularis; admittentes intrâ textum membranosi involucri arteriolas è quarum extremis emittuntur fistulæ tenues quæ assiduò secretum humorem evomunt in cava folliculorum. Attendamus iterùm ad folliculos glandulosos subcutaneos liquorem contentum diù servantes, mutantés, per emissaria extrâ patentia emittentes. Inspiciamus deniquè folliculos cavos quibus efformantur cellulæ tunicæ adiposæ.

Iis omnibus perlustratis & collatis  
 1°. Cum situ frequentiori Tumorum cysticorum sub cute aut in tunicâ adiposâ; 2°, Cum figurâ Cystidum è corpore exemptarum quæ formantur cavitate simplici & in apice retinent vestigia pristinatorum olim emissariorum (*Boërhaavius*); 3°. Cum vasis sanguiferis Cystidum parietes perreptantibus (*Morgagnius*), qualia in non obstructis folliculis detexerat Malpighius; 4°. Cum eximiis & invictissimis Practicis observationibus

bus à Boërhaavio relatis in epistolâ anatomicâ ad Ruyschium: puto sanè neminem futurum esse qui deneget Cystides Meliceridum, Atheromatum & Steatomatum consistere in solâ dilata-tione & adauctâ crassitie præexistentium naturaliter folliculorum. Atquè ut stric-tiùs res determinetur probabile erit dis-tensa involucra membranacea glandu-larum sebacearum aliarumque ipsis ana-logarum facere Cystides Meliceridis & Atheromatis: Cystim verò Steatoma-tis produci ab ampliatis folliculis tu-nicæ adiposæ.

Ab unico folliculo obstructo & di-latato oriuntur isti Tumores cystici quos ex parvulo incipere solemne est. Ast unica cellula expansa totum opus non absolvit; novæ enim cellulæ, do-cente Ruyschio, huic accrescunt quæ primariò fuit dilatata.

Quàm facile fit hæc accretio in sub-stantiâ adiposâ ex vesiculis membra-nosis omninò conflata! Ibi à congesto inspissatoque humore distendi & am-

pliari non potest una vesicula quin plures alias vicinas comprimat, compressas retineat, approximatos ipsarum parietes uniat per coalitum, tandem & ipsamet iis adhærescat. Indè fit ut robustior Cystis Steatomatis in immensam molem aliquandò exurgat absquè ruptione.

Minor est in Meliceride, major in Atheromate, maximus in Steatomate numerus membranularum folliculo primigeniùs dilatato accrescentium. Què numerosiores sunt illæ membranulæ accrescentes, è major Cystidis crassitudo: què major approximatio & intimior illarum contactus, è durior Cystis magisque resistens suæ flexioni: què magis distrahi se patiuntur à fluidis contentis fibræ Cystim compaginantes, è major Tumoris moles.

Nonnè vascula partis affectæ liquores crassos, inertes, ac velut induratos coercentia efformare possunt Cystidem absquè membranularum circumpositarum accretione? Id fieri aliquan-

dò autumamus in Meliceride & Atheromate, nunquàm in Steatmate.

Cystidum cavitas, quæ ut plurimum uniformis & simplex est, aliquandò tamen suis parietibus includit minores alias Cystides (*ex observationibus D. Anet, aliorumque*). Quòd evenire credere fas est, cum in eodem loco plures & à se omninò segregatæ cellulæ obstruuntur & expanduntur, totidemque distinctos Tumores cysticos efformant: aggesti hi parvuli Tumores si membranam aponevroticam aliamvè à naturâ efformatam suprâ semetipsum extensam habeant, eam extropellent, sibi que Cystidem communem nanciscentur: si autem solida hæc membrana deficiat, hujus supplebit defectum textus cellularis approximatione & superappositione suarum membranularum compactior factus.

Nequè difficile erit cognitâ structurâ cellulari tunicæ adiposæ, explicare quare interdùm Steatoma quasi loculamenta habeat magis aut minus multiplicia.

*Quid sit & undè profluat materia  
in Cystidibus contenta?*

Juxtà vaga nihìlque determinantia Antiquorum effata, materies Tumorum cysticorum erat soboles humoris pituitosi in hâc Cystide magis, in istâ minùs à naturali constitutione recedentis, qui lento temporis progressu in massam nunc melli, nunc pulti, nunc sebo similem degenerabat.

Effecit autem Neotericorum industria ut quàmplurima, Antiquis prorsù ignota, detecta fuerint circà diversos humores in elegantissimo textu subcutaneo secretos. Meliceridis, Atheromatidis & Steatomatis materiem suppeditant ii ipsimet humores multò abundantiores quidè & spissiores quàm in statu naturali & remorantes in propriis & nativis receptaculis distensione nimia & præternaturali parietum crassitie peccantibus.

Itaque si attentè consideremus humores lentè secretos, unctuosos, facile



spiffescentes, pro ufibus idoneis diù remorantes intrà cryptas, lacunas, glandulas sub cute pofitas, certo certius concludetur materiem Meliceridis & Atheromatis nihil aliud effe quàm prædictos humo estagnantes & degeneratione spontaneâ abeuntes aut in massam colore & consistentiâ melli fimilem in Meliceride; aut in substantiam quæ pulvem pastamvè simulatur in Atheromate. Rursùs spectando liquidum oleosum, pinguedinosum, collectum in cellulis membranæ adiposæ, concludi potest ex eo inspiffato & indurescente efformandam effe materiam sebo perfimilem quæ in Steatomatis cavo latitat. Nonnunquàm in eodem Tumore cystico fit connubium materierum pul-taceæ & sebaceæ, undè Tumor ex Atheromate & Steatomate composi-tus (*Platneri institut. chirurgic. pag. 482*). Interdùm Cystides membrana-cæ, quæ Atheromatibus propriæ sunt, includunt ossa, pilorum manipulos, dentes, crus humanum infantile, alia-

que aliena. Undenam illorum in Atheromatis Cystide generatio? Sanè vix aliud habemus respondendum cum Ruyschio, nisi quod *modus nature agentis, formantis, mutantis nondùm satis perspectus sit homini* ( Ruysch. dec. 3. adversar. anatomicor. )

*Signa & differentia Meliceridis,  
Atheromatis & Steatomatis.*

*Meliceridis* signa characteristica sunt rotunditas, indolentia, color natus, sub prementibus digitis facilis excavatio, iis amotis celer reditus.

*Atheroma* dignoscitur Tumoris indolentiâ, colore natus, figurâ sæpè oblongâ, sub prementibus digitis tardâ retrocessione, iis amotis tardo regressu.

*Steatoma* cum duobus aliis Tumorbis congruit quoad colorem & indolentiam; ab iis discrepat per notabiliorem resistantiam viribus prementibus.

Notis prædictis insigniuntur illi Tu-

mores dùm simplices sunt ; alio autèm modo sese res habet quotiès inflamman-  
tantur , suppurantur , aut cancrofi  
fiunt.

Differentiæ in Tumoribus cysticis ad-  
vertendæ , non solùm eruendæ sunt à  
diversitate fluidorum obstruentium ,  
sed & etiàm à pluribus aliis circumf-  
tantiis , sic....

1°. Meliceris , Atheroma , & Stea-  
toma inter omnes Tumores ii sunt qui  
lentiùs sua percurrunt tempora. Oriun-  
tur à tuberculo vix perceptibili , cres-  
cunt sensim & sine sensu , tardissimè-  
que attingunt acmen sui incrementi.  
Idem tamen non est progressionis or-  
do in quolibet Tumore cystico.

2°. Isti Tumores modò parvi rema-  
nent , modò ad molem assurgunt me-  
diocrem , modò excrescunt in enor-  
mem magnitudinem.

3°. Basis Tumorum cysticorum nunc  
lata , nunc angusta est , nunc deficien-  
tem basim supplet pediolus.

4°. Mobilitas quæ ut plurimùm istis

Tumoribus propria est, major vel minor existit.

5°. Vasa majora, venosa præsertim, nervi, tendines adhærent aliquandò Cystidibus; non rarò ab iis nexibus liberæ sunt.

6°. Ratione sitûs advertendum est an Tumor sedeat suprâ articulationes, suprâ partes viis aëreis vicinas, in palpebris, ad pudenda, suprâ cranium ubi dicitur *Talpa*, quæ verum est *Atheroma*.

7°. Color naturalis cutis qui nunquam mutatur in Meliceride, *Atheromate* & *Steatomate* simplicibus, abit in rubrum, plumbeum, lividum, aut nigricantem, si Tumori superveniant inflammatio, suppuratio, cancrosa indoles: exindè etiàm qui priùs indolens erat, acutè dolet Tumor.

8°. Vel ab externis causis oriuntur Tumores cystici, ut ab ictu, casu, contusione; vel solis causis internis debentur; vel à retropulsis eruptionibus cutaneis, aut quâdam prohibitâ exulceratione;

ceratione ; probè distinguantur ii quos virus peculiare produxit , aut qui adveniunt cacochimicis , cachecticisque corporibus.

9°. Deniquè advertatur an à paucis, an à longo tempore Tumor extiterit.

*Quid de iis Tumoribus præfagiendum sit ?*

Tumores cystici plerùmque magis permolesti sunt quàm periculosi. Majus autèm vel minus incommodum pariunt pro majori aut minori ipsorum mole , & pro diversitate regionis corporis quam occupant.

Si illi Tumores indolentes sint , concolores , in corporibus nequè cacochimicis nequè ullo viru inquinatis , eos verosimiliter absquè noxâ diù duraturos pronunciandum est : & è contrà si calor adaugeatur , si dolor acerbus superveniat , si nativum colorem amittat Tumoris cutis , si venæ varicosæ circa incurventur ; in illis diversis casibus

timeri debent inflammatio & suppuratio clandestina, quodque pejus, Canceri productio. In exulcerato Tumore cystico, certò pronuncietur nec carnes legitimas pullulaturas nec futuram bonam cicatricem nisi prius Cystis omninò ejecta fuerit nè minimâ portiunculâ superstitè.

Eradicatis Tumoribus cysticis à viru quoque pendentibus, nisi virus propriis specificis debellatum fuerit, timendum est nè in eodem loco aut alibi alter Tumor reviviscat in posterum.

Malum est membranas Cystidum abire partim aut integrè in fungos aliasvè excrescentias.

In genere Tumor cysticus recens faciliùs curatur quàm si inveteratus fuerit

## THERAPIA

*Meliceridis, Atheromatis & Steatomatis.*

Remedia interna hîc tantummod

præscribuntur velutì præparatoria & adjuvantia. Curatio radicalis reponitur aut in topicis ; aut in operatione chirurgicâ.

I<sup>o</sup>. *Resolventia* feliciter adhiberi possunt pro Meliceride recenti : in vanum præscriberentur pro Atheromate, multò minùs pro Steatomate. Tuta non sunt resolventia quælibet ad Meliceridem discutiendam ; exquisitè ea se ligantur quæ inflammationem suppurationemque non suscitent.

*Suppurantia* quæ in Meliceride irresolubili & in pluribus Atheromatibus præscribuntur, infaustum sæpè habent successum, tum ob pravam suppurationem quæ excitatur, tum ob difficultatem destruendæ Cystidis ope suppurantium, tum ob sarcomata fungosa ex talibus Tumoribus suppuratis non rarò orientia. Nè igitur ea topica indiscriminatim in usum veniant.

*Cæustica* summi sunt usûs ad erodendam & destruendam Cystidem quæ operi suppuratorio sæpissimè resistit, nec

ejicitur nisi applicato lapide infernali aut caustico æquipollenti.

*Detersivis & cathareticis* mundificetur ulcus & à reliquiis Cystidis adhærescentibus liberetur.

2°. Ast inter auxilia hisce Tumorbibus cysticis accommodata nihil tutius, nihil, confirmante experientiâ, adeò salutare ac extirpatio. Hæc dextrum exigit Chirurgum in operando, prudentem in facto vulnere curando, ulcereque ità detergendo ut nullum Cystidis vestigium remaneat. Solâ extirpatione curari potest Steatoma quod nunquàm resolvitur, rarò & totiès infautè suppuratur. Sæpè etiàm operationem postulant Melicerides & Atheromata.

Ut ut autèm salutare auxilium, semper tamen non debet præscribi operatio quæ contraindicatur 1°. A parte vicinitatis & contiguitatis vasorum majorum, œsophagi, asperæ arteriæ, &c. 2°. A parte maximæ Tumorum molis. 3°. A parte debilitatarum ægri vi-



rium, aut complicati alterius morbi certò lethalis.

---

## CAPUT ULTIMUM

*Hydatidem, Aneurisma, Varicem, Hydrocelem, Hydromphalum & Hydarthrum definiens.*

**E**TIAMSI inter Tumores cysticos humorales recenseantur Hydatidis, Aneurisma, Varix, Hydrocele, Hydromphalus & Hydarthrus; attamen cùm 1°. Hydatidis rarò ad superficiem corporis appareat 2°. Cùm, strictè loquendo, Aneurismata & Varices exactissimè non pertineant ad Tumores humorales quorum conceptus secum importat ideam fluidi cumulati intrà vasa minima 3°. Cùm Hydrocele, Hydromphalus & Hydarthrus ad Hydropes potiùs quàm ad Tumores spectent: ideò omnium illorum affectuum

nudam definitionem trademus, descriptioni supersedentes.

*Hydatis* est Tumor vesicularis humorem lymphaticum continens, in interioribus corporis præsertim reperiendus, ortus à mirâ dilatatione lymphaticorum Bartholinianorum aut quàm minimarum glandularum lymphaticarum serosarum (*Leg. epistol. anatomic. Boërhaav. ad Ruysch. pag. 18.*). Nè confundantur Hydatides exteriores cum Phlyctænis.

*Aneurisma* est dilatatio cystica seu sacciformis à collecto cruore arterioso modò in expansis integris tunicis arteriosis & tunc verum Aneurisma ponitur; modò in textu cellulari intrà quem per disruptas membranas arteriosas effunditur, undè Aneurisma falsum.

*Varix* est Tumor nodosus, mollis nigricans, ortus à nimiâ dilatatione membranarum venosarum, sæpiùs quàm ullibì apparens in tibiis, cruribus, & podice.

In cavo scroti veluti in cystide col

lectus aqueus humor facit *Hydrocelem* per effusionem ( Vide *Ledran Traité des opérations*, pag. 177. ). Hæc *Hydroceles* species noscitur scroti Tumore pyriformi, externè æquali, tantisper pellucente, fluctuationis indicia exhibente, comprimimentibus viribus cedente sed citò sese restituyente.

*Hydromphalus* simplex est species *Herniæ* aquosæ efformatæ à sacco seu cystide umbilicali congestum liquorem aqueum includente.

*Hydarthrus* seu *Hydrops* articuli, est cystis superarticularis cujus cavitas humore lymphatico aut potiùs synoviali repletur. Circà illum affectum consulat *Fabricius Hildanus tractat. de Ichore & Meliceriâ.*

F I N I S.



# ERRATA.

- P** Ag. 40. *lin.* 12. *morbis lege morbi.*  
Pag. 90. *nott.* (a) *certis temporibus lege incertis temporibus.*  
Pag. 116. *lin.* 4. *resistitur lege renitur.*  
Pag. 124. *nott.* (b) *lin. penult. persistere lege perstitere.*  
Pag. 137. *lin.* 16. *epinytides lege epinyctides.*  
Pag. 140. *lin.* 6. *punctum deleatur quod est post verbum contentum.*  
Pag. 166. *lin.* 11. *parres lege partes.*  
Pag. 180. *lin.* 5. *par lege per.*  
Pag. 250. *lin. ult.* *implicentur lege implicetur.*  
Pag. 262. *lin.* 3. *depascentes lege depascentia. Lin.*  
4. *spargentes lege spargentia.*  
Pag. 270. *lin.* 20. *flatuloso lege flatuoso.*  
Pag. 271. *lin.* 7. *auctâ lege acutâ.*

## Adenda

- De tumorebus lacteis  
De pustulis miliaribus lacteis  
De fungo articulorum, enfras  
De tumorebus alanches de articu  
De spina bifida quingevi.